Mappa 08: P97 delle celle — almeno 118 asteroidi/cella

317,695 traiettorie distinte · 1,184,067 istanze a ETD diverse · 4377 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione



Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 411 asteroidi/cella

91,109 traiettorie distinte · 415,059 istanze a ETD diverse · 3865 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 78/7746 occupate
(1.01%) · 0.78% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 709 asteroidi/cella

44,815 traiettorie distinte · 216,863 istanze a ETD diverse · 3171 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna

Terra

Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Terra

Geocentrico — ω del catalogo

Terra

Luna a ETD

x [km]

y [km]

1e5

$\Delta V_{Hohmann} + \Delta V_{immissione}$ [km/s]

Celle sopra soglia: 39/7746 occupate
(0.50%) · 0.39% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

$\omega_{cat,corr}$ al perigeo [deg]

$h_p = r_p - R_\oplus$ sopra la superficie [km]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 1248 asteroidi/cella

24,900 traiettorie distinte · 129,223 istanze a ETD diverse · 3121 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster

2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster

1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.

Mappa 08: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster

341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da LEO 200 km: Hohmann + immissione

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 128/7746 occupate
(1.65%) · 1.28% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV totale: Hohmann dalla circolare a quota 200 km alla circolare r_p + immissione al periapside osculatore.
Somma dei moduli dei tre impulsi; manovre complanari e stesso verso. Arco Hohmann non raffigurato.