Mappa 05: P97 delle celle — almeno 275 asteroidi/cella

83,224 traiettorie distinte · 390,814 istanze a ETD diverse · 3844 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Luna

Luna a ETD

y [km]

x [km]

1e5

$\Delta V_{parcheggio}$ al periapside osculatore [km/s]

Celle sopra soglia: 156/5173 occupate
(3.02%) · 1.56% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

e al perigeo [-]

ε al perigeo [km^2/s^2]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99 delle celle — almeno 705 asteroidi/cella

31,262 traiettorie distinte · 165,498 istanze a ETD diverse · 3268 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Terra

Luna

Luna a ETD

y [km]

x [km]

1e5

$\Delta V_{parcheggio}$ al periapside osculatore [km/s]

Celle sopra soglia: 52/5173 occupate
(1.01%) · 0.52% della griglia totale

Colore: celle selezionate · grigio: altre celle occupate

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

e al perigeo [-]

ε al perigeo [km²/s²]

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99.5 delle celle — almeno 1014 asteroidi/cella

17,876 traiettorie distinte · 93,363 istanze a ETD diverse · 2588 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99.75 delle celle — almeno 1095 asteroidi/cella

9,407 traiettorie distinte · 51,126 istanze a ETD diverse · 2547 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster

1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 05: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 191/5173 occupate
(3.69%) · 1.91% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.