Mappa 08: P97 delle celle — almeno 118 asteroidi/cella

317,695 traiettorie distinte · 1,184,067 istanze a ETD diverse · 4377 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99 delle celle — almeno 411 asteroidi/cella

91,109 traiettorie distinte · 415,059 istanze a ETD diverse · 3865 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 709 asteroidi/cella

44,815 traiettorie distinte · 216,863 istanze a ETD diverse · 3171 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 1248 asteroidi/cella
24,900 traiettorie distinte · 129,223 istanze a ETD diverse · 3121 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 315/7746 occupate
(4.07%) · 3.15% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 248/7746 occupate
(3.20%) · 2.48% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 08: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell’orbita osculatrice, che può essere distinto dall’evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all’uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all’ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell’orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.