Mappa 10: P97 delle celle — almeno 341 asteroidi/cella

81,911 traiettorie distinte · 397,041 istanze a ETD diverse · 4333 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous. In questa selezione 1 eventi salvati sono apocentrici osculatori: il ΔV si riferisce al periapside osculatore e non a quei pallini.

Mappa 10: P99 delle celle — almeno 1042 asteroidi/cella

24,694 traiettorie distinte · 148,543 istanze a ETD diverse · 3610 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous. In questa selezione 1 eventi salvati sono apocentrici osculatori: il ΔV si riferisce al periapside osculatore e non a quei pallini.

Mappa 10: P99.5 delle celle — almeno 1399 asteroidi/cella

12,141 traiettorie distinte · 83,176 istanze a ETD diverse · 3506 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 10: P99.75 delle celle — almeno 1579 asteroidi/cella
6,619 traiettorie distinte · 47,107 istanze a ETD diverse · 3352 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 10/3954 occupate
(0.25%) · 0.10% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 10: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 10: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 10: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 152/3954 occupate
(3.84%) · 1.52% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.