Mappa 12: P97 delle celle — almeno 67 asteroidi/cella

162,717 traiettorie distinte · 266,489 istanze a ETD diverse · 2816 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99 delle celle — almeno 76 asteroidi/cella

73,583 traiettorie distinte · 108,702 istanze a ETD diverse · 1614 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99.5 delle celle — almeno 81 asteroidi/cella

41,755 traiettorie distinte · 60,455 istanze a ETD diverse · 1078 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99.75 delle celle — almeno 87 asteroidi/cella
19,758 traiettorie distinte · 29,844 istanze a ETD diverse · 610 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle sopra soglia: 26/9881 occupate
(0.26%) · 0.26% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore

Sinodico Terra–Luna



Geocentrico, assi ECLIPJ2000



Geocentrico — ω del catalogo





Celle con traiettorie selezionate: 4889/9881 occupate
(49.48%) · 48.89% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.

Mappa 12: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · colore: ΔV da circolare al periapside osculatore





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.
ΔV al periapside dell'orbita osculatrice; circolare complanare e stesso verso. Costo impulsivo analitico geocentrico, non ΔV di rendez-vous.