





Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Elementi osculatori geocentrici al perigeo nel riferimento del catalogo. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
ω corretto per il verso; assi del catalogo, Luna su +x a ETD. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Elementi osculatori geocentrici al perigeo nel riferimento del catalogo. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
ω corretto per il verso; assi del catalogo, Luna su +x a ETD. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
θ: Luna → periapside alla sua epoca, con verso gia corretto. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.



Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
θ: Luna → periapside alla sua epoca, con verso gia corretto. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.



Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Azimut ECLIPJ2000 con la fase lunare all'ETD del miglior trasferimento. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.



Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Azimut ECLIPJ2000 con la fase lunare all'ETD del miglior trasferimento. Scala a potenza γ = 3, comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.