





Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Elementi osculatori geocentrici al perigeo nel riferimento del catalogo. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
ω corretto per il verso; assi del catalogo, Luna su +x a ETD. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Elementi osculatori geocentrici al perigeo nel riferimento del catalogo. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
ω corretto per il verso; assi del catalogo, Luna su +x a ETD. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.




Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
θ: Luna → periapside alla sua epoca, con verso gia corretto. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.


Mappa 10: velocita media alla SOI — migliori trasferimenti
4443/4886 asteroidi — 312 cluster — 2,133,757 traiettorie distinte
θ: Luna → perigeo al perigeo [deg]
ε al perigeo [km²/s²]
Velocita geocentrica media alla SOI [km/s]
0
50
100
150
200
250
300
350
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
θ: Luna → periapside alla sua epoca, con verso gia corretto. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.



Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Azimut ECLIPJ2000 con la fase lunare all'ETD del miglior trasferimento. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.



Velocita individuali dei membri dei cluster vincenti; orbite legate con perigeo sopra la superficie.
Ogni traiettoria conta una volta per cella, anche se associata a piu asteroidi. Celle vuote bianche.
Azimut ECLIPJ2000 con la fase lunare all'ETD del miglior trasferimento. Scala colore comune alle otto mappe. Modello medio dei cluster.