

Mappa 06: P97 delle celle — almeno 168 asteroidi/cella

203,987 traiettorie distinte · 838,066 istanze a ETD diverse · 4302 asteroidi · 201 punti per curva







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 06: P99 delle celle — almeno 671 asteroidi/cella
60,337 traiettorie distinte · 302,336 istanze a ETD diverse · 3332 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 60/5914 occupate
(1.01%) · 0.60% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 06: P99.5 delle celle — almeno 1083 asteroidi/cella
36,547 traiettorie distinte · 177,420 istanze a ETD diverse · 3175 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 30/5914 occupate
(0.51%) · 0.30% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 06: P99.75 delle celle — almeno 1384 asteroidi/cella
22,459 traiettorie distinte · 108,901 istanze a ETD diverse · 3125 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 15/5914 occupate
(0.25%) · 0.15% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.