

Mappa 08: P97 delle celle — almeno 118 asteroidi/cella
317,695 traiettorie distinte · 1,184,067 istanze a ETD diverse · 4377 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 237/7746 occupate
(3.06%) · 2.37% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione








Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.


Mappa 08: P99 delle celle — almeno 411 asteroidi/cella
91,109 traiettorie distinte · 415,059 istanze a ETD diverse · 3865 asteroidi · 201 punti per curva



















Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 08: P99.5 delle celle — almeno 709 asteroidi/cella
44,815 traiettorie distinte · 216,863 istanze a ETD diverse · 3171 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 39/7746 occupate
(0.50%) · 0.39% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 08: P99.75 delle celle — almeno 1248 asteroidi/cella
24,900 traiettorie distinte · 129,223 istanze a ETD diverse · 3121 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 20/7746 occupate
(0.26%) · 0.20% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.