

Mappa 10: P97 delle celle — almeno 341 asteroidi/cella
81,911 traiettorie distinte · 397,041 istanze a ETD diverse · 4333 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 120/3954 occupate
(3.03%) · 1.20% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione







Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell’orbita osculatrice, che può essere distinto dall’evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all’uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all’ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 10: P99 delle celle — almeno 1042 asteroidi/cella
24,694 traiettorie distinte · 148,543 istanze a ETD diverse · 3610 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 40/3954 occupate
(1.01%) · 0.40% della griglia totale




Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.


Mappa 10: P99.5 delle celle — almeno 1399 asteroidi/cella
12,141 traiettorie distinte · 83,176 istanze a ETD diverse · 3506 asteroidi · 201 punti per curva




Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 10: P99.75 delle celle — almeno 1579 asteroidi/cella
6,619 traiettorie distinte · 47,107 istanze a ETD diverse · 3352 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle sopra soglia: 10/3954 occupate
(0.25%) · 0.10% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.