

Mappa 05: P99.9 delle singole traiettorie — almeno 22 asteroidi per cluster
2,413 traiettorie distinte · 173,762 istanze a ETD diverse · 3413 asteroidi · 201 punti per curva


Sinodico Terra–Luna




Geocentrico, assi ECLIPJ2000




Geocentrico — ω del catalogo







Celle con traiettorie selezionate: 550/5173 occupate
(10.63%) · 5.50% della griglia totale



Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione





Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 05: P99.95 delle singole traiettorie — almeno 30 asteroidi per cluster
1,254 traiettorie distinte · 145,737 istanze a ETD diverse · 3241 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Asteroidi il cui minimo DV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 431/5173 occupate
(8.33%) · 4.31% della griglia totale

Colore: copertura dei membri selezionati nelle rispettive epoche

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.

Mappa 05: P99.99 delle singole traiettorie — almeno 99 asteroidi per cluster
341 traiettorie distinte · 98,813 istanze a ETD diverse · 2722 asteroidi · 201 punti per curva

Sinodico Terra–Luna

Geocentrico, assi ECLIPJ2000

Geocentrico — ω del catalogo

Asteroidi il cui minimo DV sceglie il cluster della traiettoria

Celle con traiettorie selezionate: 191/5173 occupate
(3.69%) · 1.91% della griglia totale

Colore: copertura dei membri selezionati nelle rispettive epoche

Griglia originale completa
Stessi assi e stessa scala colore della selezione

Asteroidi distinti nella cella

Pallini: eventi di minimo r geocentrico salvati da GA16; φ indica il periapside dell'orbita osculatrice, che può essere distinto dall'evento.
Stesse traiettorie e stessi colori nelle tre viste, dal perigeo salvato all'uscita dalla SOI terrestre.
Centro: modello CR3BP ruotato con la fase lunare all'ETD, in assi ECLIPJ2000.
Destra: assi inerziali del catalogo, con la Luna su +x a ETD; origine nella Terra.