

# Algebra

Luca De Paulis

28 settembre 2020

# INDICE

## I ARITMETICA

1	GRUPPI	4
1.1	Introduzione ai gruppi	4
1.2	Sottogruppi	7
1.3	Generatori e gruppi ciclici	10
1.3.1	Il gruppo ciclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	14
1.4	Omomorfismi di gruppi	17
1.4.1	Isomorfismi	21
1.4.2	Omomorfismi di gruppi ciclici	24
1.4.3	Prodotto diretto di gruppi	25
1.4.4	Prodotto di sottogruppi	28
1.5	Classi laterali e gruppo quoziente	28
1.5.1	Sottogruppi normali e gruppo quoziente	32
1.6	Teoremi di Omomorfismo	35

## II ALGEBRA I

2	TEORIA DEI GRUPPI	41
2.1	Gruppi e generatori	41
2.2	Gruppo diedrale	42
2.2.1	Sottogruppi del gruppo diedrale	44
2.3	Azioni di gruppo	45

Parte I

ARITMETICA

# 1 | GRUPPI

## 1.1 INTRODUZIONE AI GRUPPI

**Definizione 1.1.1** **Gruppo.** Sia  $G \neq \emptyset$  un insieme e sia  $*$  un'operazione su  $G$ , ovvero

$$\begin{aligned} * : G \times G &\rightarrow G \\ (a, b) &\mapsto a * b. \end{aligned} \tag{1}$$

Allora la struttura  $(G, *)$  si dice *gruppo* se valgono i seguenti assiomi:

(G1) L'operazione  $*$  è *associativa*:

per ogni  $a, b, c \in G$  vale che  $a * (b * c) = (a * b) * c$ .

(G2) Esiste un elemento  $e_G \in G$  che fa da *elemento neutro* rispetto all'operazione  $*$ :

per ogni  $a \in G$  vale che  $a * e_G = e_G * a = a$ .

(G3) Ogni elemento di  $G$  è *invertibile* rispetto all'operazione  $*$ :

per ogni  $a \in G$  esiste  $a^{-1} \in G$  tale che  $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e_G$ .

Tale  $a^{-1}$  si dice *inverso* di  $a$ .

**Definizione 1.1.2** **Gruppo abeliano.** Sia  $(G, *)$  un gruppo. Allora  $(G, *)$  si dice *gruppo abeliano* se vale inoltre

(G4) l'operazione  $*$  è commutativa, ovvero

$$\forall a, b \in G \quad a * b = b * a.$$

L'elemento neutro di  $G$  si può rappresentare come  $e_G$ ,  $\text{id}_G$ ,  $1_G$  o semplicemente  $e$  nel caso sia evidente il gruppo a cui appartiene.

Possiamo rappresentare un gruppo in *notazione moltiplicativa*, come abbiamo fatto finora, oppure in *notazione additiva*, spesso usata quando si studiano gruppi abeliani.

In notazione additiva, ovvero considerando un gruppo  $(G, +)$  gli assiomi diventano

(G1) l'operazione  $+$  è associativa, ovvero

$$\forall a, b, c \in G. \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

(G2) esiste un elemento  $e_G \in G$  che fa da elemento neutro rispetto all'operazione  $+$ :

$$\forall a \in G. \quad a + e_G = e_G + a = a$$

(G3) ogni elemento di  $G$  è invertibile rispetto all'operazione  $+$ :

$$\forall a \in G \quad \exists (-a) \in G. \quad a + (-a) = (-a) + a = e_G.$$

Per semplicità spesso si scrive  $a - b$  per intendere  $a + (-b)$ .

(G4) l'operazione  $+$  è commutativa, ovvero

$$\forall a, b \in G \quad a + b = b + a.$$

Facciamo alcuni esempi di gruppi.

ESEMPIO 1.1.3. Sono gruppi abeliani  $(\mathbb{Z}, +)$  e le sue estensioni  $(\mathbb{Q}, +)$ ,  $(\mathbb{R}, +)$ ,  $(\mathbb{C}, +)$ , come è ovvio verificare.

ESEMPIO 1.1.4.  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  è un gruppo, definendo l'operazione di somma rispetto alle classi di resto.

ESEMPIO 1.1.5. è un gruppo la struttura  $(\mu_n, \cdot)$  dove

$$\mu_n := \{ x \in \mathbb{C} : x^n = 1 \}.$$

**Dimostrazione.** Infatti

(Go)  $\cdot$  è un'operazione su  $\mu_n$ . Infatti se  $x, y \in \mu_n$ , ovvero

$$x^n = y^n = 1$$

allora segue anche che

$$(xy)^n = x^n y^n = 1$$

da cui  $xy \in \mu_n$ ;

(G1)  $\cdot$  è associativa in  $\mathbb{C}$ , dunque lo è in  $\mu_n \subseteq \mathbb{C}$ ;

(G2)  $1 \in \mathbb{C}$  è l'elemento neutro di  $\cdot$  e  $1 \in \mu_n$  in quanto  $1^n = 1$ ;

(G3) ogni elemento di  $\mu_n$  ammette inverso. Infatti sia  $x \in \mu_n$ , dunque  $x \neq 0$  (altrimenti  $x^n = 0 \neq 1$ ) e sia  $x^{-1} \in \mathbb{C}$  il suo inverso. Allora

$$(x^{-1})^n = (x^n)^{-1} = 1^{-1} = 1$$

ovvero  $x^{-1} \in \mu_n$ ;

(G4) inoltre  $\cdot$  è commutativa in  $\mathbb{C}$ , dunque lo è anche in  $\mu_n$ .

Da ciò segue che  $\mu_n$  è un gruppo abeliano.  $\square$

ESEMPIO 1.1.6.  $(\mathbb{Z}^\times, \cdot)$  dove

$$\mathbb{Z}^\times := \{ n \in \mathbb{Z} : n \text{ è invertibile rispetto a } \cdot \} = \{ \pm 1 \}$$

è un gruppo abeliano;

ESEMPIO 1.1.7.  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \cdot)$  dove

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times := \{ \bar{n} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{n} \text{ è invertibile rispetto a } \cdot \}$$

è un gruppo abeliano.

**Dimostrazione.** Infatti

(Go)  $\cdot$  è un'operazione su  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Infatti se  $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  allora segue anche che  $\overline{xy}$  è invertibile in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  e il suo inverso è  $\overline{x^{-1}} \cdot \overline{y^{-1}}$ , da cui  $\overline{xy} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ;

(G1)  $\cdot$  è associativa in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , dunque lo è in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ;

(G2)  $1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è l'elemento neutro di  $\cdot$  e  $1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$  in quanto 1 è invertibile e il suo inverso è 1;

(G3) ogni elemento di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times$  ammette inverso per definizione;

(G4) inoltre  $\cdot$  è commutativa in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , dunque lo è in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Da ciò segue che  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è un gruppo abeliano.  $\square$

ESEMPIO 1.1.8. Se  $X$  è un insieme e  $\mathcal{S}(X)$  è l'insieme

$$\mathcal{S}(X) := \{ f : X \rightarrow X : f \text{ è bigettiva} \}$$

allora  $(\mathcal{S}(X), \circ)$  è un gruppo (dove  $\circ$  è l'operazione di composizione tra funzioni).

**Dimostrazione.** Infatti

(Go) se  $f, g \in \mathcal{S}(X)$  allora  $f \circ g : X \rightarrow X$  è bigettiva, dunque  $f \circ g \in \mathcal{S}(X)$ ;

(G1) l'operazione di composizione di funzioni è associativa;

(G2) la funzione

$$\text{id} : X \rightarrow X$$

$$x \mapsto x$$

è bigettiva ed è l'elemento neutro rispetto alla composizione;

(G3) Se  $f \in \mathcal{S}(X)$  allora  $f$  è invertibile ed esisterà  $f^{-1} : X \rightarrow X$  tale che  $f \circ f^{-1} = \text{id}$ . Ma allora  $f^{-1}$  è invertibile e la sua inversa è  $f$ , dunque  $f^{-1}$  è bigettiva e quindi  $f^{-1} \in \mathcal{S}(X)$ .

Dunque  $\mathcal{S}(X)$  è un gruppo (non necessariamente abeliano).  $\square$

Esempi di strutture che non rispettano le proprietà di un gruppo sono invece:

- $(\mathbb{N}, +)$  poichè nessun numero ha inverso ( $-n \notin \mathbb{N}$ );
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ,  $(\mathbb{Q}, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R}, \cdot)$  e  $(\mathbb{C}, \cdot)$  non sono gruppi in quanto 0 non ha inverso moltiplicativo;
- l'insieme

$$\{ x \in \mathbb{C} : x^n = 2 \}$$

in quanto il prodotto due elementi di questo insieme non appartiene più all'insieme.

Definiamo ora alcune proprietà comuni a tutti i gruppi.

**Proposizione 1.1.9** **Proprietà algebriche dei gruppi.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo. Allora valgono le seguenti affermazioni:

- (i) l'elemento neutro di  $G$  è unico;
- (ii)  $\forall g \in G$  l'inverso di  $g$  è unico;
- (iii)  $\forall g \in G \quad (g^{-1})^{-1} = g$ ;
- (iv)  $\forall h, g \in G \quad (hg^{-1})^{-1} = g^{-1}h^{-1}$ ;
- (v) Valgono le leggi di cancellazione:  $\forall a, b, c \in G$  vale che

$$ab = ac \iff b = c \quad (\text{sx})$$

$$ba = ca \iff b = c \quad (\text{dx})$$

**Dimostrazione.** (i) Siano  $e_1, e_2 \in G$  entrambi elementi neutri. Allora

$$e_1 = e_1 \cdot e_2 = e_2$$

dove il primo uguale viene dal fatto che  $e_2$  è elemento neutro, mentre il secondo viene dal fatto che  $e_1$  lo è.

- (ii) Siano  $x, y \in G$  entrambi inversi di qualche  $g \in G$ . Allora per definizione di inverso

$$xg = gx = e = gy = yg.$$

Ma allora segue che

$$\begin{aligned} x & & (\text{el. neutro}) \\ &= x \cdot e & (e = gy) \\ &= x(gy) & (\text{per } (G_1)) \\ &= (xg)y & (xg = e) \\ &= e \cdot y & (\text{el. neutro}) \\ &= g \end{aligned}$$

ovvero  $x = y = g^{-1}$ .

- (iii) Sappiamo che  $gg^{-1} = g^{-1}g = e$ . Sia  $x$  l'inverso di  $g^{-1}$ , ovvero

$$g^{-1}x = xg^{-1} = e.$$

Dunque  $g$  è un inverso di  $g^{-1}$ , ma per 1.1.9: (ii) l'inverso è unico e quindi  $(g^{-1})^{-1} = g$ .

- (iv) Sia  $(hg)^{-1}$  l'inverso di  $hg$ . Allora per  $(G_3)$  sappiamo che

$$\begin{aligned} (hg)(hg)^{-1} &= e & (\text{multiplico a sx per } h^{-1}) \\ \iff h^{-1}hg(hg)^{-1} &= h^{-1} & (\text{per } (G_3)) \\ \iff g(hg)^{-1} &= h^{-1} & (\text{multiplico a sx per } g^{-1}) \\ \iff g^{-1}g(hg)^{-1} &= g^{-1}h^{-1} & (\text{per } (G_3)) \\ \iff (hg)^{-1} &= g^{-1}h^{-1}. \end{aligned}$$

- (v) Legge di cancellazione sinistra:

$$\begin{aligned} ab &= ac & (\text{multiplico a sx per } a^{-1}) \\ \iff a^{-1}ab &= a^{-1}ac & (\text{per } (G_3)) \\ \iff b &= c. \end{aligned}$$

Legge di cancellazione destra:

$$\begin{aligned} ba &= ca & (\text{multiplico a dx per } a^{-1}) \\ \iff baa^{-1} &= caa^{-1} & (\text{per } (G_3)) \\ \iff b &= c. \quad \square \end{aligned}$$

## 1.2 SOTTOGRUPPI

**Definizione 1.2.1** **Sottogruppo.** Sia  $(G, *)$  un gruppo e sia  $H \subseteq G$ ,  $H \neq \emptyset$ . Allora  $H$  insieme ad un'operazione  $*_H$  si dice *sottogruppo* di  $(G, *)$  se  $(H, *_H)$  è un gruppo. Inoltre se l'operazione  $*_H$  è l'operazione  $*$ , ovvero l'operazione del sottogruppo è indotta da  $G$ , allora si scrive  $H \leq G$ .

**Proposizione 1.2.2** **Condizione necessaria e sufficiente per i sottogruppi.** Sia  $(G, *)$  un gruppo e sia  $H \subseteq G$ ,  $H \neq \emptyset$ . Allora  $H \leq G$  se e solo se

(i)  $*$  è un'operazione su  $H$ , ovvero

$$a * b \in H \quad \forall a, b \in H$$

(ii) ogni elemento di  $H$  è invertibile (in  $H$ ), ovvero

$$h^{-1} \in H \quad \forall h \in H$$

**Dimostrazione.** Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Ovvio in quanto se  $H \leq G$  allora  $H$  è un gruppo.

( $\Leftarrow$ ) Sappiamo che  $*$  è associativa poichè lo è in  $G$ ; dobbiamo quindi mostrare solamente che  $e_G \in H$ .

Per ipotesi  $H \neq \emptyset$ , dunque esiste un  $h \in H$ . Per l'ipotesi 1.2.2: (ii) dovrà esistere anche  $h^{-1} \in H$ , mentre per l'ipotesi 1.2.2: (i) deve valere che  $h * h^{-1} \in H$ .

Tuttavia  $h * h^{-1} = e_G$ , dunque  $e_G \in H$  e quindi  $H$  è un sottogruppo indotto da  $G$ .

Da ciò viene la tesi.  $\square$

Un sottogruppo particolarmente importante di qualsiasi gruppo è il *centro del gruppo*:

**Definizione 1.2.3** **Centro di un gruppo.** Sia  $(G, *)$  un gruppo. Allora si definisce *centro* di  $G$  l'insieme

$$Z(G) := \{ x \in G : g * x = x * g \quad \forall g \in G \}.$$

Intuitivamente, il centro di un gruppo è l'insieme di tutti gli elementi per cui  $*$  diventa commutativa.

Mostriamo che il centro di un gruppo è un sottogruppo tramite la prossima proposizione.

**Proposizione 1.2.4** **Proprietà del centro di un gruppo.** Sia  $(G, *)$  un gruppo e sia  $Z(G)$  il suo centro.

Allora vale che

(i)  $Z(G) \leq G$ ;

(ii)  $Z(G) = G$  se e solo se  $G$  è abeliano.

**Dimostrazione.** Mostriamo le due affermazioni separatamente

**$Z(G)$  È UN SOTTOGRUPPO** Notiamo innanzitutto che  $Z(G) \neq \emptyset$  poichè  $e_G \in Z(G)$ . Per la proposizione 1.2.2 ci basta mostrare che  $*$  è un'operazione su  $Z(G)$  e che ogni elemento di  $Z(G)$  è invertibile.

(1) Siano  $x, y \in Z(G)$  e mostriamo che  $x * y \in Z(G)$ , ovvero che per ogni  $g \in G$  vale che  $g * (x * y) = (x * y) * g$ .

$$\begin{aligned} & g * (x * y) && \text{(per } (G1)) \\ &= (g * x) * y && \text{(dato che } x \in Z(G)) \\ &= (x * g) * y && \text{(per } (G1)) \\ &= x * (g * y) && \text{(dato che } x \in Z(G)) \\ &= x * (y * g) && \text{(per } (G1)) \\ &= (x * y) * g. \end{aligned}$$



(2) Sia  $x \in Z(G)$ , mostriamo che  $x^{-1} \in Z(G)$ .

Per ipotesi

$$\begin{aligned}
 g * x &= x * g && \text{(moltiplico a sinistra per } x^{-1}) \\
 \iff x^{-1} * g * x &= x^{-1} * x * g && \text{(dato che } x^{-1} * x = e) \\
 \iff x^{-1} * g * x &= g && \text{(moltiplico a destra per } x^{-1}) \\
 \iff x^{-1} * g * x * x^{-1} &= g * x^{-1} && \text{(dato che } x^{-1} * x = e) \\
 \iff x^{-1} * g &= g * x^{-1}
 \end{aligned}$$

da cui  $x^{-1} \in Z(G)$ .

Per la proposizione 1.2.2 segue che  $Z(G) \leq G$ .

$Z(G) = G$  SE E SOLO SE  $G$  ABELIANO Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\implies$ ) Ovvvia:  $Z(G)$  è un gruppo abeliano, dunque se  $G = Z(G)$  allora  $G$  è abeliano.

( $\impliedby$ ) Ovvvia:  $Z(G)$  è l'insieme di tutti gli elementi di  $G$  per cui  $*$  commuta, ma se  $G$  è abeliano questi sono tutti gli elementi di  $G$ , ovvero  $Z(G) = G$ .  $\square$

Un altro esempio è dato dai sottogruppi di  $(\mathbb{Z}, +)$ .

**Definizione 1.2.5** **Insieme dei multipli interi.** Sia  $n \in \mathbb{Z}$ . Allora chiamo  $n\mathbb{Z}$  l'insieme dei multipli interi di  $n$

$$n\mathbb{Z} := \{ nk : k \in \mathbb{Z} \}.$$

È semplice verificare che  $(n\mathbb{Z}, +)$  è un gruppo per ogni  $n \in \mathbb{Z}$ . In particolare vale la seguente proposizione.

**Proposizione 1.2.6**  $n\mathbb{Z}$  è sottogruppo di  $\mathbb{Z}$ . Consideriamo il gruppo  $(\mathbb{Z}, +)$ . Per ogni  $n \in \mathbb{Z}$  vale che  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ .

**Dimostrazione.** Innanzitutto notiamo che  $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$  in quanto  $n \cdot 0 = 0 \in n\mathbb{Z}$ .

Mostriamo ora che  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ .

(1) Siano  $x, y \in n\mathbb{Z}$  e mostriamo che  $x + y \in n\mathbb{Z}$ .

Per definizione di  $n\mathbb{Z}$  esisteranno  $k, h \in \mathbb{Z}$  tali che  $x = nk$ ,  $y = nh$ .

Allora  $x + y = nk + nh = n(k + h) \in n\mathbb{Z}$  in quanto  $k + h \in \mathbb{Z}$ .

(2) Sia  $x \in n\mathbb{Z}$ , mostriamo che  $-x \in n\mathbb{Z}$ .

Per definizione di  $n\mathbb{Z}$  esisterà  $k \in \mathbb{Z}$  tale che  $x = nk$ .

Allora affermo che  $-x = n(-k) \in n\mathbb{Z}$ . Infatti

$$x + (-x) = nk + n(-k) = n(k - k) = 0$$

che è l'elemento neutro di  $\mathbb{Z}$ .

Dunque per la proposizione 1.2.2 segue che  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ , ovvero la tesi.  $\square$

**Corollario 1.2.7** Siano  $n, m \in \mathbb{Z}$ . Allora valgono i due fatti seguenti:

- (i)  $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z} \iff m \mid n$ ;
- (ii)  $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} \iff n = \pm m$ .

**Dimostrazione.** Dimostriamo le due affermazioni separatamente.

**PARTE 1.** Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo  $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$ , ovvero che per ogni  $x \in n\mathbb{Z}$  allora  $x \in m\mathbb{Z}$ .

Sia  $k \in \mathbb{Z}$  tale che  $(k, m) = 1$  e sia  $x = nk$ .

Per definizione di  $n\mathbb{Z}$  segue che  $x \in n\mathbb{Z}$ , dunque  $x \in m\mathbb{Z}$ .

Allora dovrà esistere  $h \in \mathbb{Z}$  tale che

$$\begin{aligned} x &= mh \\ \Leftrightarrow nk &= mh \\ \Rightarrow m &| nk \end{aligned}$$

Ma abbiamo scelto  $k$  tale che  $(k, m) = 1$ , dunque

$$\Rightarrow m | n.$$

( $\Leftarrow$ ) Supponiamo che  $m | n$ , ovvero  $n = mh$  per qualche  $h \in \mathbb{Z}$ . Allora

$$n\mathbb{Z} = (mh)\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$$

in quanto i multipli di  $mh$  sono necessariamente anche multipli di  $m$ .

**PARTE 2.** Se  $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$  allora vale che  $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$  e  $m\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$ , dunque per 1.2.7: (i)  $m | n$  e  $n | m$ , ovvero  $n$  e  $m$  sono uguali a meno del segno.  $\square$

**Proposizione 1.2.8** **Intersezione di sottogruppi è un sottogruppo.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e siano  $H, K \leq G$ . Allora  $H \cap K \leq G$ .

**Dimostrazione.** Innanzitutto dato che  $e_G \in H$ ,  $e_G \in K$  segue che  $e_G \in H \cap K$ , che quindi non può essere vuoto.

Per la proposizione 1.2.2 è sufficiente dimostrare che  $H \cap K$  è chiuso rispetto all'operazione  $\cdot$  e che ogni elemento è invertibile.

(i) Siano  $x, y \in H \cap K$ ; mostriamo che  $xy \in H \cap K$ .

Per definizione di intersezione sappiamo che  $x, y \in H$  e  $x, y \in K$ . Dato che  $H$  è un gruppo varrà che  $xy \in H$ ; per lo stesso motivo  $xy \in K$ ; dunque  $xy \in H \cap K$ .

(ii) Sia  $x \in H \cap K$ ; mostriamo che  $x^{-1} \in H \cap K$ .

Per definizione di intersezione sappiamo che  $x \in H$  e  $x \in K$ . Dato che  $H$  è un gruppo varrà che  $x^{-1} \in H$ ; per lo stesso motivo  $x^{-1} \in K$ ; dunque  $x^{-1} \in H \cap K$ .

Dunque per la proposizione 1.2.2 segue che  $H \cap K \leq G$ .  $\square$

### 1.3 GENERATORI E GRUPPI CICLICI

Innanzitutto diamo una definizione generale di potenze:

**Definizione 1.3.1** **Potenze intere.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $g \in G$  qualsiasi.

Allora definiamo  $g^k$  per  $k \in \mathbb{Z}$  nel seguente modo:

$$g^k := \begin{cases} e_G & \text{se } k = 0 \\ g \cdot g^{k-1} & \text{se } k > 0 \\ (g^{-1})^k & \text{se } k < 0. \end{cases}$$

Se il gruppo è definito in notazione additiva, le potenze diventano prodotti per numeri interi.

Piu' formalmente, se  $(G, +)$  è un gruppo e  $g \in G$  qualsiasi, allora definiamo  $ng$  per  $n \in \mathbb{Z}$  nel seguente modo:

$$ng := \begin{cases} e_G & \text{se } n = 0 \\ g + (n-1)g & \text{se } n > 0 \\ (-n)(-g) & \text{se } n < 0. \end{cases}$$

Le potenze intere soddisfano alcune proprietà interessanti, verificabili facilmente per induzione, tra cui

(P1) per ogni  $n, m \in \mathbb{Z}$  vale che  $g^m g^n = g^{n+m}$ ,

(P2) per ogni  $n, m \in \mathbb{Z}$  vale che  $(g^n)^m = g^{nm}$ .

**Definizione 1.3.2** **Sottogruppo generato.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $g \in G$ . Allora si dice *sottogruppo generato da g* l'insieme

$$\langle g \rangle := \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}.$$

**Proposizione 1.3.3** **Il sottogruppo generato è un sottogruppo abeliano.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $g \in G$  qualsiasi. Allora  $\langle g \rangle \leq G$ . Inoltre  $\langle g \rangle$  è abeliano.

**Dimostrazione.** Innanzitutto notiamo che  $\langle g \rangle \neq \emptyset$  in quanto  $g \in \langle g \rangle$ . Mostriamo che  $\langle g \rangle$  è un sottogruppo indotto da  $G$ .

(i) Se  $g^n, g^m \in \langle g \rangle$  allora  $g^n g^m = g^{n+m} \in \langle g \rangle$  in quanto  $n+m \in \mathbb{Z}$ ;

(ii) Sia  $g^n \in \langle g \rangle$ . Per definizione di potenza,  $g^{-n}$  è l'inverso di  $g^n$  e  $g^{-n} \in \langle g \rangle$  in quanto  $-n \in \mathbb{Z}$ .

Dunque per la proposizione 1.2.2 segue che  $\langle g \rangle \leq G$ . Inoltre notiamo che

$$g^n g^m = g^{n+m} = g^{m+n} = g^m g^n$$

dunque  $\langle g \rangle$  è abeliano.  $\square$

Notiamo che, al contrario di quanto succede con i numeri interi, può succedere che  $g^h = g^k$  per qualche  $h \neq k$ .

Supponiamo senza perdita di generalità  $k > h$ . In tal caso

$$\begin{aligned} g^{k-h} &= e_G \\ \implies g^{k-h+1} &= g^{k-h} \cdot g \\ &= e_G \cdot g \\ &= g. \end{aligned}$$

Dunque il sottogruppo generato da  $g$  non è infinito, ovvero

$$|\langle g \rangle| < +\infty.$$

Questo ci consente di parlare di ordine di un elemento di un gruppo:

**Definizione 1.3.4** **Ordine di un elemento di un gruppo.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $x \in G$ . Allora si dice ordine di  $x$  in  $G$  il numero

$$\text{ord}_G(x) := \min \left\{ k > 0 : x^k =_G e \right\}.$$

Se l'insieme  $\{ k > 0 : x^k = e_G \}$  è vuoto, allora per definizione

$$\text{ord}_G(x) := +\infty.$$

Quando il gruppo di cui stiamo parlando sarà evidente scriveremo semplicemente  $\text{ord}(x)$ .

**Proposizione 1.3.5** **Scrittura esplicita del sottogruppo generato.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $x \in G$  tale che  $\text{ord}_G(x) = d < +\infty$ . Allora valgono i seguenti due fatti:

(i) Il sottogruppo generato  $\langle x \rangle$  è

$$\langle x \rangle = \left\{ e, x, x^2, \dots, x^{d-1} \right\}.$$

Dunque in particolare  $|\langle x \rangle| = d$ .

(ii)  $x^n = e \iff d \mid n$ .

**Dimostrazione.** Dimostriamo le due affermazioni separatamente.

**PARTE 1.** Sicuramente vale che

$$\left\{ e, x, \dots, x^{d-1} \right\} \subseteq \langle x \rangle.$$

Dimostriamo che vale l'uguaglianza.

Sia  $k \in \mathbb{Z}$  qualsiasi. Allora  $x^k \in \langle x \rangle$ .

Dimostriamo che necessariamente  $x^k \in \{ e, x, \dots, x^{d-1} \}$ .

Per la divisione euclidea esisteranno  $q, r \in \mathbb{Z}$  tali che

$$k = qd + r \quad \text{con } 0 \leq r < d.$$

Allora sostituendo  $k = qd + r$  otteniamo

$$\begin{aligned} x^k &= x^{qd+r} \\ &= x^{qd} x^r \\ &= e^q x^r \\ &= x^r. \end{aligned}$$

Per ipotesi  $0 \leq r < d$ , dunque  $x^r \in \{ e, x, \dots, x^{d-1} \}$ . Dato che  $x^r = x^k$  concludiamo che

$$x^k \in \left\{ e, x, \dots, x^{d-1} \right\}$$

e quindi

$$\langle x \rangle = \left\{ e, x, \dots, x^{d-1} \right\}.$$

Ci rimane da mostrare che  $|\langle x \rangle| = d$ , ovvero che tutti gli elementi di  $\langle x \rangle$  sono distinti.

Supponiamo per assurdo che esistano  $a, b \in \mathbb{Z}$  con  $0 \leq a < b < d$  (senza perdita di generalità) tali che  $x^a = x^b$ .

Da questo segue che  $x^{b-a} = e$ , ma questo è assurdo poichè  $b - a < d$  e per definizione l'ordine è il minimo numero positivo per cui  $x^d = e$ .

Di conseguenza tutti gli elementi di  $\langle x \rangle$  sono distinti, ovvero  $|\langle x \rangle| = d$ .

**PARTE 2.** Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Sia  $n \in \mathbb{Z}$  tale che  $x^n = e$ .

Per divisione euclidea esistono  $q, r \in \mathbb{Z}$  tali che

$$n = qd + r \quad \text{con } 0 \leq r < d.$$

Dunque  $x^n = x^{qd+r} = x^r = e$ . Ma questo è possibile solo se  $r = 0$ , altrimenti andremmo contro la minimalità dell'ordine.

Dunque  $x = x^{qd}$ , ovvero  $d \mid n$ .

( $\Leftarrow$ ) Ovvio: se  $n = kd$  per qualche  $k \in \mathbb{Z}$  allora

$$x^n = x^{kd} = (x^d)^k = e^k = e.$$

□

**Definizione** **Gruppo ciclico.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo.

1.3.6

Allora  $G$  si dice *ciclico* se esiste un  $g \in G$  tale che

$$G = \langle g \rangle.$$

L'elemento  $g$  viene detto *generatore* del gruppo  $G$ .

Ad esempio  $\mathbb{Z}$  è un gruppo ciclico, in quanto  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ , come lo è  $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$ . Questi due gruppi sono anche infiniti, in quanto contengono un numero infinito di elementi.

Un esempio di gruppo ciclico finito è  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle [1]_n \rangle$ , che è finito in quanto  $\text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}([1]_n) = n$ .

**Teorema**

1.3.7

**Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo ciclico, ovvero  $G = \langle g \rangle$  per qualche  $g \in G$ . Sia inoltre  $H \leq G$  un sottogruppo.

Allora  $H$  è ciclico, ovvero esiste  $h \in \mathbb{Z}$  tale che  $H = \langle g^h \rangle$ .

**Dimostrazione.** Innanzitutto notiamo che  $e_G \in H$ .

Se  $H = \{ e_G \}$  allora  $H$  è ciclico, e  $H = \langle e_G \rangle$ .

Assumiamo  $\{ e \}_G \subset H$ . Allora esiste  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k \neq 0$  tale che  $g^k \in H$ . Dato che per  $(G_3)$  se  $g^k \in H$  allora  $g^{-k} \in H$  possiamo supporre senza perdita di generalità  $k > 0$ .

Consideriamo l'insieme  $S$  tale che

$$S := \{ h > 0 : g^h \in H \} \subseteq \mathbb{N}.$$

Avendo assunto  $k \in S$  sappiamo che  $S \neq \emptyset$ , dunque per il principio del minimo  $S$  ammette minimo.

Sia  $h_0 = \min S$ . Mostro che  $H = \langle g^{h_0} \rangle$ .

( $\supseteq$ ) Per ipotesi  $g^{h_0} \in H$ .

Dato che  $H$  è un sottogruppo di  $G$  tutte le potenze intere di  $g^{h_0}$  dovranno appartenere ad  $H$ , ovvero  $\langle g^{h_0} \rangle \subseteq H$ .

( $\subseteq$ ) Sia  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $g^n \in H$ . Dimostriamo che  $g^n \in \langle g^{h_0} \rangle$ .

Per divisione euclidea esistono  $q, r \in \mathbb{Z}$  tali che

$$n = qh_0 + r \quad \text{con } 0 \leq r < h_0.$$

Dunque

$$\begin{aligned} g^n &= g^{qh_0+r} \\ &= g^{qh_0} g^r. \end{aligned}$$

Moltiplicando entrambi i membri per  $g^{-qh_0}$  otteniamo

$$\iff g^n g^{-qh_0} = g^r.$$

Ma  $g^n \in H$  e  $g^{-qh_0} \in H$  (in quanto è una potenza intera di  $g^{h_0}$ ), dunque anche il loro prodotto  $g^r \in H$ .

Se  $r > 0$  allora esisterebbe una potenza di  $g$  con esponente positivo minore di  $h_0$  contenuto in  $H$ , che è assurdo in quanto abbiamo assunto che  $h_0$  sia il minimo dell'insieme  $S$ .

Segue che  $r = 0$ , ovvero  $n = qh_0$ , ovvero che  $g^n \in \langle g^{h_0} \rangle$ , ovvero  $H \subseteq \langle g^{h_0} \rangle$ .

Concludiamo quindi che  $H = \langle g^{h_0} \rangle$ , ovvero  $H$  è ciclico.  $\square$

Consideriamo i sottogruppi di  $\mathbb{Z}$ . Tramite la proposizione 1.2.6 abbiamo dimostrato che per ogni  $n \in \mathbb{Z}$  allora  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ . La prossima proposizione mostra che i sottogruppi della forma  $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle$  sono gli unici possibili.

**Proposizione 1.3.8** **Caratterizzazione dei sottogruppi di  $\mathbb{Z}$ .** *I sottogruppi di  $\mathbb{Z}$  sono tutti e solo della forma  $n\mathbb{Z}$  al variare di  $n \in \mathbb{N}$ .*

**Dimostrazione.** Nella proposizione 1.2.6 abbiamo mostrato che  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$  per ogni  $n \in \mathbb{Z}$ . Ora mostriamo che è sufficiente considerare  $n \in \mathbb{N}$  e che questi sono gli unici sottogruppi possibili.

Dato che  $\mathbb{Z}$  è ciclico (poiché  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ ) per il teorema 1.3.7 ogni suo sottogruppo dovrà essere ciclico, ovvero dovrà essere della forma  $\langle n \rangle$  per qualche  $n \in \mathbb{N}$ .

Per la proposizione 1.2.7: (ii) sappiamo che  $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$ , dunque possiamo considerare (senza perdita di generalità)  $n$  positivo o nullo, ovvero  $n \in \mathbb{N}$ .

Ma  $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$ , dunque i sottogruppi di  $\mathbb{Z}$  sono tutti e solo della forma  $n\mathbb{Z}$  al variare di  $n \in \mathbb{N}$ .  $\square$

### 1.3.1 Il gruppo ciclico $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

In questa sezione analizzeremo il gruppo ciclico  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ , anche definito da

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle [1]_n \rangle = \langle \bar{1} \rangle.$$

L'ordine di  $\bar{1}$  in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è  $n$ . Infatti

$$x \cdot \bar{1} = \bar{0}$$

$$\iff x \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\iff x = nk$$

con  $k \in \mathbb{Z}$ . La minima soluzione positiva a quest'equazione è per  $k = 1$ , dunque  $x = n$ . Per la proposizione 1.3.5: (i) sappiamo quindi che

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = |\bar{1}| = \text{ord}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\bar{1}) = n. \quad (2)$$

**Proposizione 1.3.9** **Ordine degli elementi di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .** *Sia  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  qualsiasi. Allora vale che*

$$\text{ord}(\bar{a}) = \frac{n}{(a, n)}$$

dove  $a \in \mathbb{Z}$  è un rappresentante della classe  $\bar{a}$ .

**Dimostrazione.** Per definizione di ordine

$$\text{ord}(\bar{a}) = \min \{ k > 0 : k\bar{a} = \bar{0} \}.$$

Si tratta quindi di trovare la minima soluzione positiva di  $ax \equiv 0 \pmod{n}$ . Divido entrambi i membri e il modulo per  $a$ , ottenendo

$$x \equiv 0 \pmod{\frac{n}{(n,a)}} \implies x = \frac{n}{(n,a)}t$$

al variare di  $t \in \mathbb{Z}$ .

Dato che siamo interessati alla minima soluzione positiva, questa è ottenuta per  $t = 1$ , da cui segue che

$$\text{ord}(\bar{a}) = \frac{n}{(n,a)}. \quad \square$$

**Corollario 1.3.10** **Conseguenze della proposizione 1.3.9.** Consideriamo il gruppo  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ . Valgono le seguenti affermazioni:

- (i)  $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}. \quad \text{ord}(\bar{a}) \mid n$ .
- (ii)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ha  $\varphi(n)$  generatori.
- (iii) Sia  $d \in \mathbb{Z}$  tale che  $d \mid n$ . Allora in  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ci sono esattamente  $\varphi(d)$  elementi di ordine  $d$ .

**Dimostrazione.** (i) Ovvio in quanto (per la proposizione 1.3.9)

$$\text{ord}(\bar{a}) = \frac{n}{(n,a)} \mid n.$$

(ii) Sia  $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Sappiamo che  $\bar{x}$  è un generatore di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  se

$$\langle \bar{x} \rangle = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

ovvero se la cardinalità di  $\langle \bar{x} \rangle$  è  $n$ .

Per la proposizione 1.3.9  $\text{ord}(\bar{x}) = \frac{n}{(n,x)}$ , dunque  $\bar{x}$  è un generatore se e solo se  $(n,x) = 1$ , ovvero se  $x$  è coprimo con  $n$ . Ma ci sono  $\varphi(n)$  numeri coprimi con  $n$ , dunque ci sono  $\varphi(n)$  generatori di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

(iii) Sia  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  tale che

$$\text{ord}(\bar{a}) = \frac{n}{(n,a)} = d.$$

Allora  $(n,a) = \frac{n}{d}$ , da cui segue che  $\frac{n}{d} \mid a$ .

Sia  $b \in \mathbb{Z}$  tale che  $a = \frac{n}{d}b$ . Dato che  $(n,a) = \frac{n}{d}$  segue che

$$\begin{aligned} \left(n, \frac{n}{d}b\right) &= \frac{n}{d} \\ \iff \left(\frac{n}{d}d, \frac{n}{d}b\right) &= \frac{n}{d} \\ \iff \frac{n}{d}(d,b) &= \frac{n}{d} \\ \iff (d,b) &= 1 \end{aligned}$$

ovvero se e solo se  $d$  e  $b$  sono coprimi.

Dunque segue che ho  $\varphi(d)$  scelte per  $b$ , ovvero ho  $\varphi(d)$  elementi di ordine  $d$ .  $\square$

Questo corollario ci consente di enunciare una proprietà della funzione  $\varphi(\cdot)$ .

**Corollario 1.3.11** **Espressione per  $n$  in termini di  $\varphi(n)$**  Sia  $n \in \mathbb{Z}$ . Allora vale che

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

**Dimostrazione.** Sia  $X_d$  l'insieme

$$X_d := \{ \bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \text{ord}(\bar{a}) = d \}.$$

Se  $d \nmid n$  per la proposizione 1.3.10: (i) segue che  $X_d = \emptyset$ .  
Dunque abbiamo che

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \bigsqcup_{d|n} X_d.$$

Sfruttando la proposizione 1.3.10: (iii) sappiamo che  $|X_d| = \varphi(d)$ , dunque passando alle cardinalità segue che

$$|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

□

Studiamo ora i sottogruppi di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Proposizione 1.3.12** **Caratterizzazione dei sottogruppi di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .** Studiamo il gruppo  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ .  
Valgono i due seguenti fatti:

- (i) Sia  $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Allora  $H$  è ciclico e  $|H| = d$  per qualche  $d \mid n$ .
- (ii) Sia  $d \in \mathbb{Z}$ ,  $d \mid n$ . Allora  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  ammette uno e un solo sottogruppo di ordine  $d$ .

**Dimostrazione.** (i) Sia  $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ; per il teorema 1.3.7 sappiamo che  $H$  deve essere ciclico, ovvero  $H = \langle \bar{h} \rangle$  per qualche  $\bar{h} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Sia  $d = \text{ord}(\bar{h})$ . Allora per il corollario 1.3.10: (i) segue che

$$|H| = \text{ord}(\bar{h}) = d \mid n.$$

(ii) Sia  $H_d$  l'insieme

$$H_d = \left\{ \bar{0}, \frac{\bar{n}}{d}, 2\frac{\bar{n}}{d}, \dots, (d-1)\frac{\bar{n}}{d} \right\}.$$

Mostriamo innanzitutto che  $H_d = \left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle$ .

Infatti ovviamente  $H_d \subseteq \left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle$ . Per mostrare che sono uguali basta notare che

$$\left| \left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle \right| = \text{ord}\left(\frac{\bar{n}}{d}\right) = \frac{n}{\left(\frac{n}{d}, n\right)} = \frac{n}{\left(\frac{n}{d}, \frac{n}{d}d\right)} = \frac{n}{\frac{n}{d}(1, d)} = d$$

dunque i due insiemi sono finiti, hanno la stessa cardinalità e il primo è incluso nel secondo, da cui segue che sono uguali.

Sia ora  $H \leq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  tale che  $|H| = d$ . Per il teorema 1.3.7 segue che  $H = \langle \bar{x} \rangle$  per qualche  $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  tale che  $\text{ord}(\bar{x}) = d$ .

Seguendo la dimostrazione di 1.3.10: (iii) possiamo scrivere  $\bar{x} = \frac{\bar{n}}{d}b$  con  $b \in \mathbb{Z}$  tale che  $(b, d) = 1$ .



Ma  $H_d = \left\langle \frac{\bar{n}}{d} \right\rangle$  contiene tutti i multipli di  $\frac{\bar{n}}{d}$ , dunque deve contenere anche  $\bar{x}$ .

Dunque dato che  $\bar{x} \in H_d$  segue che  $H = \langle \bar{x} \rangle \subseteq H_d$ . Ma gli insiemi  $H$  e  $H_d$  hanno la stessa cardinalità, dunque  $H = H_d$ , ovvero vi è un solo sottogruppo di ordine  $d$ .  $\square$

## 1.4 OMOMORFISMI DI GRUPPI

**Definizione 1.4.1 Omomorfismo tra gruppi.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi. Allora la funzione

$$f : G_1 \rightarrow G_2$$

si dice *omomorfismo di gruppi* se per ogni  $x, y \in G_1$  vale che

$$f(x * y) = f(x) \star f(y). \quad (3)$$

L'insieme di tutti gli omomorfismi da  $G_1$  a  $G_2$  si indica con  $\text{Hom}(G_1, G_2)$ .

**ESEMPIO 1.4.2.** Ad esempio la funzione

$$\begin{aligned} \pi_n : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ a &\mapsto [a]_n \end{aligned}$$

è un omomorfismo tra i gruppi  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . Infatti vale che

$$\pi_n(a + b) = \overline{a + b} = \overline{a} + \overline{b} = \pi_n(a) + \pi_n(b).$$

Questo particolare omomorfismo si dice *riduzione modulo n*.

**ESEMPIO 1.4.3.** Un altro esempio è la funzione

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{R}, +) &\rightarrow (\mathbb{R}^+, \cdot) \\ x &\mapsto e^x. \end{aligned}$$

Infatti vale che

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x e^y = f(x)f(y).$$

**Proposizione 1.4.4 Composizione di omomorfismi.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$ ,  $(G_3, \cdot)$  tre gruppi e siano  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  e  $\psi : G_2 \rightarrow G_3$  omomorfismi.

Allora la funzione  $\psi \circ \varphi : G_1 \rightarrow G_3$  è un omomorfismo tra i gruppi  $G_1$  e  $G_3$ .

**Dimostrazione.** Siano  $h, k \in G_1$  e dimostriamo che

$$(\psi \circ \varphi)(h * k) = (\psi \circ \varphi)(h) \cdot (\psi \circ \varphi)(k).$$

Infatti vale che

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi)(h * k) &= \psi(\varphi(h * k)) && (\varphi \text{ omo.}) \\ &= \psi(\varphi(h) \star \varphi(k)) && (\psi \text{ omo.}) \\ &= \psi(\varphi(h)) \cdot \psi(\varphi(k)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(h) \cdot (\psi \circ \varphi)(k) \end{aligned}$$

che è la tesi.  $\square$

Dato che un omomorfismo è una funzione, possiamo definire i soliti concetti di immagine e controimmagine.

**Definizione 1.4.5** **Immagine e controimm. di un omomorf. attraverso un insieme.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi e sia  $f : G_1 \rightarrow G_2$  un omomorfismo. Siano  $H \leq G_1$ ,  $K \leq G_2$ . Allora definiamo l'insieme

$$f(H) := \{ f(h) \in G_2 : h \in H \} \subseteq G_2$$

detto *immagine di f attraverso H*, e l'insieme

$$f^{-1}(K) := \{ g \in G_1 : f(g) \in K \} \subseteq G_1$$

detto *controimmagine di f attraverso K*.

Definiamo inoltre l'*immagine dell'omomorfismo f* come

$$\text{Im } f := f(G_1) = \{ f(g) \in G_2 : g \in G_1 \}.$$

Per gli omomorfismi definiamo inoltre un concetto nuovo, il *nucleo* o *kernel* dell'omomorfismo.

**Definizione 1.4.6** **Kernel di un omomorfismo.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi e sia  $f : G_1 \rightarrow G_2$  un omomorfismo. Allora si dice *kernel* o *nucleo* dell'omomorfismo  $f$  l'insieme

$$\ker f := \{ g \in G_1 : f(g) = e_2 \} \subseteq G_1.$$

Osserviamo che possiamo anche esprimere il nucleo di un omomorfismo in termini della controimmagine del sottogruppo banale  $\{ e_2 \}$ :

$$\ker f = f^{-1}(\{ e_2 \}).$$

**Proposizione 1.4.7** **Proprietà degli omomorfismi.** Siano  $(G_1, \cdot)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi e sia  $f : G_1 \rightarrow G_2$  un omomorfismo. Allora valgono le seguenti affermazioni.

- (i)  $f(e_1) = e_2$ ;
- (ii)  $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ ;
- (iii) per ogni  $H \leq G_1$  vale che  $f(H) \leq G_2$ ;
- (iv) per ogni  $K \leq G_2$  vale che  $f^{-1}(K) \leq G_1$ ;
- (v)  $f(G_1) \leq G_2$  e  $\ker f \leq G_1$ ;
- (vi)  $f$  è iniettivo se e solo se  $\ker f = \{ e_1 \}$ .

**Dimostrazione.** (i)  $f(e_1) \stackrel{(\text{el. neutro})}{=} f(e_1 \cdot e_1) \stackrel{(\text{omo.})}{=} f(e_1) \star f(e_1)$ .

Applicando la legge di cancellazione 1.1.9: (v) otteniamo

$$e_2 = f(e_1).$$

(ii) Sfruttando il punto 1.4.7: (i) sappiamo che

$$e_2 = f(e_1) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \star f(x^{-1})$$

$$e_2 = f(e_1) = f(x^{-1} \cdot x) = f(x^{-1}) \star f(x).$$

Dalla prima segue che  $f(x^{-1})$  è inverso a destra di  $f(x)$ , dalla seconda che  $f(x^{-1})$  è inverso a sinistra di  $f(x)$ .

Dunque concludiamo che  $f(x^{-1})$  è inverso di  $f(x)$ , ovvero

$$f(x)^{-1} = f(x^{-1}).$$

- (iii) Sia  $H \leq G_1$ . Dato che  $H \neq \emptyset$  esisterà un  $h \in H$ , dunque  $f(H)$  non può essere vuoto in quanto dovrà contenere  $f(h)$  (sicuramente  $e_2 \in f(H)$ ).

Dunque per la proposizione 1.2.2 basta mostrare che  $f(H)$  è chiuso rispetto al prodotto e che l'inverso di ogni elemento di  $f(H)$  è ancora in  $f(H)$ .

- (1) Mostriamo che se  $x, y \in f(H)$  allora  $x \star y \in f(H)$ .

Per definizione di  $f(H)$  dovranno esistere  $h_x, h_y \in H$  tali che  $x = f(h_x)$  e  $y = f(h_y)$ . Allora

$$\begin{aligned} x \star y &= f(h_x) \star f(h_y) && (f \text{ è omo}) \\ &= f(h_x \cdot h_y) && H \text{ è sottogr. di } G_1 \\ &\in f(H). \end{aligned}$$

- (2) Mostriamo che se  $x \in f(H)$  allora  $x^{-1} \in f(H)$ .

Per definizione di  $f(H)$  dovrà esistere  $h \in H$  tale che  $x = f(h)$ . Dato che  $H \leq G_1$  allora  $h^{-1} \in H$ .

Dunque  $f(h^{-1}) \in f(H)$ , ma per il punto 1.4.7: (ii) sappiamo che

$$f(h^{-1}) = f(h)^{-1} = x^{-1} \in f(H).$$

Dunque  $f(H) \leq G_2$ .

- (iv) Sia  $K \leq G_2$ . Dato che  $e_2 \in K$ , sicuramente  $f^{-1}(K) \neq \emptyset$ , in quanto  $e_1 = f^{-1}(e_2) \in f^{-1}(K)$ .

Dunque per la proposizione 1.2.2 basta mostrare che  $f^{-1}(K)$  è chiuso rispetto al prodotto e che l'inverso di ogni elemento di  $f^{-1}(K)$  è ancora in  $f^{-1}(K)$ .

- (1) Mostriamo che se  $x, y \in f^{-1}(K)$  allora  $x \star y \in f^{-1}(K)$ .

Per definizione di  $f^{-1}(K)$  sappiamo che

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(K) &\iff f(x) \in K \\ y \in f^{-1}(K) &\iff f(y) \in K. \end{aligned}$$

Dato che  $K \leq G_2$  allora segue che

$$f(x) \star f(y) = f(x \star y) \in K$$

ovvero  $x \star y \in f^{-1}(K)$ .

- (2) Mostriamo che se  $x \in f^{-1}(K)$  allora  $x^{-1} \in f^{-1}(K)$ .

Per definizione di  $f^{-1}(K)$  sappiamo che

$$x \in f^{-1}(K) \iff f(x) \in K.$$

Dato che  $K \leq G_2$  segue che  $f(x)^{-1} \in K$ , ma per il punto 1.4.7: (ii) sappiamo che  $f(x)^{-1} = f(x^{-1})$ , dunque

$$f(x^{-1}) \in K \implies x^{-1} \in f^{-1}(K).$$

Dunque  $f^{-1}(K) \leq G_1$ .

- (v) Dato che  $G_1 \leq G_1$  per il punto 1.4.7: (iii) segue che  $\text{Im } f = f(G_1) \leq G_2$ .

Per definizione  $\ker f = f^{-1}(\{e_2\})$ ; inoltre  $\{e_1\} \leq G_2$ , dunque per il punto 1.4.7: (iv) segue che  $\ker f \leq G_1$ .

- (vi) Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo che  $f$  sia iniettivo. Allora  $|f^{-1}(\{e_2\})| = 1$ .

Tuttavia sicuramente  $e_1 \in f^{-1}(\{e_2\}) = \ker f$  (in quanto  $f(e_1) = e_2$ ), dunque dovrà necessariamente essere  $\ker f = \{e_1\}$ .

( $\Leftarrow$ ) Supponiamo che  $\ker f = \{e_1\}$ .

Siano  $x, y \in G_1$  tali che  $f(x) = f(y)$ . Moltiplicando entrambi i membri (ad esempio a destra) per  $f(y)^{-1} \in G_2$  otteniamo

$$\begin{aligned} f(x) \star f(y)^{-1} &= f(y) \star f(y)^{-1} && \text{(per la 1.4.7: (ii))} \\ \iff f(x) \star f(y)^{-1} &= e_2 && \text{(f è omomorf.)} \\ \iff f(x \star y^{-1}) &= e_2 && \text{(def. di } \ker f) \\ \iff x \star y^{-1} &\in \ker f && \text{(ipotesi: } \ker f = \{e_1\}) \\ \iff x \star y^{-1} &= e_1 && \text{(moltiplico a dx per y)} \\ \iff x &= y. \end{aligned}$$

Dunque  $f(x) = f(y)$  implica che  $x = y$ , ovvero  $f$  è iniettivo.  $\square$

**Proposizione 1.4.8 Omomorfismi e ordine.** Siano  $(G_1, \star), (G_2, \star)$  due gruppi e sia  $f : G_1 \rightarrow G_2$  omomorfismo.

Allora valgono le seguenti due affermazioni

- (i) per ogni  $x \in G$  vale che  $\text{ord}_{G_2}(f(x)) \mid \text{ord}_{G_1}(x)$ ;
- (ii)  $f$  è iniettivo se e solo se  $\text{ord}_{G_2}(f(x)) = \text{ord}_{G_1}(x)$ .

**Dimostrazione.** Innanzitutto diciamo che se  $\text{ord}(x) = +\infty$  allora  $\text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x)$  qualunque sia  $\text{ord}(f(x))$  (anche se è  $+\infty$ ).

- (i) Sia  $x \in G_1$ . Se  $\text{ord}(x) = +\infty$  allora abbiamo finito, dunque supponiamo  $\text{ord}(x) = n$  per qualche  $n \in \mathbb{Z}, n > 0$ .

Per definizione di ordine questo significa che  $x^n = e_1$ . Allora

$$\begin{aligned} f(x)^n &= f(x) \star \cdots \star f(x) && \text{(f è omo.)} \\ &= f(x^n) \\ &= f(e_1) && \text{(prop. 1.4.7: (i))} \\ &= e_2. \end{aligned}$$

Dunque  $f(x)^n = e_2$ , quindi per la proposizione 1.3.5: (ii) segue che

$$\text{ord}(f(x)) \mid n = \text{ord}(x).$$

- (ii) Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo  $f$  iniettiva.

- Se  $\text{ord}(f(x)) = +\infty$  allora per il punto 1.4.8: (i) sappiamo che  $+\infty \mid \text{ord}(x)$ , dunque  $\text{ord}(x) = +\infty = \text{ord}(f(x))$ .
- Se  $\text{ord}(f(x)) = m < +\infty$  allora

$$f(x)^m = e_2 \iff f(x) \star \cdots \star f(x) = e_2 \iff f(x^m) = e_2,$$

ovvero  $x^m \in \ker f$ .

Ma  $f$  è iniettiva, dunque per 1.4.7: (vi)  $\ker f = \{ e_1 \}$ , da cui segue che  $x^m = e_1$ . Dunque per la proposizione 1.3.5: (ii) segue che

$$\text{ord}(x) \mid m = \text{ord}(f(x)).$$

Inoltre per il punto 1.4.8: (i) sappiamo che  $\text{ord}(f(x)) \mid \text{ord}(x)$ , dunque  $\text{ord}(f(x)) = \text{ord}(x)$ .

( $\Leftarrow$ ) Sia  $x \in \ker f$ , ovvero  $f(x) = e_2$ . Allora

$$1 = \text{ord}_{G_2}(e_2) = \text{ord}(f(x)) \stackrel{\text{hp.}}{=} \text{ord}_{G_1}(x).$$

Ma  $\text{ord}(x) = 1$  se e solo se  $x = e_1$ , ovvero  $\ker f = \{ e_1 \}$ , dunque per la proposizione 1.4.7: (vi)  $f$  è iniettiva.  $\square$

#### 1.4.1 Isomorfismi

Gli omomorfismi bigettivi sono particolarmente importanti e vanno sotto il nome di *isomorfismi*.

**Definizione 1.4.9** **Isomorfismo.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, *)$  due gruppi e sia  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  un omomorfismo.

Allora se  $\varphi$  è biiettivo si dice che  $\varphi$  è un *isomorfismo*. Inoltre i gruppi  $G_1$  e  $G_2$  si dicono *isomorfi* e si scrive  $G_1 \simeq G_2$ .

**Corollario 1.4.10** **Transitività della relazione di isomorfismo.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, *)$ ,  $(G_3, \cdot)$  tre gruppi tali che  $G_1 \simeq G_2$  e  $G_2 \simeq G_3$ . Allora  $G_1 \simeq G_3$ .

**Dimostrazione.** Dato che  $G_1 \simeq G_2$  e  $G_2 \simeq G_3$  dovranno esistere due isomorfismi  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  e  $\psi : G_2 \rightarrow G_3$ .

Per la proposizione 1.4.4 la funzione  $\psi \circ \varphi$  è ancora un isomorfismo; inoltre la composizione di funzioni bigettive è ancora bigettiva, da cui segue che  $\psi \circ \varphi$  è un isomorfismo tra  $G_1$  e  $G_3$  e quindi  $G_1 \simeq G_3$ .  $\square$

Due gruppi isomorfi sono sostanzialmente lo stesso gruppo, a meno di "cambiamenti di forma". In particolare gli isomorfismi inducono naturalmente una bigezione sui sottogruppi dei due gruppi isomorfi, come ci dice la seguente proposizione.

**Proposizione 1.4.11** **Bigezione tra i sottogruppi di gruppi isomorfi.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, *)$  due gruppi e sia  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  un isomorfismo. Siano inoltre  $\mathcal{H}$  e  $\mathcal{K}$  tali che

$$\mathcal{H} = \{ H : H \leq G_1 \}, \quad \mathcal{K} = \{ K : K \leq G_2 \}.$$

Allora la funzione

$$\begin{aligned} f : \mathcal{H} &\rightarrow \mathcal{K} \\ H &\mapsto \varphi(H) \end{aligned}$$

è bigettiva.

**Dimostrazione.** Siccome  $H \leq G_1$  e  $\varphi$  è un omomorfismo, allora  $f(H) = \varphi(H) \leq G_2$  (ovvero  $f(H) \in \mathcal{K}$ ) per la proposizione 1.4.7: (iii); dunque  $f$  è ben definita.

Definiamo ora una seconda funzione

$$\begin{aligned} g : \mathcal{K} &\rightarrow \mathcal{H} \\ K &\mapsto \varphi^{-1}(K). \end{aligned}$$

Anch'essa ben definita per la proposizione 1.4.7: (iv).

Consideriamo ora le funzioni  $g \circ f$  e  $f \circ g$ . Per la bigettività di  $\varphi$  vale che

$$\begin{aligned} (g \circ f)(H) &= \varphi^{-1}(\varphi(H)) = H & \forall H \in \mathcal{H} \\ (f \circ g)(K) &= \varphi(\varphi^{-1}(K)) = K & \forall K \in \mathcal{K} \end{aligned}$$

ovvero la funzione  $f$  è bigettiva e definisce quindi una bigezione tra l'insieme dei sottogruppi di  $G_1$  e l'insieme dei sottogruppi di  $G_2$ .  $\square$

**Teorema**  
**1.4.12**

**Isomorfismi di gruppi ciclici.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo ciclico. Allora

- (i) se  $|G| = +\infty$  segue che  $G \simeq \mathbb{Z}$ ;
- (ii) se  $|G| = n < +\infty$  segue che  $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Dimostrazione.** Per ipotesi  $G = \langle g \rangle = \{ g^k : k \in \mathbb{Z} \}$  per qualche  $g \in G$ .

- (i) Se  $|G| = +\infty$  allora  $|\langle g \rangle| = +\infty$ , ovvero per ogni  $k, h \in \mathbb{Z}$  con  $k \neq h$  segue che  $g^k \neq g^h$ . Sia allora

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ k &\mapsto g^k. \end{aligned}$$

Per definizione di  $G = \langle g \rangle$  questa funzione è surgettiva. Dato che  $G$  ha ordine infinito segue che questa funzione è iniettiva. Mostriamo che è un omomorfismo.

$$\varphi(k+h) = g^{k+h} = g^k g^h = \varphi(k)\varphi(h).$$

Dunque  $\varphi$  è un isomorfismo e  $G \simeq \mathbb{Z}$ .

- (ii) Dato che  $|G| = n$  per la proposizione 1.3.5 sappiamo che  $\text{ord}(g) = n$ , ovvero che  $g^n = e_G$ . Sia allora

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow G \\ \bar{a} &\mapsto g^a \end{aligned}$$

dove  $a$  è un generico rappresentante della classe  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

- Mostriamo che  $\varphi$  è ben definita. Siano  $a, b \in \bar{a}$  e mostriamo che  $\varphi(\bar{a}) = \varphi(\bar{b})$ , ovvero che  $g^a = g^b$ .

Per ipotesi  $a \equiv b \pmod{n}$ , ovvero  $a = b + nk$  per qualche  $k \in \mathbb{Z}$ . Dunque

$$g^a = g^{b+nk} = g^b (g^n)^k = g^b$$

poiché  $g^n = e_G$ .

- Mostriamo che  $\varphi$  è un omomorfismo.

$$\varphi(\bar{a} + \bar{b}) = g^{a+b} = g^a g^b = \varphi(\bar{a})\varphi(\bar{b}).$$

- Mostriamo che  $\varphi$  è surgettiva.

$$\text{Im}(\varphi) = \varphi(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{g^0, g^1, \dots, g^n\} = \langle g \rangle = G.$$

Ma  $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = |G|$ , dunque per cardinalità  $\varphi$  è anche iniettiva e dunque è bigettiva. Quindi  $\varphi$  è un isomorfismo e  $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

□

**Corollario** **Sottogruppi del gruppo ciclico.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo ciclico.

**1.4.13**

- (i) Se  $G$  è infinito e  $H \leq G$  allora segue che  $H = \langle g^n \rangle$  per qualche  $g \in G$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .
- (ii) Se  $G$  ha ordine  $n$  finito, allora  $G$  ammette uno e un solo sottogruppo per ogni divisore di  $n$ . Inoltre se  $H \leq G$  allora  $H$  è ciclico.

**Dimostrazione.** Ricordiamo che

1. i sottogruppi di  $\mathbb{Z}$  sono tutti e soli della forma  $n\mathbb{Z}$  al variare di  $n \in \mathbb{N}$  per la [Proposizione 1.3.8](#),
2. i sottogruppi di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  hanno tutti cardinalità che divide  $n$  per la [punto 1.3.12: \(i\)](#). Inoltre, per ogni  $d$  che divide  $n$  vi è uno e un solo sottogruppo di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  di cardinalità  $d$ , per la [punto 1.3.12: \(ii\)](#).
3. per la [Proposizione 1.4.11](#) sappiamo che se  $f : G_1 \rightarrow G_2$  è un isomorfismo, allora

$$\{K : K \leq G_2\} = \{f(H) : H \leq G_1\}.$$

Mostriamo le due affermazioni separatamente.

- (i) Se  $G$  è ciclico ed infinito allora per il [Teorema 1.4.12](#) segue che esiste un isomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ k &\mapsto g^k. \end{aligned}$$

Per la bigezione tra i sottogruppi di  $\mathbb{Z}$  e  $G$  allora ogni sottogruppo di  $G$  dovrà essere scritto come immagine di qualche sottogruppo di  $\mathbb{Z}$ , ma come abbiamo osservato sopra i sottogruppi di  $\mathbb{Z}$  sono tutti e solo della forma  $n\mathbb{Z}$  per qualche  $n \in \mathbb{N}$ .

Dunque i sottogruppi di  $G$  sono

$$\{K : K \leq G\} = \{\varphi(n\mathbb{Z}) = \langle g^n \rangle : n \in \mathbb{N}\}.$$

- (ii) Se  $G$  è ciclico ed è finito, allora  $G = \langle g \rangle$  per qualche  $g \in G$ , e inoltre  $|G| = \text{ord}(g) = n$  per qualche  $n$  finito.

Allora per il [Teorema 1.4.12](#) esiste un isomorfismo

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &\rightarrow G \\ \bar{a} &\mapsto g^a. \end{aligned}$$

Per l'osservazione 2) sopra i sottogruppi di  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sono tutti e solo della forma  $\langle \bar{d} \rangle$ , dunque per l'osservazione 3) segue che

$$\{K : K \leq G\} = \{\psi(\langle \bar{d} \rangle) = \langle g^d \rangle : d \mid n\}. \quad \square$$

**Definizione 1.4.14 Automorfismo.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $\varphi : G \rightarrow G$  un isomorfismo. Allora  $\varphi$  viene detto *automorfismo* e l'insieme di tutti gli automorfismi di un gruppo  $G$  si denota con  $\text{Aut}(G)$ .

**Proposizione 1.4.15 Gruppo degli automorfismi.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo. Allora la struttura  $(\text{Aut}(G), \circ)$  (dove  $\circ$  è la composizione di funzioni) è un gruppo.

**Dimostrazione.** Mostriamo che valgono gli assiomi di gruppo.

**CHIUSURA** La composizione di funzioni è un'operazione su  $\text{Aut}(G)$  in quanto la composizione di due omomorfismi è un omomorfismo (per la [Proposizione 1.4.4](#)) e la composizione di due funzioni bigettive è ancora bigettiva, dunque la composizione di due automorfismi è ancora un automorfismo.

**ASSOCIATIVITÀ** La composizione di funzioni è associativa.

**ELEMENTO NEUTRO** L'elemento neutro di  $\text{Aut}(G)$  è

$$\text{id}_G : G \rightarrow G$$

$$g \mapsto g.$$

Infatti  $\text{id}_G$  è un automorfismo di  $G$  e inoltre per ogni  $f \in \text{Aut}(G)$  vale che

$$\text{id}_G \circ f = f = f \circ \text{id}_G.$$

**INVERTIBILITÀ** Le funzioni in  $\text{Aut}(G)$  sono bigettive, dunque invertibili, e le loro inverse sono ancora automorfismi.

Dunque  $(\text{Aut}(G), \circ)$  è un gruppo.  $\square$

#### 1.4.2 Omomorfismi di gruppi ciclici

Studiamo ora gli insiemi  $\text{Hom}(G_1, G_2)$  dove  $G_1$  e  $G_2$  sono gruppi ciclici. Per il [Teorema 1.4.12](#) è sufficiente studiare gli omomorfismi tra i gruppi  $\mathbb{Z}$  e  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  (con  $n \in \mathbb{N}$  qualunque).

**OMOMORFISMI CON DOMINIO  $\mathbb{Z}$**  Consideriamo l'insieme  $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G)$  dove  $(G, \cdot)$  è un gruppo ciclico qualunque (quindi può essere isomorfo a  $\mathbb{Z}$  oppure a  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  per qualche  $n \in \mathbb{N}$ ).

Sia  $g := f(1)$ . Allora possiamo mostrare per induzione che  $f(n) = g^n$  per ogni  $n \geq 0$ . Per i negativi siccome  $f$  è un omomorfismo vale che

$$f(-n) = f(n)^{-1} = (g^n)^{-1} = g^{-n},$$

da cui segue che gli omomorfismi  $\mathbb{Z} \rightarrow G$  sono tutti della forma

$$f(k) = g^k \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

e sono tutti identificati univocamente dal valore di  $f(1)$ .

Viceversa, per ogni  $g \in G$  esiste un omomorfismo

$$\varphi_g : \mathbb{Z} \rightarrow G$$

$$k \mapsto g^k.$$

Questa funzione è un omomorfismo poiché

$$\varphi_g(k_1 + k_2) = g^{k_1 + k_2} = g^{k_1} g^{k_2} = \varphi_g(k_1) \varphi_g(k_2).$$

Vi è dunque una bigezione tra  $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G)$  e  $G$ , data dalle due mappe

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \leftrightarrow G$$

$$f \mapsto f(1)$$

$$\varphi_g \mapsto g.$$



## 1.4.3 Prodotto diretto di gruppi

**Definizione 1.4.16** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi. Consideriamo il loro prodotto cartesiano

$$G_1 \times G_2 = \{ (g_1, g_2) : g_1 \in G_1, g_2 \in G_2 \}$$

e un'operazione  $\cdot$  su  $G_1 \times G_2$  tale che

$$\begin{aligned} \cdot : (G_1 \times G_2) \times (G_1 \times G_2) &\rightarrow (G_1 \times G_2) \\ ((x, y), (z, w)) &\mapsto (x * z, y \star w). \end{aligned}$$

La struttura  $(G_1 \times G_2, \cdot)$  si dice *prodotto diretto dei gruppi*  $G_1$  e  $G_2$ .

**Proposizione 1.4.17** **Il prodotto diretto di gruppi è un gruppo.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi. Allora il prodotto diretto  $(G_1 \times G_2, \cdot)$  è un gruppo.

**Dimostrazione.** Sappiamo già che  $\cdot$  è un'operazione su  $G_1 \times G_2$ , quindi basta mostrare i tre assiomi di gruppo.

**ASSOCIATIVITÀ** Siano  $(x, y), (z, w), (h, k) \in G_1 \times G_2$ . Mostriamo che vale la proprietà associativa.

$$\begin{aligned} (x, y) \cdot ((z, w) \cdot (h, k)) & \quad (\text{def. di } \cdot) \\ = (x, y) \cdot (z * h, w \star k) & \quad (\text{def. di } \cdot) \\ = (x * (z * h), y \star (w \star k)) & \quad (\text{ass. di } * \text{ e } \star) \\ = ((x * z) * h, (y \star w) \star k) \\ = (x * z, y \star w) \cdot (h, k) \\ = ((x, y) \cdot (z, w)) \cdot (h, k). \end{aligned}$$

**ELEMENTO NEUTRO** Siano  $e_1 \in G_1, e_2 \in G_2$  gli elementi neutri dei due gruppi. Mostro che  $(e_1, e_2)$  è l'elemento neutro del prodotto diretto.

Sia  $(x, y) \in G_1 \times G_2$  qualsiasi. Allora

$$\begin{aligned} (x, y) \cdot (e_1, e_2) &= (x * e_1, y \star e_2) = (x, y) \\ (e_1, e_2) \cdot (x, y) &= (e_1 * x, e_2 \star y) = (x, y). \end{aligned}$$

**INVERTIBILITÀ** Sia  $(x, y) \in G_1 \times G_2$ . Mostriamo che  $(x, y)$  è invertibile e il suo inverso è  $(x^{-1}, y^{-1}) \in G_1 \times G_2$ , dove  $x^{-1}$  è l'inverso di  $x$  in  $G_1$  e  $y^{-1}$  è l'inverso di  $y$  in  $G_2$ .

$$\begin{aligned} (x, y) \cdot (x^{-1}, y^{-1}) &= (x * x^{-1}, y \star y^{-1}) = (e_1, e_2) \\ (x^{-1}, y^{-1}) \cdot (x, y) &= (x^{-1} * x, y^{-1} \star y) = (e_1, e_2). \end{aligned}$$

Dunque il prodotto diretto  $(G_1 \times G_2, \cdot)$  è un gruppo.  $\square$

**Proposizione 1.4.18** **Il centro del prodotto diretto è il prodotto diretto dei centri.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi e sia  $(G_1 \times G_2, \cdot)$  il loro prodotto diretto. Allora vale che

$$Z(G_1 \times G_2) = Z(G_1) \times Z(G_2).$$

**Dimostrazione.** Per definizione di centro sappiamo che

$$\begin{aligned} Z(G_1 \times G_2) &= \{ (x, y) \in G_1 \times G_2 : \\ & (g_1, g_2) \cdot (x, y) = (x, y) \cdot (g_1, g_2) \quad \forall (g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \}. \end{aligned}$$

Sia  $(x, y) \in Z(G_1 \times G_2)$ . Allora per ogni  $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$  vale che

$$\begin{aligned} (g_1, g_2) \cdot (x, y) &= (x, y) \cdot (g_1, g_2) \\ \iff (g_1 * x, g_2 * y) &= (x * g_1, y * g_2) \\ \iff g_1 * x = x * g_1 \text{ e } g_2 * y &= y * g_2 \\ \iff x \in Z(G_1) \text{ e } y \in Z(G_2) \\ \iff (x, y) &\in Z(G_1) \times Z(G_2). \end{aligned}$$

Seguendo la catena di equivalenze al contrario segue la tesi.  $\square$

**Proposizione 1.4.19 Ordine nel prodotto diretto.** Siano  $(G_1, *)$ ,  $(G_2, \star)$  due gruppi e sia  $(G_1 \times G_2, \cdot)$  il loro prodotto diretto. Sia  $(x, y) \in G_1 \times G_2$ . Allora vale che

$$\text{ord}_{G_1 \times G_2}((x, y)) = [\text{ord}_{G_1}(x), \text{ord}_{G_2}(y)].$$

**Dimostrazione.** Sia  $n = \text{ord}(x)$ ,  $m = \text{ord}(y)$  e  $d = \text{ord}((x, y))$ . Mostriamo che  $d = [n, m]$ .

$d \mid [n, m]$  Vale che

$$(x, y)^{[n, m]} = (x^{[n, m]}, y^{[n, m]}).$$

Siccome  $\text{ord}(x) = n \mid [n, m]$  e stessa cosa per  $\text{ord}(y) = m$ , per la Proposizione 1.3.5: (ii) segue che

$$(x^{[n, m]}, y^{[n, m]}) = (e_1, e_2)$$

da cui (per la Proposizione 1.3.5: (ii)) segue che  $d \mid [n, m]$ .

$[n, m] \mid d$  Per definizione di potenza intera nel prodotto diretto sappiamo che  $(x, y)^d = (x^d, y^d)$ . Inoltre dato che  $d$  è l'ordine di  $(x, y)$  segue che  $(x, y)^d = (e_1, e_2)$ . Dunque

$$\begin{aligned} x^d &= e_1, y^d = e_2 \\ \iff n \mid d, m \mid d \\ \iff [n, m] \mid d. \end{aligned}$$

Dunque  $d = [n, m]$ , ovvero la tesi.  $\square$

**Teorema 1.4.20 Teorema Cinese del Resto (III forma.)** Siano  $n, m \in \mathbb{Z}$  entrambi non nulli. Allora vale che

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \iff (n, m) = 1.$$

**Dimostrazione.** Sia  $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . Siccome  $|G| = nm$  in virtù del Teorema 1.4.12 per mostrare che  $G \simeq \mathbb{Z}/nm\mathbb{Z}$  è sufficiente mostrare che  $G$  è ciclico.

Un gruppo è ciclico se e solo se esiste  $g \in G$  tale che  $\text{ord}(g) = |G|$ : infatti per ogni  $g \in G$  vale che  $\langle g \rangle \leq G$ , dunque se i due insiemi hanno anche la stessa cardinalità devono essere uguali.

Siano  $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $\bar{y} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  tali che  $g = (\bar{x}, \bar{y})$ . Per la Proposizione 1.4.19 vale che

$$\text{ord}(g) = \text{ord}((\bar{x}, \bar{y})) = [\text{ord}(\bar{x}), \text{ord}(\bar{y})].$$

D'altro canto però  $\text{ord}(\bar{x}) = \frac{n}{(n, x)}$ ,  $\text{ord}(\bar{y}) = \frac{m}{(m, y)}$  (dove  $x, y$  sono rappresentanti qualsiasi delle classi  $\bar{x}, \bar{y}$  rispettivamente), dunque

$$\text{ord}(g) = \left[ \frac{n}{(n, x)}, \frac{m}{(m, y)} \right] \leq [n, m].$$

Possiamo dunque distinguere i due casi:

1. se  $(n, m) = d > 1$  allora per la PROPOSIZIONE DA INSERIRE per ogni  $g \in G$  vale che

$$\text{ord}(g) \leq [n, m] = \frac{mn}{d} < mn$$

da cui segue che  $G$  non può essere ciclico;

2. se  $(n, m) = 1$  allora per ogni  $g \in G$  vale che

$$\text{ord}(g) \leq [n, m] = mn.$$

In particolare se consideriamo  $g = (\bar{1}, \bar{1})$  si ha che

$$\text{ord}((\bar{1}, \bar{1})) = \left[ \frac{n}{(n, 1)}, \frac{m}{(m, 1)} \right] = [m, n] = mn$$

, dunque  $G = \langle (\bar{1}, \bar{1}) \rangle$ , da cui segue che

$$G \simeq \mathbb{Z}/_{nm}\mathbb{Z}$$

per il Teorema 1.4.12.  $\square$

OSSERVAZIONE. Per il Teorema Cinese del Resto (II Forma) sappiamo che la funzione

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{Z}/_{nm}\mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/_n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \\ [a]_{nm} &\mapsto ([a]_n, [a]_m) \end{aligned} \quad (4)$$

è bigettiva. Inoltre

$$\begin{aligned} \varphi([a]_{nm} + [b]_{nm}) &= \varphi([a + b]_{nm}) \\ &= ([a + b]_n, [a + b]_m) \\ &= ([a]_n + [b]_n, [a]_m + [b]_m) \\ &= ([a]_n, [a]_m) + ([b]_n, [b]_m) \\ &= \varphi([a]_{nm}) + \varphi([b]_{nm}), \end{aligned}$$

ovvero  $\varphi$  è un omomorfismo di gruppi. Dunque  $\varphi$  è un isomorfismo di gruppi e

$$\mathbb{Z}/_{nm}\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/_n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}.$$

**Corollario 1.4.21** **Isomorfismo tra i gruppi degli invertibili.** Siano  $n, m \in \mathbb{Z}$  entrambi non nulli. Allora se  $(n, m) = 1$  segue che

$$\mathbb{Z}/_{nm}^\times \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/_n^\times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m^\times \mathbb{Z}. \quad (5)$$

**Dimostrazione.** Consideriamo la funzione

$$\begin{aligned} \varphi^* : \mathbb{Z}/_{nm}^\times \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}/_n^\times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/_m^\times \mathbb{Z} \\ [a]_{nm} &\mapsto [a]_n \times [a]_m. \end{aligned}$$

Essa è ben definita: infatti se  $[a]_{nm} \in \mathbb{Z}/_{nm}^\times \mathbb{Z}$  significa che  $(a, mn) = 1$ . Siccome per ipotesi  $(m, n) = 1$  per la PROPOSIZIONE NON SCRITTA segue che  $(m, n) = (a, m) = 1$ , ovvero  $[a]_n \in \mathbb{Z}/_n^\times \mathbb{Z}$  e  $[a]_m \in \mathbb{Z}/_m^\times \mathbb{Z}$ .

Inoltre questa funzione è una restrizione della  $\varphi$  definita in (4), dunque è iniettiva. Inoltre

$$|\mathbb{Z}/_{nm}\mathbb{Z}| = \varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m) = |\mathbb{Z}/_n\mathbb{Z}| \times |\mathbb{Z}/_m\mathbb{Z}|$$

siccome  $(n, m) = 1$ , dunque  $\varphi$  è anche surgettiva e quindi è bigettiva.

Tramite passaggi analoghi a quelli visti nell'osservazione precedente si dimostra che  $\varphi^*$  è un omomorfismo, dunque essendo bigettiva è anche un isomorfismo di gruppi, da cui segue la tesi.  $\square$

## 1.4.4 Prodotto di sottogruppi

**Definizione 1.4.22** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e siano  $H, K \leq G$ . Allora si definisce il *prodotto tra  $H$  e  $K$*  come

$$HK := \{ h \cdot k : h \in H, k \in K \}. \quad (6)$$

Analogamente si definisce il *prodotto tra  $K$  e  $H$*  come

$$KH := \{ k \cdot h : k \in K, h \in H \}. \quad (7)$$

**OSSERVAZIONE.** Se il gruppo è in notazione additiva il prodotto di sottogruppi diventa somma di sottogruppi e si indica  $H + K$  (o  $K + H$ ).

**Proposizione 1.4.23** [Condizione per cui il prodotto tra sottogruppi è un sottogruppo] Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e siano  $H, K \leq G$ .

Allora l'insieme  $HK$  è un sottogruppo di  $G$  se e solo se  $HK = KH$ .

**Dimostrazione.** Dimostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Leftarrow$ ) Siccome entrambi gli insiemi contengono  $e_G$ , per la [Proposizione 1.2.2](#) mi basta mostrare che  $HK$  è chiuso rispetto all'operazione  $\cdot$  e che contiene l'inverso di ogni suo elemento.

**CHIUSURA** Siano  $h_1 k_1, h_2 k_2 \in HK$ . Voglio mostrare che  $(h_1 k_1) \cdot (h_2 k_2) \in HK$ . Per associatività, posso scriverlo come

$$h_1 \cdot (k_1 h_2) \cdot k_2.$$

Siccome  $KH = HK$  esisteranno  $h_3 \in H, k_3 \in K$  tali che  $k_1 h_2 = h_3 k_3$ . Da ciò segue che

$$h_1 \cdot (k_1 h_2) \cdot k_2 = h_1 h_3 k_3 k_2 \in HK.$$

**INVERTIBILITÀ** Sia  $hk \in HK$  e mostriamo che anche il suo inverso  $(hk)^{-1} = k^{-1} h^{-1}$  è in  $HK$ . Siccome  $k^{-1} h^{-1} \in KH$  e  $KH = HK$ , segue la tesi.

( $\Rightarrow$ ) Dimostriamo che  $HK = KH$  mostrando che  $HK \subseteq KH$  e  $KH \subseteq HK$ .

( $KH \subseteq HK$ ) Banalmente  $H \subseteq HK$  (infatti  $H \ni h = h e_G \in HK$ ) e  $K \subseteq HK$ . Ma allora per ogni  $h, k \in HK$  segue che  $k \cdot h \in HK$  (in quanto  $HK \leq G$ ) dunque  $KH \subseteq HK$ .

( $HK \subseteq KH$ ) Consideriamo la funzione

$$\begin{aligned} f : HK &\rightarrow KH \\ x &\mapsto x^{-1}. \end{aligned}$$

Questa funzione è ben definita, in quanto se  $x \in HK$ , ovvero se  $x = hk$  per qualche  $h \in H, k \in K$  allora

$$x^{-1} = (hk)^{-1} = k^{-1} h^{-1} \in KH$$

poiché  $k^{-1} \in K$  e  $h^{-1} \in H$ . Inoltre questa funzione è ovviamente iniettiva, da cui segue che  $HK \subseteq KH$ .

Dunque  $HK$  è sottogruppo se e solo se  $HK = KH$ .  $\square$

## 1.5 CLASSI LATERALI E GRUPPO QUOZIENTE

Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $H \leq G$ . Consideriamo la seguente relazione sugli elementi di  $G$ : diciamo che  $x \sim_L y$  se e solo se  $y^{-1}x \in H$ .

Questa relazione è una relazione di equivalenza, infatti

- $\sim_L$  è riflessiva:  $x^{-1}x = e_G \in H$ , dunque  $x \sim_L x$ .
- $\sim_L$  è simmetrica: se  $x \sim_L y$ , ovvero  $y^{-1}x \in H$ , allora il suo inverso  $(y^{-1}x)^{-1} = x^{-1}(y^{-1})^{-1} = x^{-1}y \in H$ , dunque  $y \sim_L x$ .
- $\sim_L$  è transitiva: supponiamo che  $x \sim_L y$  e  $y \sim_L z$  e mostriamo che  $x \sim_L z$ . Dalla prima sappiamo che  $y^{-1}x \in H$ , mentre dalla seconda segue che  $z^{-1}y \in H$ . Dato che  $H$  è un sottogruppo, il prodotto di suoi elementi è ancora in  $H$ , dunque

$$z^{-1}y \cdot y^{-1}x = z^{-1}x \in H$$

da cui segue che  $x \sim_L z$ .

Questa relazione di equivalenza forma delle classi di equivalenza che partizionano  $G$ : in particolare la classe di  $x \in G$  sarà della forma

$$\begin{aligned} [C_x]_L &= \{ g \in G : g \sim_L x \} \\ &= \{ g \in G : x^{-1}g \in H \} \\ &= \{ g \in G : x^{-1}g = h \text{ per qualche } h \in H \} \\ &= \{ g \in G : g = xh \text{ per qualche } h \in H \}. \end{aligned}$$

Notiamo che gli elementi della classe di  $x$  sono quindi tutti e soli gli elementi del sottogruppo  $H$  moltiplicati a sinistra per  $x$ . Diamo dunque la seguente definizione.

**Definizione 1.5.1** **Classe laterale sinistra.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $H \leq G$  un suo sottogruppo. Sia inoltre  $x \in G$ .

Allora si dice *classe laterale sinistra di  $H$  rispetto a  $x$*  l'insieme

$$xH := \{ xh : h \in H \}.$$

**OSSERVAZIONE.** Nel caso di gruppi additivi le classi laterali si scrivono in notazione additiva, ovvero nella forma  $x + H$  per  $x \in G$ ,  $H \leq G$ .

**ESEMPIO 1.5.2.** Ad esempio le classi laterali di  $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$  sono della forma

$$a + n\mathbb{Z} := \{ a + nk : k \in \mathbb{Z} \}.$$

La classe  $a + n\mathbb{Z}$  denota tutti i numeri congrui ad  $a$  modulo  $n$ .

Allo stesso modo possiamo definire un'altra relazione di equivalenza  $\sim_R$  tale che

$$x \sim_R y \iff xy^{-1} \in H.$$

Le classi di equivalenza di questa relazione sono della forma

$$[C_x]_R = \{ g \in G : g = hx \text{ per qualche } h \in H \}.$$

Possiamo dunque definire anche le classi laterali destre nel seguente modo.

**Definizione 1.5.3** **Classe laterale destra.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $H \leq G$  un suo sottogruppo. Sia inoltre  $x \in G$ .

Allora si dice *classe laterale destra di  $H$  rispetto a  $x$*  l'insieme

$$Hx := \{ hx : h \in H \}.$$

**OSSERVAZIONE.** Siccome le classi laterali sinistre (o destre) rappresentano le classi di equivalenza rispetto alla relazione  $\sim_L$  (risp.  $\sim_R$ ) possiamo definire un insieme di rappresentanti  $R$  per cui

$$G = \bigsqcup_{a \in R} aH. \quad (\text{risp. } Ha) \tag{8}$$

**Teorema 1.5.4**      **Teorema di Lagrange.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo finito e sia  $H \leq G$  qualsiasi. Allora vale che

$$|H| \mid |G|.$$

In breve, il Teorema di Lagrange afferma che per ogni gruppo finito l'ordine di un suo qualsiasi sottogruppo divide l'ordine del gruppo. Prima di dimostrarlo, dimostriamo un lemma che ci tornerà utile.

**Lemma 1.5.5**      Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $H$  un suo sottogruppo. Allora per qualsiasi  $g \in G$  vale che

$$|gH| = |H| = |Hg|.$$

**Dimostrazione.** Per dimostrare che  $|gH| = |H|$  consideriamo la mappa

$$\begin{aligned} \varphi : H &\rightarrow gH \\ h &\mapsto gh \end{aligned}$$

e facciamo vedere che è bigettiva.

**INIETTIVITÀ** Supponiamo che per qualche  $h, k \in H$  valga che  $\varphi(h) = \varphi(k)$ , ovvero  $gh = gk$ . Siccome  $gh, gk \in G$  vale la [legge di cancellazione sinistra](#), dunque segue che  $h = k$ , ovvero  $\varphi$  è iniettiva.

**SURGETTIVITÀ** Segue naturalmente dalla definizione di  $gH$ .

Dunque  $\varphi$  è bigettiva e quindi gli insiemi  $gH$  e  $H$  hanno la stessa cardinalità. Analogamente si mostra che la funzione

$$\begin{aligned} \psi : H &\rightarrow Hh \\ h &\mapsto hg \end{aligned}$$

è bigettiva, dunque segue la tesi.  $\square$

Dimostriamo ora il Teorema di Lagrange

**Dimostrazione del Teorema 1.5.4.** Per l'osservazione precedente sappiamo che se  $R$  è un insieme di rappresentanti della relazione di equivalenza  $\sim_L$  allora

$$G = \bigsqcup_{\alpha \in R} \alpha H,$$

dunque passando alle cardinalità

$$|G| = \sum_{\alpha \in R} |\alpha H|.$$

Per il [Lemma 1.5.5](#) segue quindi che

$$\begin{aligned} &= \sum_{\alpha \in R} |H| \\ &= |R| \cdot |H|. \end{aligned}$$

Dunque  $|H| \mid |G|$ , dunque la tesi.  $\square$

**OSSERVAZIONE.** Osserviamo che in generale le classi laterali di un sottogruppo del gruppo  $G$  non sono sottogruppi di  $G$ : dato che partizionano il gruppo una sola di esse contiene l'elemento neutro del gruppo.

**Proposizione 1.5.6** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo, sia  $H \leq G$  e sia  $g \in G$  qualsiasi. Allora i seguenti fatti sono equivalenti:*

- (i)  $gH \leq G$ ,
- (ii)  $g \in H$ ,
- (iii)  $H = gH$ .

**Dimostrazione.** Dimostriamo la catena di implicazioni (i)  $\Rightarrow$  (ii)  $\Rightarrow$  (iii)  $\Rightarrow$  (i).

((i)  $\Rightarrow$  (ii)) Supponiamo che  $gH \leq G$ . Allora  $e_G \in gH$ , ovvero esiste  $h \in H$  tale che  $gh = e_G$ . Ma tale  $h$  è  $g^{-1}$ , dunque se  $g^{-1} \in H$  segue che  $g \in H$ .

((ii)  $\Rightarrow$  (iii)) Supponiamo che  $g \in H$ .

( $gH \subseteq H$ ) Supponiamo  $gh \in gH$  per qualche  $h \in H$ . Ma essendo  $g \in H$  per ipotesi il prodotto  $gh$  sarà un elemento di  $H$ , dunque  $gH \subseteq H$ .

( $H \subseteq gH$ ) Sia  $h \in H$ . Siccome  $g \in H$  e  $H$  è un gruppo segue che  $g^{-1} \in H$ , dunque  $g^{-1}h \in H$ . Ma questo significa che  $g \cdot (g^{-1}h) = h \in gH$ , dunque  $H \subseteq gH$ .

Concludiamo che  $gH = H$ .

((iii)  $\Rightarrow$  (i)) Siccome  $gH = H$  e  $H \leq G$  allora  $gH \leq G$ .  $\square$

Siccome ogni elemento di una classe è un possibile rappresentante della classe stessa, la proposizione precedente ci dice che l'unica classe laterale (sinistra) di  $H$  che è un sottogruppo di  $G$  è quella che contiene l'identità, ovvero la classe  $e_G H = H$ .

**Corollario 1.5.7** **Corollario al Teorema di Lagrange.** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo finito. Allora valgono i seguenti fatti:*

- (i) per ogni  $g \in G$  vale che  $\text{ord}_G(g) \mid |G|$ ,
- (ii) per ogni  $x \in G$  vale che  $x^{|G|} = e_G$ .

**Dimostrazione.** (i) Siccome  $\langle g \rangle \leq G$ , per il [Teorema di Lagrange](#) vale che

$$\text{ord}_G(g) = |\langle g \rangle| \mid |G|.$$

(ii) Sia  $n := |G|$  e  $k := \text{ord}_G(g)$ . Per il punto precedente vale che  $k \mid n$ , ovvero che esiste  $m \in \mathbb{Z}$  tale che

$$n = km.$$

Dunque segue che

$$\begin{aligned} g^{|G|} &= g^n \\ &= (g^k)^m && \text{(per def. di ordine)} \\ &= e^m \\ &= e. \end{aligned} \quad \square$$

**Corollario 1.5.8** **I gruppi di ordine primo sono ciclici.** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo tale che  $|G| = p$  per qualche  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $p$  primo. Allora  $G$  è ciclico ed in particolare*

$$G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

**Dimostrazione.** Sia  $x \in G$ ,  $x \neq e_G$ . Allora  $\langle x \rangle \neq \{e_G\}$ , da cui segue che

$$1 \neq \text{ord}_G(x) \mid p = |G|.$$

Dunque per definizione di numero primo  $\text{ord}_G(x) = p$ , ma siccome l'ordine del sottogruppo  $\langle x \rangle$  è uguale all'ordine di  $G$  segue che  $G = \langle x \rangle$ .

Dunque  $G$  è ciclico e per il Teorema 1.4.12 è isomorfo a  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .  $\square$

Il teorema di Lagrange ci consente inoltre di dimostrare molto semplicemente il Teorema di Eulero-Fermat.

**Dimostrazione.** Segue dal Corollario 1.5.7 (in particolare dal punto (ii)) considerando come gruppo  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \cdot)$ : infatti per definizione  $\varphi(n) = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times|$ , da cui la tesi.  $\square$

### 1.5.1 Sottogruppi normali e gruppo quoziente

**Definizione 1.5.9** **Sottogruppo normale.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $H \leq G$ . Allora si dice che  $H$  è un *sottogruppo normale* di  $G$  se per ogni  $g \in G$  vale che

$$gH = Hg. \quad (9)$$

Se  $H$  è normale si scrive  $H \triangleleft G$ .

OSSERVAZIONE. Se  $G$  è abeliano allora tutti i suoi sottogruppi sono normali.

OSSERVAZIONE. Se un sottogruppo  $H$  è normale non significa che per ogni  $h \in H$  vale che  $gh = hg$ , ma soltanto che per ogni  $h \in H$  esiste un  $h' \in H$  tale che

$$gh = h'g.$$

**Proposizione 1.5.10** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $H \leq G$ . Allora  $H$  è normale se e solo se è chiuso per coniugio, ovvero se e solo se per ogni  $g \in G$  vale che*

$$gHg^{-1} \subseteq H.$$

**Dimostrazione.** Mostriamo entrambi i versi dell'implicazione.

( $\Rightarrow$ ) Supponiamo che  $H \triangleleft G$ , ovvero che per ogni  $g \in G$  vale che

$$gH = Hg,$$

ovvero per ogni  $h \in H$  esiste un  $h' \in H$  tale che

$$gh = h'g.$$

Moltiplicando a destra per  $g^{-1}$  si ottiene che

$$ghg^{-1} = h' \in H,$$

da cui  $gHg^{-1} \subseteq H$ .  $\square$

**Proposizione 1.5.11** **Il centro è un sottogruppo normale.** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo. Allora vale che*

$$Z(G) \triangleleft G.$$

**Definizione 1.5.12** **Indice di un sottogruppo.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $H \leq G$ . Allora si dice *indice di  $H$  in  $G$*  il numero di classi laterali sinistre di  $H$ , e si indica con

$$[G : H]. \quad (10)$$



**Proposizione 1.5.13** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo,  $H \leq G$ . Allora se  $[G : H] = 2$  segue che  $H \triangleleft G$ .

**Proposizione 1.5.14** **Nucleo di omomorfismi e normalità.** Siano  $(G, \cdot), (G', *)$  due gruppi e sia  $f : G \rightarrow G'$  un omomorfismo.

Valgono le seguenti affermazioni.

- (i)  $\ker f \triangleleft G$ ,
- (ii) per ogni  $x, y \in G$  vale che  $f(x) = f(y)$  se e solo se  $x \ker f = y \ker f$ , ovvero se  $x, y$  appartengono alla stessa classe laterale del nucleo,
- (iii) se  $z \in \text{Im } f$  (ovvero  $f(x) = z$  per qualche  $x \in G$ ) allora  $f^{-1}(\{z\}) = x \ker f$ .

**Dimostrazione.** (i) Per la [Proposizione 1.5.10](#) la tesi è equivalente a dimostrare che

$$g(\ker f)g^{-1} \subseteq \ker f$$

per ogni  $g \in G$ .

Sia  $x \in \ker f$  qualsiasi: mostriamo che  $gxg^{-1} \in \ker f$ . Per definizione di kernel, questo significa mostrare che  $f(gxg^{-1}) = e_G$ , ovvero (siccome  $f$  è un omomorfismo)

$$f(g) * f(x) * f(g^{-1}) = e_G.$$

Per ipotesi  $x \in \ker f$ , dunque  $f(x) = e_G$ ; inoltre per la [Proposizione 1.4.7: \(ii\)](#) sappiamo che  $f(g^{-1}) = f(g)^{-1}$ .

Dunque segue che

$$\begin{aligned} f(g) * f(x) * f(g^{-1}) &= f(g) * e_G * f(g)^{-1} \\ &= f(g) * f(g)^{-1} \\ &= e_G \end{aligned}$$

che è la tesi.

- (ii) Supponiamo  $f(x) = f(y)$ . Moltiplicando a destra per  $f(y)^{-1}$  segue che

$$\begin{aligned} f(x) * f(y)^{-1} &= e_G \\ \iff f(x) * f(y^{-1}) &= e_G \\ \iff f(xy^{-1}) &= e_G \\ \iff xy^{-1} &\in \ker f \\ \iff x \sim_L y. \end{aligned}$$

Dunque le classi di equivalenza di  $x$  e  $y$  sono uguali, ovvero

$$x \ker f = y \ker f.$$

- (iii) Per definizione di controimmagine:

$$\begin{aligned} f^{-1}(z) &= \{ g \in G : f(g) = z \} && (\text{hp: } f(x) = z) \\ &= \{ g \in G : f(g) = f(x) \} && (\text{per il punto (ii)}) \\ &= x \ker f. && \square \end{aligned}$$

Consideriamo ora l'insieme di tutte le possibili classi laterali sinistre di un sottogruppo  $H \leq G$  e chiamiamo questo insieme  $G/H$ :

$$G/H := \{ gH : g \in G \}. \quad (11)$$

Se  $H \triangleleft G$  possiamo definire un'operazione su  $G/H$ :

$$\begin{aligned} \cdot : G/H \times G/H &\rightarrow G/H \\ (aH, bH) &\mapsto abH. \end{aligned} \quad (12)$$

La struttura  $(G/H, \cdot)$  si definisce *gruppo quoziente*.

**Proposizione 1.5.15** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $N \triangleleft G$ . Allora la struttura  $(G/N, \star)$  (dove l'operazione è definita come in (12)) è un gruppo.*

**Dimostrazione.** Mostriamo innanzitutto che l'operazione  $\star$  è ben definita. Supponiamo che  $xN = x'N$  e  $yN = y'N$  e mostriamo che  $xyN = x'y'N$ .

Siano  $n_1, n_2$  tali che

$$x' = xn_1, \quad y' = yn_2.$$

Allora vale che

$$x'y' = xn_1yn_2.$$

Siccome  $N \triangleleft G$  segue che  $Ny = yN$ , ovvero che esiste un  $n_3 \in N$  tale che  $n_1y = yn_3$ . Dunque

$$\begin{aligned} &= xyn_3n_2 && (N \text{ è chiuso rispetto a } \cdot) \\ &\in xyN. \end{aligned}$$

Per simmetria dunque  $xyN = x'y'N$ .

Mostriamo ora che valgono gli assiomi di gruppo.

**ASSOCIATIVITÀ** Siano  $xN, yN, zN \in G/N$ . Mostriamo che vale la proprietà associativa.

$$\begin{aligned} xN \star (yN \star zN) &= xN \star yzN \\ &= x(yz)N && (\text{ass. in } G) \\ &= (xy)zN \\ &= xyN \star zN \\ &= (xN \star yN) \star zN. \end{aligned}$$

**ELEMENTO NEUTRO** L'elemento neutro del gruppo è  $e_G N$ . Infatti per qualsiasi  $xN \in G/N$

$$\begin{aligned} e_G N \star xN &= e_G xN = xN. \\ xN \star e_G N &= xe_G N = xN. \end{aligned}$$

**INVERTIBILITÀ** Sia  $xN \in G/N$ . Mostriamo che il suo inverso rispetto a  $\star$  è  $x^{-1}N$ .

$$\begin{aligned} xN \star x^{-1}N &= xx^{-1}N = e_G N. \\ x^{-1}N \star xN &= x^{-1}xN = e_G N. \end{aligned}$$

Dunque  $(G/N, \star)$  è un gruppo.  $\square$

**ESEMPIO 1.5.16.** Se consideriamo il gruppo  $\mathbb{Z}$  e il suo sottogruppo normale  $n\mathbb{Z}$  il gruppo quoziente  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  è esattamente il gruppo delle classi resto modulo  $n$ .

**Proposizione 1.5.17** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $N \triangleleft G$ . Allora la mappa

$$\begin{aligned}\pi_N : G &\rightarrow G/N \\ x &\mapsto xN\end{aligned}\tag{13}$$

è un omomorfismo di gruppi e  $\ker \pi_N = N$ .

**Dimostrazione.** Mostriamo innanzitutto che  $\pi_N$  è un omomorfismo.

$$\begin{aligned}\pi_N(xy) &= xyN \\ &= xN \cdot yN \\ &= \pi_N(x) \cdot \pi_N(y).\end{aligned}$$

Inoltre per definizione

$$\begin{aligned}\ker \pi_N &= \{ x \in G : \pi_N(x) = xN = N \} \\ &= \{ x \in G : x \in N \} \\ &= N,\end{aligned}$$

dove il secondo segno di uguaglianza viene dalla [Proposizione 1.5.6](#) (in particolare per l'equivalenza tra i punti (ii) e (iii)).  $\square$

**Corollario 1.5.18** I sottogruppi normali di  $G$  sono tutti e solo i nuclei degli omomorfismi definiti su  $G$ .

**Dimostrazione.** Infatti se  $N \triangleleft G$  allora per la [Proposizione 1.5.17](#) segue che  $N = \ker \pi_N$ ; invece dato un omomorfismo di gruppi  $\varphi : G \rightarrow G'$  vale che  $\ker \varphi$  è normale per la [Proposizione 1.5.14](#).  $\square$

## 1.6 TEOREMI DI OMOMORFISMO

**Teorema 1.6.1** **Primo Teorema degli Omomorfismi.** Siano  $(G, \cdot), (G', *)$  due gruppi e sia  $f : G \rightarrow G'$  un omomorfismo di gruppi. Sia inoltre  $N \triangleleft G, N \subseteq \ker f$ . Allora esiste un unico omomorfismo  $\varphi : G/N \rightarrow G'$  per cui il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \pi_N \downarrow & \nearrow \varphi & \\ G/N & & \end{array}\tag{14}$$

Inoltre vale che

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} \varphi, \quad \ker \varphi = \ker f/N.$$

**Dimostrazione.** Notiamo che se  $\varphi$  esiste allora è necessariamente unica. Infatti se  $\varphi$  rende il diagramma commutativo significa che  $f = \varphi \circ \pi_N$ , da cui segue che per ogni  $x \in G$

$$\begin{aligned}f(x) &= (\varphi \circ \pi_N)(x) \\ &= \varphi(\pi_N(x)) \\ &= \varphi(xN).\end{aligned}$$

Questa equazione assegna a  $\varphi$  un valore per ogni elemento del dominio  $G/N$ , da cui segue l'unicità.

Mostriamo dunque che la funzione

$$\begin{aligned}\varphi : G/N &\rightarrow G' \\ gH &\mapsto f(g)\end{aligned}$$

è ben definita ed è un omomorfismo di gruppi. Inoltre verifichiamo le due proprietà dell'immagine e del nucleo.

**BUONA DEFINIZIONE** Siano  $x, y$  tali che  $xN = yN$ . Dato che esse rappresentano classi di equivalenza, ciò significa che  $x \in yN$ . Sia dunque  $n \in N$  tale che  $x = yn$ . Allora vale che

$$\begin{aligned}f(x) &= f(yn) && (f \text{ è omo.}) \\ &= f(y) * f(n) && (N \subseteq \ker f) \\ &= f(y) * e' \\ &= f(y).\end{aligned}$$

Dunque segue che

$$\varphi(xN) = f(x) = f(y) = \varphi(yN),$$

ovvero  $\varphi$  è ben definita.

**OMOMORFISMO** Siano  $xN, yN \in G/N$  e mostriamo che

$$\varphi(xN \cdot yN) = \varphi(xN) * \varphi(yN).$$

Infatti vale che

$$\begin{aligned}\varphi(xN \cdot yN) &= \varphi(xyN) \\ &= f(xy) && (f \text{ è omo.}) \\ &= f(x) * f(y) \\ &= \varphi(xN) * \varphi(yN).\end{aligned}$$

**PROPRIETÀ DELLE IMMAGINI** Per definizione

$$\begin{aligned}\text{Im } \varphi &= \{ \varphi(xN) : xN \in G/N \} \\ &= \{ f(x) : xN \in G/N \}.\end{aligned}$$

Tuttavia, come abbiamo verificato nella parte relativa alla buona definizione di  $\varphi$ , se  $xN = yN$  allora  $f(x) = f(y)$ , dunque vale che

$$\begin{aligned}\text{Im } \varphi &= \{ f(x) : x \in G \} \\ &= \text{Im } f.\end{aligned}$$

**PROPRIETÀ DEI NUCLEI** Per definizione

$$\begin{aligned}\ker \varphi &= \{ xN \in G/N : \varphi(xN) = e' \} \\ &= \{ xN \in G/N : f(x) = e' \} \\ &= \{ xN \in G/N : x \in \ker f \} \\ &= \ker f/N.\end{aligned}$$

□

Nel caso particolare in cui  $N = \ker f$  abbiamo che  $\varphi$  è iniettiva, come ci assicura il seguente corollario.

**Corollario**  
1.6.2

Siano  $(G, \cdot), (G', *)$  due gruppi e sia  $f : G \rightarrow G'$  un omomorfismo di gruppi.

Allora esiste un unico omomorfismo  $\varphi$  tale che il seguente diagramma commuta:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \pi_{\ker f} \downarrow & \nearrow \varphi & \\ G/\ker f & & \end{array} \quad (15)$$

In particolare  $\varphi$  è iniettivo, dunque ogni omomorfismo è fattorizzabile come composizione di un omomorfismo surgettivo e uno iniettivo.

**Dimostrazione.** Siccome  $\ker f \subseteq \ker f$  e  $\ker f \triangleleft G$  possiamo applicare il [Primo Teorema degli Omomorfismi](#), da cui segue che esiste un unico omomorfismo  $\varphi$  tale che

$$f = \varphi \circ \pi_{\ker f}.$$

**INIETTIVITÀ DI  $\varphi$**  Per definizione di  $\varphi$  vale che  $\varphi(x \ker f) = e_{G'}$  se e solo se  $f(x) = e_{G'}$ , ovvero se e solo se  $x \in \ker f$ . Dunque il nucleo di  $\varphi$  è  $\ker f$ , che è l'elemento neutro del gruppo quoziente  $G/\ker f$ , da cui segue che  $\varphi$  è iniettivo.

Essendo inoltre  $\pi_{\ker f}$  surgettivo segue la tesi.  $\square$

La fattorizzazione definita dal precedente corollario può essere resa ancora più precisa specificando un oggetto intermedio, l'immagine di  $f$ : l'omomorfismo  $f$  viene quindi scomposto nella composizione di un omomorfismo surgettivo (la proiezione canonica modulo il kernel, ovvero  $\pi_{\ker f}$ ), un isomorfismo e infine un omomorfismo iniettivo (l'inclusione canonica  $\iota : \text{Im } f \rightarrow G'$ ,  $\iota(g) = g$ ).

L'isomorfismo è proprio l'omomorfismo  $\varphi$  del [Primo Teorema degli Omomorfismi](#): infatti per l'osservazione precedente  $\varphi$  è iniettivo; inoltre restringendo il codominio a  $\text{Im } f$  e sapendo che  $\text{Im } \varphi = \text{Im } f$  segue che  $\varphi$  è anche surgettivo, rendendolo un isomorfismo.

Il seguente diagramma dunque commuta:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & f & & & \\ & & \searrow & \curvearrowright & \nearrow & & \\ G & \xrightarrow{\pi_{\ker f}} & G/\ker f & \xrightarrow{\varphi} & \text{Im } f & \xrightarrow{\iota} & G' \end{array} \quad (16)$$

Vale dunque il seguente corollario.

**Corollario 1.6.3** Siano  $(G, \cdot)$ ,  $(G', *)$  due gruppi e sia  $f : G \rightarrow G'$  un omomorfismo di gruppi.

Allora

$$G/\ker f \simeq \text{Im } f. \quad (17)$$

**Teorema 1.6.4** **Secondo Teorema degli Omomorfismi.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e siano  $H, K \triangleleft G$ , con  $H \subseteq K$ . Allora

$$G/H/K/H \simeq G/K. \quad (18)$$

**Dimostrazione.** Consideriamo le proiezioni canoniche  $\pi_H$  e  $\pi_K$ . Siccome  $H \subseteq K = \ker \pi_K$  possiamo applicare il [Primo Teorema degli Omomorfismi](#) all'omomorfismo  $\pi_K$  e al sottogruppo normale  $H \triangleleft G$  (tramite la proiezione  $\pi_H$ ). Dunque esiste un unico omomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi : G/H &\rightarrow G/K \\ gH &\mapsto gK \end{aligned}$$

che fa commutare il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi_K} & G/K \\ \pi_H \downarrow & \nearrow \varphi & \\ G/H & & \end{array}$$

Tale funzione è anche surgettiva, in quanto per il [Primo Teorema degli Omomorfismi](#) sappiamo che  $\text{Im } \varphi = \text{Im } \pi_K$ , e  $\pi_K$  è surgettiva. Inoltre

$$\ker \varphi = \ker \pi_K / H = K/H.$$

Consideriamo ora i gruppi  $G/H$  e  $G/K$  e il sottogruppo  $G/H/\ker \varphi$ , che corrisponde a  $G/H/K/H$ . Per il [Primo Teorema degli Omomorfismi](#) esiste un unico omomorfismo

$$\tilde{\varphi} : G/H/K/H \rightarrow G/K$$

che fa commutare il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccc} G/H & \xrightarrow{\varphi} & G/K \\ \pi_{K/H} \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ G/H/K/H & & \end{array}$$

$\tilde{\varphi}$  è un isomorfismo di gruppi: infatti essendo  $\varphi$  surgettivo anche  $\tilde{\varphi}$  lo è; inoltre la proiezione  $\pi_{K/H}$  porta il gruppo  $G/H$  nel quoziente modulo  $\ker \varphi = K/H$ , dunque l'omomorfismo  $\tilde{\varphi}$  è iniettivo ed è dunque un isomorfismo di gruppi.

Segue quindi che

$$G/H/K/H \simeq G/K. \quad \square$$

**Teorema 1.6.5**

**Terzo Teorema degli Omomorfismi.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e siano  $H \leq G, N \triangleleft G$ . Valgono le seguenti affermazioni:

- $N$  è un sottogruppo normale di  $HN$ ,
- $H \cap N$  è un sottogruppo normale di  $H$ ,
- inoltre

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \frac{HN}{N}. \quad (19)$$

**Dimostrazione.** Dimostriamo innanzitutto le due condizioni di normalità.

$(N \triangleleft HN)$  Mostriamo innanzitutto che  $HN$  è un sottogruppo di  $G$ .

Per la [Proposizione 1.4.23](#), è sufficiente mostrare che  $HN = NH$ . Siccome  $N$  è normale in  $G$  segue che  $gN = Ng$  per ogni  $g \in G$ . Dato che  $H \subseteq G$  segue che  $hN = Nh$  per ogni  $h \in H$ , ovvero  $HN = NH$ . Dunque  $HN$  è un sottogruppo di  $G$ .

Notiamo inoltre che  $N \subseteq HN$  (basta scegliere tutti gli elementi della forma  $e_G n$  al variare di  $n \in N$ ), dunque essendo  $N$  normale in  $G$  segue che  $N$  è normale in ogni sottogruppo di  $G$  che lo contiene; in particolare  $N \triangleleft HN$ .

$(H \cap N \triangleleft H)$  Sia  $n \in H \cap N$  e sia  $g \in H$ .

Ovviamente  $gng^{-1} \in H$ , in quanto  $n$  ed  $g$  sono entrambi elementi di  $H$ . Inoltre essendo  $N$  un sottogruppo normale di  $G$  segue che  $gng^{-1} \in N$  per ogni  $g \in G$ , dunque a maggior ragione per ogni  $g \in H \subseteq G$ .

Dunque  $gng^{-1} \in H \cap N$ , da cui segue che  $H \cap N$  è normale in  $H$ .

Consideriamo ora l'applicazione

$$\begin{aligned} f : H &\rightarrow HN/N \\ h &\mapsto hN. \end{aligned}$$

Quest'applicazione è una restrizione all'insieme  $H \subseteq HN$  della proiezione canonica

$$\pi_N : HN \rightarrow HN/N;$$

questo ci garantisce che  $f$  è ben definita e che è un omomorfismo di gruppi.

Inoltre  $f$  è surgettiva: basta mostrare che

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= HN/N \\ \iff \{ hN \in HN/N : h \in H \} &= \{ yN \in HN/N : y \in HN \} \end{aligned}$$

L'inclusione  $\text{Im } f \subseteq HN/N$  è data dalla definizione; l'inclusione contraria viene dal fatto che se  $yN \in HN/N$ , ovvero  $y = hn$  per qualche  $hn \in HN$ , allora  $yN = hnN \in \{ hN : h \in H \}$  in quanto  $nN = N$ .

Inoltre

$$\begin{aligned} \ker f &= \{ h \in H : f(h) = N \} \\ &= \{ h \in H : hN = N \} \\ &= \{ h \in H : h \in N \} \\ &= H \cap N. \end{aligned}$$

Dunque per il [Corollario al Primo Teorema degli Omomorfismi](#) segue che

$$\frac{H}{H \cap N} \simeq \text{Im } f = \frac{HN}{N}. \quad \square$$

**Teorema 1.6.6**      **Teorema di Corrispondenza tra Sottogruppi.** *Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $N \triangleleft G$ . Sia  $\mathcal{G}$  l'insieme dei sottogruppi di  $G$  che contengono  $N$  e  $\mathcal{N}$  l'insieme dei sottogruppi di  $G/N$ .*

*Allora esiste una corrispondenza biunivoca tra  $\mathcal{G}$  e  $\mathcal{N}$  che preserva l'indice di sottogruppo e i sottogruppi normali, ovvero esiste una funzione*

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{G} &\rightarrow \mathcal{N} \\ A &\mapsto A/N \end{aligned}$$

*tale che*

- $[G : A] = [G/N : A/N]$ ,
- se  $A \triangleleft G$  allora  $A/N \triangleleft G/N$ .

Parte II

ALGEBRA I



## 2 | TEORIA DEI GRUPPI

### 2.1 GRUPPI E GENERATORI

Nella prima parte abbiamo studiato gruppi generati da un solo elemento (i gruppi *ciclici*). Un gruppo può però essere generato da più di un singolo elemento: in particolare possiamo considerare un gruppo generato da un suo sottoinsieme:

**Definizione 2.1.1** **Gruppo generato da un suo sottoinsieme.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e sia  $S \subseteq G$ . Allora  $G$  si dice *generato da  $S$* , oppure si dice che  $S$  è un insieme di generatori per  $G$  (e si indica con  $G = \langle S \rangle$ ), se

$$G := \left\{ s_1 \dots s_n : n \in \mathbb{N}, s_i \in S \cup S^{-1} \right\},$$

dove  $S^{-1}$  è l'insieme degli inversi degli elementi di  $S$ .

**OSSERVAZIONE.**  $s_1 \dots s_n$  rappresenta tutte le parole di lunghezza finita formate da elementi di  $S$  o dai loro inversi: siccome  $G$  è un gruppo (ed è quindi chiuso per prodotto) e  $S, S^{-1} \subseteq G$  segue che la parola  $s_1 \dots s_n \in G$ , dunque  $\langle S \rangle \subseteq G$ .

**OSSERVAZIONE.** Se  $S = \{ g \}$  allora

$$G = \{ g^{\varepsilon_1} \dots g^{\varepsilon_n} : n \in \mathbb{N}, \varepsilon_i = \pm 1 \} = \left\{ g^{\sum \varepsilon_i} \right\} = \langle g \rangle.$$

**OSSERVAZIONE.** Se il gruppo  $G$  è finito è sufficiente che  $s_i \in S$  (non serve considerare  $S^{-1}$ ).

**Dimostrazione.** Siccome  $G$  è finito ogni suo sottogruppo è finito; in particolare se  $s \in S$  allora  $\langle s \rangle \leq G$  è un sottogruppo finito, e sarà della forma

$$\langle s \rangle = \left\{ e_G, s, s^2, \dots, s^m \right\},$$

dove  $m := \text{ord}_G(s)$ . Siccome  $\langle s \rangle$  è un sottogruppo di  $G$  segue che  $s^{-1} \in \langle s \rangle$ , dunque  $s^{-1} = s^k$  per qualche  $0 \leq k < m$ . Dunque ogni occorrenza di  $s^{-1}$  in una parola può essere sostituita con  $s^k$  che è ottenibile dai soli elementi di  $S$ .  $\square$

**ESEMPIO 2.1.2.** Mostriamo che  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$ .

Come abbiamo osservato in precedenza l'inclusione  $\supseteq$  è banale, dunque basta far vedere che  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  è un sottoinsieme di  $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle$ .

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \left\{ (1, 0), (0, 1), \overbrace{(1, 0) + (0, 1)}^{=(1, 1)}, \overbrace{(1, 0) + (1, 0)}^{=(0, 0)} \right\} \subseteq \langle (1, 0), (0, 1) \rangle.$$

**ESEMPIO 2.1.3.** Sappiamo già che  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ . Mostriamo che  $\mathbb{Z} = \langle 2, 3 \rangle$  e che  $\{ 2, 3 \}$  è un insieme minimale di generatori.

È sufficiente mostrare che  $\mathbb{Z} \subseteq \langle 2, 3 \rangle$ , ovvero che per ogni  $n \in \mathbb{Z}$  esistano  $a, b \in \mathbb{Z}$  tali che

$$n = a \cdot 2 + b \cdot 3.$$

Per l'identità di Bézout sappiamo che esistono  $a_0, b_0 \in \mathbb{Z}$  tali che

$$a_0 \cdot 2 + b_0 \cdot 3 = (2, 3) = 1,$$

dunque moltiplicando tutto per  $n$  otteniamo la tesi.

Inoltre  $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ ,  $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$ , dunque  $\{2, 3\}$  è un insieme minimale di generatori.

**Definizione 2.1.4** **Finitamente generato.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo.  $G$  si dice *finitamente generato* se  $G$  ammette un insieme finito di generatori.

**Proposizione 2.1.5** *Se  $G$  è finitamente generato, allora ogni suo insieme minimale di generatori ha cardinalità finita.*

**Dimostrazione.** Siccome  $G$  è finitamente generato esisterà un insieme di generatori

$$S = \{s_1, \dots, s_n\}$$

tale che  $G = \langle S \rangle$ .

Sia  $X$  un insieme di generatori per  $G$  di cardinalità infinita. Dato che  $S \subseteq G$  ogni elemento di  $S$  è esprimibile come una parola finita formata da elementi di  $X$  o da loro inversi: per ogni  $s_i \in S$  esisteranno quindi  $k_i$  elementi di  $X \cup X^{-1}$  tali che

$$s_i = x_{1i} \dots x_{k_i i}.$$

Segue quindi che

$$S = \{x_{11} \dots x_{k_1 1}, \dots, x_{1n} \dots x_{k_n n}\}.$$

Dato che  $S$  è un insieme di generatori per  $G$  segue che gli elementi  $x_{ij}$  generano il gruppo  $G$ , in quanto sono sufficienti per generare i generatori di  $G$ . Siccome essi sono in numero finito segue che  $X$  non è minimale, da cui la tesi.  $\square$

## 2.2 GRUPPO DIEDRALE

**Definizione 2.2.1** **Gruppo diedrale.** Si dice  $D_n$  l'insieme delle isometrie del piano che mandano in sé l' $n$ -agono regolare, con  $n \geq 3$ .

**OSSERVAZIONE.** Se compongo due isometrie che mandano l' $n$ -agono regolare in sé ho ancora un'isometria che manda l' $n$ -agono regolare in sé. Inoltre ogni isometria ammette un'inversa, che è semplicemente l'isometria che porta l' $n$ -agono nella posizione precedente. Da ciò possiamo dedurre che  $D_n$  è un gruppo.

Per studiare la struttura del gruppo diedrale, numeriamo i vertici dell' $n$ -agono regolare da 1 a  $n$ .

**Proposizione 2.2.2** **Cardinalità del gruppo diedrale.** La cardinalità di  $D_n$  è  $2n$  per ogni  $n \geq 3$ .

**Dimostrazione.** Mostriamo inizialmente che  $\#D_n \leq 2n$ .

Sia  $x \in D_n$ . Questa isometria manderà ogni vertice dell' $n$ -agono in un altro vertice, ed ogni lato in un altro lato.

Sia quindi  $i := x(1)$ , ovvero  $i$  è il vertice in cui viene mandato il vertice 1. A questo punto il lato  $(1, 2)$  dovrà essere mandato in un altro lato, dunque segue che  $x(2) = i + 1$  oppure  $i - 1$ .

Dopo aver fatto queste due scelte, l'isometria  $x$  è fissata: se  $x(2) = i + 1$  allora  $x(3) = i + 2$ ,  $x(4) = i + 3$  eccetera; se  $x(2) = i - 1$

allora  $x(3) = i - 2$  eccetera. Abbiamo quindi  $n$  possibili scelte per  $x(1)$  e 2 possibili scelte per  $x(2)$ , dunque il numero di isometrie distinte è al più  $2n$ .

Mostriamo ora che queste scelte sono tutte distinte, ovvero che  $\#D_n = 2n$ . Innanzitutto l' $n$ -agono ammette  $n$  rotazioni distinte, di cui una è la rotazione banale  $\text{id}$ ; inoltre vi sono  $n$  assi di simmetria:

- se  $n$  è pari essi congiungono i vertici con i vertici opposti e le metà dei lati con le metà dei lati opposti;
- se  $n$  è dispari, essi congiungono i vertici con le metà dei lati opposti ai vertici.

Inoltre ogni simmetria non è una rotazione, in quanto le simmetrie invertono l'orientazione dei vertici mentre le rotazioni la mantengono. Dunque vi sono almeno  $2n$  elementi in  $D_n$ , da cui segue che  $\#D_n = 2n$ .  $\square$

Chiamiamo  $r$  la rotazione attorno al centro di  $\frac{2\pi}{n}$ : le altre rotazioni saranno date da

$$\text{id} = r^0, r, r^2, \dots, r^{n-1}.$$

Le simmetrie saranno invece  $s_1, s_2, \dots, s_n$ . Tuttavia essendo  $D_n$  un gruppo segue che  $sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}$  sono tutti elementi di  $D_n$ .

**Proposizione 2.2.3** *Sia  $r$  la rotazione di  $\frac{2\pi}{n}$  radianti attorno all'origine e sia  $s$  una simmetria qualunque dell' $n$ -agono regolare. Allora*

$$D_n = \{ \text{id}, r, \dots, r^{n-1}, s, sr, \dots, sr^{n-1} \} ..$$

**Dimostrazione.** Sappiamo già che le rotazioni sono distinte tra loro e che le simmetrie non sono rotazioni.

Mostriamo che  $sr^i$  è una simmetria, ovvero non è una rotazione. Se per assurdo lo fosse, allora sarebbe uguale a  $r^j$  per qualche  $j \in \mathbb{Z}$ ,  $0 \leq j < n$ . Allora abbiamo tre possibilità:

1. se  $i = j$  allora  $s = \text{id}$ , da cui  $s$  è una rotazione, il che è assurdo;
2. se  $i > j$  allora  $sr^{i-j} = \text{id}$ , da cui  $s$  è l'inversa di una rotazione e quindi è una rotazione, il che è assurdo;
3. se  $i < j$  allora  $s = r^{j-i}$ , da cui  $s$  è una rotazione, il che è assurdo.

Dunque  $sr^i$  è una simmetria.

Mostriamo che le simmetrie sono distinte fra loro: siano  $sr^i, sr^j$  due simmetrie con  $i \neq j$  e mostriamo che  $sr^i \neq sr^j$ . Per la legge di cancellazione da ciò segue che  $r^i = r^j$ ; tuttavia questo è assurdo in quanto le rotazioni sono distinte tra loro.  $\square$

Possiamo quindi esprimere  $D_n$  come una *presentazione di gruppo*:

$$D_n := \langle r, s : r^n = \text{id}, s^2 = \text{id}, sr = r^{-1}s \rangle.$$

Questo modo di scrivere il gruppo mette in evidenza:

- i generatori del gruppo, ovvero  $r$  e  $s$ ;
- gli ordini dei generatori:  $\text{ord}(r) = n$  e  $\text{ord}(s) = 2$ ;
- le relazioni tra i generatori: come mostreremo tra poco vale che  $sr = r^{-1}s$ .

La rotazione  $r$  ha ovviamente ordine  $n$ : siccome è una rotazione di  $\frac{2\pi}{n}$  radianti, ripetendola  $n$  volte otteniamo l' $n$ -agono originale. Per lo stesso motivo la simmetria  $s$  ha ordine 2.

Per mostrare che  $sr = r^{-1}s$  basta mostrare che l'immagine di tutti i vertici mediante le due isometrie è la stessa.

### 2.2.1 Sottogruppi del gruppo diedrale

Studiamo i sottogruppi del gruppo diedrale  $D_n$ .

Iniziamo studiando  $\langle r \rangle$ : siccome  $\text{ord}(r) = n$  segue che  $[D_n : \langle r \rangle] = 2$ , da cui per la [Proposizione 1.5.13](#) segue che  $\langle r \rangle \triangleleft D_n$ .

Tuttavia possiamo anche mostrare che per ogni  $j = 0, \dots, n-1$  il gruppo  $\langle r^j \rangle$  è normale in  $D_n$ . Osserviamo inizialmente che  $\langle r \rangle$  è l'unico sottogruppo di  $D_n$  di ordine  $n$ : esso infatti contiene tutte le rotazioni e, siccome tutte le simmetrie hanno ordine 2, non possono esserci altri sottogruppi ciclici di ordine  $n$ . Inoltre, essendo un gruppo ciclico, per la [Corollario 1.4.13](#) esso ha uno e un solo sottogruppo di ordine  $d$  per ogni  $d$  che divide  $n$ .

Mostriamo alcuni risultati intermedi.

**Proposizione 2.2.4**  $\langle r^{\frac{n}{d}} \rangle$  è l'unico sottogruppo ciclico di  $D_n$  di ordine  $d$  per ogni  $d > 2$ .

**Dimostrazione.** Innanzitutto  $\text{ord}_{D_n}(r^{\frac{n}{d}}) = d$  in quanto

$$(r^{\frac{n}{d}})^d = r^n = \text{id}.$$

Inoltre esso contiene tutti gli elementi di ordine  $d$  poiché è l'unico sottogruppo ciclico di  $\langle r \rangle$  di ordine  $d$  e gli elementi che non appartengono a  $\langle r \rangle$  hanno ordine 2 (sono simmetrie); da questo segue che è l'unico sottogruppo ciclico di ordine  $d$  di  $D_n$ .  $\square$

**Proposizione 2.2.5** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo. Se  $H$  è l'unico sottogruppo di ordine  $d$  di  $G$ , allora  $H \triangleleft G$ .

**Dimostrazione.** Per ogni  $g \in G$  vale che  $gHg^{-1}$  è un sottogruppo di  $G$  di ordine  $d$ , dunque siccome  $H$  è l'unico sottogruppo con queste proprietà segue che  $gHg^{-1} = H$ , da cui la tesi.  $\square$

**Corollario 2.2.6** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo. Se  $H$  è l'unico sottogruppo ciclico di ordine  $d$  di  $G$ , allora  $H \triangleleft G$ .

**Dimostrazione.** Se  $H = \langle h \rangle$  per qualche  $h \in G$  allora segue che il coniugato  $gHg^{-1}$  è generato dall'elemento  $ghg^{-1}$ , dunque anche esso è ciclico. Tuttavia l'unico sottogruppo di  $G$  di ordine  $d$  e ciclico è  $H$ , da cui segue che  $gHg^{-1} = H$ , ovvero  $H$  è normale in  $G$ .  $\square$

Sfruttando le due proposizioni precedenti segue che per ogni  $d$  che divide  $n$  ( $d > 2$ ) il sottogruppo  $\langle r^{\frac{n}{d}} \rangle$  è normale in  $D_n$ .

Questo ragionamento non ci permette di mostrare che  $\langle r^{\frac{n}{2}} \rangle$  è normale in  $D_n$ ; tuttavia possiamo dimostrarlo studiando il centro di  $D_n$ .

**Proposizione 2.2.7**

$$Z(D_n) = \begin{cases} \{ \text{id} \}, & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \langle r^{\frac{n}{2}} \rangle, & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

**Dimostrazione.** Per definizione di centro di un gruppo, un elemento è nel centro se e solo se commuta con tutti gli elementi del

gruppo; è dunque sufficiente mostrare che un elemento commuta con i generatori del gruppo. Segue quindi che

$$Z(D_n) = \left\{ s^\varepsilon r^j \in D_n : s^\varepsilon r^j \cdot r = r \cdot s^\varepsilon r^j, s^\varepsilon r^j \cdot s = s \cdot s^\varepsilon r^j \right\}.$$

Se  $s^\varepsilon r^j$  soddisfa la seconda condizione, allora

$$\begin{aligned} s^\varepsilon r^j \cdot s &= s \cdot s^\varepsilon r^j \\ \iff s^\varepsilon s r^{-j} &= s \cdot s^\varepsilon r^j \\ \iff s^{\varepsilon+1} r^{-j} &= s^{\varepsilon+1} r^j \\ \iff r^{-j} &= r^j. \end{aligned}$$

Dunque segue che  $j \equiv -j \pmod n$ , ovvero  $2j \equiv 0 \pmod n$ . Abbiamo quindi due casi:

- Se  $n$  è dispari questo significa che  $j \equiv 0 \pmod n$ , ovvero  $j = 0$ . Le possibili scelte sono quindi  $\text{id}$  ed  $s$ ; tuttavia  $s$  non commuta con  $r$ , dunque l'unico elemento che rispetta entrambe le condizioni è  $\text{id}$  e quindi

$$Z(D_n) = \{ \text{id} \}.$$

- Se  $n$  è pari questo implica  $j \equiv 0 \pmod{n/2}$ , da cui segue che  $j = 0, n/2$ . I quattro elementi che possono essere nel centro di  $D_n$  sono quindi

$$\text{id}, r^{\frac{n}{2}}, s, sr^{\frac{n}{2}}.$$

Tuttavia  $s$  e  $sr^{n/2}$  non commutano con  $r$ , in quanto

$$sr = r^{-1}s, \quad sr^{n/2} \cdot r = sr^{\frac{n}{2}+1} \neq sr^{\frac{n}{2}-1} = r \cdot sr^{\frac{n}{2}}.$$

Dunque gli unici elementi nel centro sono  $\text{id}, r^{n/2}$ , da cui segue che

$$D_n = \langle r^{\frac{n}{2}} \rangle. \quad \square$$

Siccome il centro di un gruppo è sempre un sottogruppo normale di quel gruppo (per la [Proposizione 1.5.11](#)) segue che  $\langle r^{n/2} \rangle$  è un sottogruppo normale di  $D_n$ .

## 2.3 AZIONI DI GRUPPO

**Definizione 2.3.1** **Azione di un gruppo su un insieme.** Sia  $(G, \cdot)$  un gruppo e  $X$  un insieme qualunque. Si dice *azione di  $G$  su  $X$*  un omomorfismo di gruppi

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow \mathcal{S}(X) \\ g &\mapsto \varphi_g. \end{aligned}$$

Altre notazioni che useremo per la permutazione degli elementi di  $X$  definita da  $g$  sono  $gx$  e  $x^g$ .

**ESEMPIO 2.3.2.** Se  $X = G$  un possibile esempio è dato dal coniugio per  $g$ : l'applicazione  $g \mapsto \varphi_g$  dove  $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$  è un omomorfismo tra il gruppo  $G$  e il gruppo delle permutazioni degli elementi di  $G$ , dunque è un'azione di  $G$  su  $G$ .

**ESEMPIO 2.3.3.** Sia  $V$  un  $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale. Allora l'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{K}^\times &\rightarrow \mathcal{S}(V) \\ \lambda &\mapsto \varphi_\lambda \end{aligned}$$

e  $\varphi_\lambda(\vec{v}) = \lambda \cdot \vec{v}$  è un'azione del gruppo degli scalari sullo spazio vettoriale. Più in generale, potremmo definire uno spazio vettoriale come un gruppo abeliano additivo su cui è definita un'azione di  $\mathbb{K}^\times$  su  $V$ .

**Classe di equivalenza definita da un'azione**

Sia  $\varphi : G \rightarrow \mathcal{S}(V)$  un'azione di gruppo.  $\varphi$  definisce su  $X$  la seguente relazione:

$$x \sim y \iff \exists g \in G \text{ tale che } \varphi_g(x) = y. \quad (20)$$

**Proposizione 2.3.4**

*La relazione definita da un'azione di gruppo è una relazione di equivalenza.*

**Dimostrazione.** Sia  $G$  un gruppo,  $X$  l'insieme su cui  $G$  agisce. Mostriamo che la relazione  $\sim$  definita nella (20) è una relazione di equivalenza.

**RIFLESSIVITÀ** Sia  $x \in X$ . Siccome  $\varphi$  è un omomorfismo di gruppi segue che  $\varphi(e_G) = \varphi_e = \text{id}$ , da cui

$$\varphi_e(x) = \text{id}(x) = x.$$

**SIMMETRIA** Siano  $x, y \in X$  tali che  $x \sim y$ , ovvero  $\varphi_g(x) = y$  per qualche  $g \in G$ . Mostriamo che  $\varphi_{g^{-1}}(y) = x$ : applicando  $\varphi_{g^{-1}}$  ad entrambi i membri otteniamo

$$\begin{aligned} \varphi_{g^{-1}}(y) &= \varphi_{g^{-1}}(\varphi_g(x)) \\ &= (\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g)(x) \\ &= (\varphi(g^{-1}) \circ \varphi(g))(x) \\ &= (\varphi(g)^{-1} \circ \varphi(g))(x) \\ &= x, \end{aligned}$$

da cui segue  $y \sim x$ .

**TRANSITIVITÀ** Siano  $x, y, z \in X$  tali che  $x \sim y$  e  $y \sim z$ , ovvero  $\varphi_g(x) = y$  e  $\varphi_h(y) = z$  per qualche  $g, h \in G$ . Allora vale che

$$\begin{aligned} z &= \varphi_h(\varphi_g(x)) \\ &= (\varphi_h \circ \varphi_g)(x) \\ &= (\varphi(h) \circ \varphi(g))(x) \\ &= \varphi(hg)(x) \\ &= \varphi_{hg}(x), \end{aligned}$$

da cui segue che  $x \sim z$ . □

**OSSERVAZIONE.** Notiamo che siccome  $\varphi$  è un omomorfismo di gruppi, se  $\varphi_g$  e  $\varphi_h$  sono le azioni di  $g$  e  $h$  sull'insieme  $X$ , allora la loro composizione sarà l'azione

$$\varphi_g \circ \varphi_h = \varphi(g) \circ \varphi(h) = \varphi(g h) = \varphi_{gh}.$$

Invece, data l'azione  $\varphi_g$  di  $g$  su  $X$ , segue che la sua inversa è  $\varphi_{g^{-1}}$ :

$$\begin{aligned} \varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g &= \varphi(g^{-1}) \circ \varphi(g) = \varphi(g)^{-1} \circ \varphi(g) = \text{id}. \\ \varphi_g \circ \varphi_{g^{-1}} &= \varphi(g) \circ \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \circ \varphi(g)^{-1} = \text{id}. \end{aligned}$$

**Definizione 2.3.5**

**Orbita.** Sia  $G$  un gruppo che agisce sull'insieme  $X$ . Dato  $x \in X$  si dice *orbita di  $x$*  l'insieme

$$\text{orb}(x) := \{ \varphi_g(x) : g \in G \} \subseteq X.$$

**OSSERVAZIONE.** L'orbita di  $x$  è esattamente la classe di equivalenza data dalla relazione di equivalenza definita in (20). In particolare se  $R$  è un insieme di rappresentanti vale che

$$X = \bigsqcup_{x \in R} \text{orb}(x).$$

**Definizione 2.3.6**     **Stabilizzatore.** Sia  $G$  un gruppo che agisce sull'insieme  $X$ . Dato  $x \in X$  si dice *stabilizzatore di  $x$*  l'insieme

$$\text{St}(x) := \{ g \in G : \varphi_g(x) = x \} \subseteq G.$$

**Proposizione 2.3.7**     **Lo stabilizzatore è un sottogruppo.** Sia  $G$  un gruppo che agisce sull'insieme  $X$ ; sia inoltre  $x \in X$ . Allora vale che

$$\text{St}(x) \leq G.$$

**Dimostrazione.** Innanzitutto  $e_G \in \text{St}(x)$  in quanto  $\varphi_e(x) = x$  (l'azione dell'identità è sempre l'identità).

Supponiamo che  $g \in \text{St}(x)$ , ovvero  $\varphi_g(x) = x$ : mostriamo che anche  $g^{-1} \in \text{St}(x)$ , ovvero  $\varphi_{g^{-1}}(x) = x$ . Applichiamo ad entrambi i membri l'azione  $(\varphi_g)^{-1}$ , ottenendo

$$(\varphi_g)^{-1}(x) = (\varphi_g)^{-1}(\varphi_g(x)) = x.$$

Come abbiamo osservato precedentemente,  $(\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}}$ , da cui segue che  $x = \varphi_{g^{-1}}(x)$  e quindi  $g^{-1} \in \text{St}(x)$ .

Supponiamo infine che  $g, h \in \text{St}(x)$  e mostriamo che  $hg \in \text{St}(x)$ . Infatti

$$\begin{aligned} \varphi_{hg}(x) &= (\varphi_h \circ \varphi_g)(x) \\ &= \varphi_h(\varphi_g(x)) \\ &= \varphi_h(x) \\ &= x. \end{aligned}$$

Dunque  $\text{St}(x)$  è un sottogruppo di  $G$ . □