

FÍSICO 30



VOLUMEN I · MANUAL TEÓRICO

La ciencia práctica para bajar grasa, ganar fuerza y verte con más presencia

Entendé las cuatro palancas del cambio físico y evitá los errores que hacen perder músculo, rendimiento y adherencia.

DÉFICIT · FUERZA · MOVIMIENTO · RECUPERACIÓN

Primero entendé qué produce el cambio

Este volumen explica por qué el cuerpo cambia cuando coordinás alimentación, fuerza, movimiento y recuperación. Después, el Volumen II convierte esa lógica en 30 días de decisiones concretas.

EL OBJETIVO

No perseguís una cifra imposible ni una transformación publicitaria. Buscás una diferencia visible, medible y sostenible: menos cintura, más fuerza, mejor postura y una rutina que puedas continuar.

ENTENDÉ

Leé los fundamentos una vez. Marcá las páginas que explican tu mayor obstáculo.

ELEGÍ

En el plan práctico seleccioná ruta gimnasio o calistenia. No mezcles por ansiedad.

EJECUTÁ

Cumplí la misión diaria, registrá datos y progresá solo cuando la técnica se mantiene.

EVALUÁ

Compará promedios, medidas, fotos y rendimiento. Un día aislado no decide nada.

SECUENCIA RECOMENDADA

1) Leé este volumen completo. 2) Elegí la ruta del Volumen II. 3) Tomá la línea de base. 4) Ejecutá treinta días sin rediseñar el método cada mañana.

Contenido

Este índice es interactivo. Tocá una sección para ir directamente.

01	Cómo usar este volumen	02
02	Qué puede cambiar realmente en 30 días	04
03	Las cuatro palancas del cambio	05
04	Déficit: la condición para perder grasa	06
05	Proteína y preservación muscular	08
06	Fuerza, progresión y volumen	10
07	Pasos, cardio y recuperación	14
08	Medición, seguridad y fuentes	17

Treinta días alcanzan para verte distinto; no para terminar

En cuatro semanas podés reducir grasa y distensión, recuperar tono, mejorar la postura y mover cargas que hoy cuestan. La magnitud depende de tu punto de partida, sueño, adherencia, salud y experiencia.

VISIBLE

Fotos más limpias, cintura menor, ropa distinta y mejor control corporal.

MEDIBLE

Promedio de peso, perímetro, repeticiones y cargas comparables.

NO PROMETEMOS

Una cantidad exacta de kilos, abdominales visibles o ganar gran masa muscular en un mes.

SÍ CONTROLÁS

Sesiones cumplidas, proteína, porciones, pasos, sueño y técnica.

LA PROMESA PROFESIONAL

Si ejecutás el sistema, al día 30 tendrás evidencia objetiva para afirmar que avanzaste o datos suficientes para ajustar con criterio. El resultado no depende de sufrir más: depende de repetir mejor.

El físico cambia cuando cuatro palancas trabajan juntas

Ninguna compensa por completo la ausencia de otra. Entrenar sin controlar la ingesta puede no bajar grasa; comer poco sin fuerza puede llevarse músculo y rendimiento.



REGLA DE DIAGNÓSTICO

Si el progreso se frena, revisá una palanca por vez. Cambiar todo a la vez impide saber qué funcionó.

Perder grasa exige un déficit; pasar hambre, no

El peso baja cuando, en promedio, la energía que entra es menor que la que gastás. La estrategia útil crea un déficit moderado que todavía permite entrenar, dormir y pensar.

BALANCE SEMANAL

GASTO



INGESTA



Déficit moderado: la ingesta queda un poco por debajo del gasto promedio, sin vaciar tu rendimiento.

RUTA CON CALORÍAS

Usá el planificador del NIH o tu registro real. Empezá con una reducción moderada y ajustá por promedio semanal.

RUTA SIN CONTAR

Usá el plato F30, proteína en cada comida, bebidas sin calorías y porciones repetibles.

DEMASIADO AGRESIVO


Hambre extrema, mareo, irritabilidad, caída rápida de rendimiento o atracones.

SUFICIENTE

Podés entrenar, dormir, trabajar y sostener la pauta la mayoría de los días.

La balanza mide más que grasa

Agua, sodio, carbohidratos, contenido intestinal y entrenamiento pueden mover el peso varios días. Por eso se comparan promedios, no emociones de una mañana.



RITMO DE REFERENCIA

Para muchos adultos, una pérdida gradual cercana a 0,5–1 kg por semana es más sostenible. En personas entrenadas suele usarse aproximadamente 0,5–1 % del peso semanal; cuanto más magro estés, más conservador conviene ser.

MEDÍ IGUAL

Mañana, después del baño, antes de comer y en condiciones parecidas.

COMPARÁ 7 VS. 7

Promedio de siete días contra el promedio de los siete anteriores.

AJUSTÁ TARDE

No cambies calorías por dos días de ruido. Mirá al menos dos semanas si la adherencia fue real.

Bajar peso no alcanza: querés conservar músculo

La proteína y el entrenamiento de fuerza ayudan a sostener masa magra durante el déficit. Para adultos sanos que entrenan, 1,6 g/kg/día es una referencia sólida; algunas personas usan hasta 2,2 g/kg/día en etapas de pérdida de grasa.

1,6

GRAMOS POR KG / DÍA

Ejemplo: $80 \text{ kg} \times 1,6 = 128 \text{ g}$ diarios. Si existe obesidad marcada o una condición renal, no uses el peso actual automáticamente: consultá a un profesional.

DESAYUNO

Huevos + claras, yogur alto en proteína o tofu revuelto.

ALMUERZO

Pollo, carne magra, pescado, legumbres o soja.

MERIENDA

Yogur, leche, queso magro o batido por conveniencia.

CENA

Otra porción central de proteína con verduras y carbohidrato según actividad.

DISTRIBUCIÓN SIMPLE

Repartí la proteína en 3–5 comidas. No necesitás una ventana mágica: necesitás llegar al total con alimentos que puedas repetir.

El plato que reduce decisiones

La calidad no reemplaza al déficit, pero hace más fácil sostenerlo. Un plato repetible ordena volumen, proteína y energía sin convertir cada comida en una ecuación.



GRASA

1 pulgar de aceite, frutos secos, queso o palta; medila porque concentra energía.

BEBIDA

Agua, soda, café o té sin azúcar. Las calorías líquidas sacian poco.

FLEXIBILIDAD

Dejá un margen para comidas sociales sin convertir una excepción en una semana.

La fuerza le dice al cuerpo qué tejido conservar

El objetivo del mes no es salir destruido. Es repetir los grandes patrones con técnica, acercarte al esfuerzo suficiente y producir una mejora que pueda registrarse.

1

TÉCNICA

Mismo recorrido, control y postura.

2

REPETICIONES

Sumá dentro del rango indicado.

3

CARGA

Subí poco cuando completás el rango.

4

VARIACIÓN

Elegí una versión más exigente.

DOBLE PROGRESIÓN

Ejemplo 8–12 repeticiones: si hacés 10/10/9 con buena técnica, intentá 10/10/10. Cuando llegues a 12/12/12 dejando el esfuerzo previsto, aumentá ligeramente la carga y volvé cerca de 8.

FRECUENCIA

Cada gran grupo muscular al menos dos veces por semana.

VOLUMEN INICIAL

Dos o tres series útiles por ejercicio son suficientes para empezar.

EQUIPAMIENTO

Máquinas, pesos libres, bandas o peso corporal pueden funcionar.

Ocho patrones cubren casi todo lo que necesitas

La rutina práctica alterna implementos, pero conserva la función. Si no hay gimnasio, cambiás la herramienta; no abandonás el patrón.

1 SENTADILLA

Gimnasio · Sentadilla con mancuerna

Calistenia · Sentadilla a silla

2 BISAGRA

Gimnasio · Peso muerto rumano

Calistenia · Mochila / puente

3 EMPUJE HORIZONTAL

Gimnasio · Press con mancuernas

Calistenia · Flexiones

4 TIRÓN HORIZONTAL

Gimnasio · Remo en cable

Calistenia · Remo con mochila

5 EMPUJE VERTICAL

Gimnasio · Press militar

Calistenia · Flexión pica

6 TIRÓN VERTICAL

Gimnasio · Jalón al pecho

Calistenia · Dominada asistida

7 UNILATERAL

Gimnasio · Zancada inversa

Calistenia · Zancada fija

8 CORE / CARGA

Gimnasio · Press Pallof / caminata

Calistenia · Plancha / mochila

REGLA DE SUSTITUCIÓN

Si un ejercicio duele, no fuerces la versión. Conservá el patrón con un rango, carga o variante tolerable y pedí evaluación cuando el dolor sea persistente.

RIR: cuántas repeticiones te quedaban

RIR significa repeticiones en reserva. Te permite ajustar el esfuerzo aunque cambien las cargas o la variante. En este mes la mayoría de las series termina con 1–3 repeticiones técnicamente posibles.

RIR 4+

MUY FÁCIL

Calentamiento o aprendizaje.

RIR 3

CONTROLADO

Semana 1 y series iniciales.

RIR 2

PRODUCTIVO

La mayor parte del programa.

RIR 1

DURO

Últimas series con técnica estable.

RIR 0

FALLO


No es necesario para progresar.

LA REPETICIÓN QUE CUENTA

Terminá la serie cuando la próxima repetición exigiría acortar el recorrido, perder postura o acelerar con impulso. Técnica antes que número.

Tres sesiones completas superan a siete promesas

La consistencia importa más que la complejidad. El plan usa tres entrenamientos de cuerpo completo, caminatas y una sesión opcional de acondicionamiento.



RECUPERAR TAMBIÉN ES ENTRENAR

Un músculo no mejora durante la serie: responde después. Si el rendimiento cae, el sueño empeora y el dolor articular aumenta, sumar volumen puede retrasar el resultado.

DOLOR MUSCULAR

Esperable al empezar, pero no es una medida de calidad.

DOLOR ARTICULAR


No se ignora. Reducí rango o carga y reevalúa.

PROGRESO

Misma técnica con más repeticiones, carga o control.

Los pasos crean gasto sin competir con la fuerza

El movimiento cotidiano suele caer cuando comés menos. Por eso el plan no impone 10.000 pasos: mide tu línea de base y suma una cantidad que puedas sostener.



ESCALERA DE PASOS

Ejemplo, no obligación: línea de base + 1.000–1.500 pasos en la primera semana; después agregá 500–1.000 si la recuperación sigue bien. Caminatas de 10 minutos también cuentan.

CARDIO MODERADO

Podés hablar en frases, respirás más fuerte. 20–30 minutos.

INTERVALOS

Opcionales. No son superiores si reducen tu adherencia o fuerza.

META SANITARIA

Progresá hacia 150–300 min moderados por semana según capacidad.

Dormir sostiene el déficit; no es tiempo perdido

Dormir poco no invalida un día, pero vuelve más difícil regular hambre, entrenar con calidad y recuperarte. Para adultos sanos, la recomendación general es dormir al menos siete horas de manera habitual.



RITUAL MÍNIMO

Hora de despertar estable, cafeína lejos de la noche, pantallas fuera de la cama y dormitorio oscuro. Si roncás fuerte, te ahogás al dormir o vivís con somnolencia, consultá.

Lo opcional nunca rescata lo básico

La mayor parte del resultado viene del déficit, la proteína, la fuerza y el sueño. Un suplemento puede facilitar una necesidad concreta; no reemplaza conductas.

VERDE

CREATINA MONOHIDRATO

3–5 g diarios puede mejorar el rendimiento de fuerza. Puede aumentar algo el peso por agua muscular.

VERDE

PROTEÍNA EN POLVO

Solo una forma cómoda de llegar a la proteína. No es obligatoria ni quema grasa.

AMARILLO

CAFEÍNA

Puede ayudar al rendimiento, pero empeora sueño o ansiedad en algunas personas.

ROJO

QUEMADORES / DETOX

Promesas caras, efectos modestos o riesgos. No son parte del método.

ANTES DE SUPLEMENTAR

Si tomás medicación, tenés una condición médica, estás embarazada o amamantando, consultá con un profesional. Más no significa mejor.

El espejo opina; el sistema compara

Usá varias señales. El porcentaje de grasa de una balanza doméstica puede variar mucho; sirve mejor para observar tendencia en condiciones iguales que como verdad exacta.

PESO PROMEDIO

Siete mañanas comparables. No el valor más bajo.

CINTURA

Mismo punto anatómico, relajado, sin apretar la cinta.

FOTOS

Frente, perfil y espalda; misma luz, distancia y postura.

RENDIMIENTO

Carga, repeticiones, variante y RIR de los ejercicios base.

ADHERENCIA

Sesiones, proteína, pasos y sueño. Lo que hiciste explica el resultado.

BIENESTAR

Hambre, energía, dolor, libido y concentración ayudan a ajustar.

LA COMPARACIÓN JUSTA

Una foto distinta, una balanza distinta o una medida tomada después de comer pueden fabricar un resultado. Estandarizar es parte del método.

El plan es para adultos sanos; el dolor no es una prueba

Empezá de forma gradual. Si llevás mucho tiempo inactivo o tenés una condición cardiovascular, metabólica, renal, articular o un antecedente de trastorno alimentario, pedí orientación profesional.

DETENÉ LA SESIÓN

Dolor de pecho, desmayo, falta de aire inusual, palpitaciones intensas o dolor agudo.

MODIFICÁ

Dolor articular creciente, técnica que se pierde o fatiga que no mejora con descanso.

PEDÍ AYUDA NUTRICIONAL

Atracones, miedo intenso a comer, purgas, pérdida rápida o pensamientos obsesivos.

NO APLICA

Menores de 18 años, embarazo o lactancia sin indicación profesional individual.

SEMÁFORO DE DOLOR

0–2/10 y no empeora: observá. 3–5/10 o altera el movimiento: reducilo y reevalúá. Dolor fuerte, repentino, neurológico o acompañado de síntomas sistémicos: detenete y buscá atención.

Decisiones trazables, no reglas inventadas

El plan traduce recomendaciones y revisiones a un formato operativo para adultos sanos. Tocá cada fuente para abrirla.

01**ACSM, 2026**

Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults.

02**HHS, Physical Activity Guidelines**

150–300 minutos moderados y fuerza al menos dos días por semana.

03**CDC, 2025**

Steps for Losing Weight: pérdida gradual, alimentación, actividad, sueño y manejo del estrés.

04**Morton et al., 2018**

Meta-análisis de proteína y entrenamiento de fuerza; punto de referencia cercano a 1,6 g/kg/día.

05**Aragon et al., 2017**

ISSN position stand: diets and body composition.

06**NIDDK Body Weight Planner**

Herramienta de NIH para estimar una meta personalizada de calorías y actividad.

07**MyPlate, USDA**

Variedad de alimentos proteicos y construcción de un patrón equilibrado.

08**AASM/SRS**

Adultos: siete o más horas de sueño por noche de manera regular.

09**Kreider et al., 2017**

ISSN position stand: seguridad y eficacia de la creatina.

Ya entendés qué produce el cambio. Ahora toca ejecutarlo.

Abrí el Volumen II. Elegí una ruta, registrá tu línea de base y comenzá por el Día 1. No adelantes sesiones para compensar ansiedad: el progreso está diseñado para acumularse.

TU SIGUIENTE PASO

Volumen II • Plan de Acción

Treinta días, doce sesiones de fuerza, dos rutas de equipamiento, alimentación flexible y un tablero final.

Menos improvisación.

Más evidencia.