

Maths Devoir Maison 4

4 Décembre, 2023

Lucas Duchet-Annez

Rédacteur Lucas Duchet-Annez

Exercice 1

Partie A

On sait que (Cf) admet deux asymptotes d'équations $x = 1$ et $x = -1$ cela veut dire que f n'est pas définie quand $x = 1$ ou $x = -1$ or f est une fonction rationnelle définie tant que son dénominateur est différent de 0 soit quand $x^2 - c \neq 0$ Donc $c = (1)^2$ ou $c = (-1)^2$ soit $c = 1$.

$$\begin{aligned}f(x) - (x + 2) &= \frac{ax^3 + bx^2}{x^2 - 1} - x - 2 \\&= \frac{(a - 1)x^3 + (b - 2)x^2 + x + 2}{x^2 - 1} \\&= \frac{x^3 \left(a - 1 + \frac{b-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)} \\&= x \frac{a - 1 + \frac{b-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}}\end{aligned}$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} a - 1 + \frac{b-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = a - 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1$ De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(a - 1) = 0$

Pour que la limite soit 0 il faut que $a - 1 = 0$ soit $a = 1$

Finalement On peut noter

$$\begin{aligned}f(x) - (x + 2) &= x \frac{1 - 1 + \frac{b-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}} \\&= \frac{\frac{b-2}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2}}\end{aligned}$$

A nouveau $\frac{1}{x}$ et $\frac{1}{x^2}$ tendent vers 0 lorsque x tend vers $+\infty$. Par conséquent on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} b - 2 = 0$ Donc $b = 2$

Partie B

1. Pour étudier les variations de g on analyse le signe de sa dérivée. $g'(x) = 3x^2 - 3$ $g'(x) > 0$
 $3x^2 - 3 > 0 \Rightarrow x^2 > \frac{3}{3} \Rightarrow x^2 > 1 \Rightarrow x > 1$ ou $x < -1$

Pour calculer les limites de g on factorise par le terme prépondérant. $g(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3}\right)$
On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{x^2} - \frac{4}{x^3} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$. Par conséquent $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ On en déduit

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
signe de $g'(x)$		+	0	-	0	+	
var de g	$-\infty$	↗	$g(-1)=-2$	↘	$g(1)=-6$	↗	$+\infty$

2. a. On peut étudier chaque intervalle à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Premièrement g est une fonction polynomiale donc définie et dérivable sur \mathbb{R} , par conséquent g est une fonction continue sur \mathbb{R} . Sur l'intervalle $] -\infty; -1]$ g est croissante et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, $g(-1) = -2$ donc (Cg) ne coupe pas l'axe des abscisses et l'équation $g(a) = 0(E)$ n'a pas de solution de manière analogue sur $[-1; 1]$ g est décroissante et comme $g(-1) < 0$ (E) n'a pas non plus de solution. Finalement sur $[1; +\infty[$ g est croissante et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty > 0$, $g(1) = -6 < 0$ Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires (E) a une unique solution sur l'intervalle $[1; +\infty[$
- b. $g(2.19) = -0.066541$ et $g(2.20) = 0.048$ ce qui veut dire que $g(2.19) < a < g(2.20)$ soit d'après le théorème des valeurs intermédiaires $2.19 < a < 2.20$

3. $g(x) > 0 \iff x^3 - 3x - 4 > 0 \iff x > a$ On en déduit le tableau suivant

x	$-\infty$		a		$+\infty$
signe de $g(x)$		-	0	+	

Partie C

1. f est définie quand son dénominateur est différent de 0 soit quand $x^2 - 1 \neq 0$ donc quand $x \neq 1$ et $x \neq -1$ donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ De plus $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = x^3 + 2x^2$ et $v(x) = x^2 - 1$ donc son ensemble de dérivabilité est $D_{f'} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ car v n'est pas définie quand $x = 1$ et $x = -1$
2. f satisfait les conditions de la partie A car $f(0) = \frac{0^3 + 2(0^2)}{0^2 - 1} = 0$ donc f passe par l'origine. De plus f n'est pas définie en -1 et 1 comme dans la partie A et la limite de $f(x) - (x + 2) = \frac{x^3 + 2x^2 - x^3 + x - 2x^2 + 2}{x^2 - 1} = \frac{1 + \frac{2}{x^2}}{x(1 - \frac{1}{x^2})}$ Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 2) = 0$ et de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - (x + 2) = 0$
3. a. $f'(x) = \frac{(x^2 - 1)(3x^2 + 4x) - 2x(x^3 + 2x^2)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^4 - 3x^2 - 4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{xg(x)}{(x^2 - 1)^2}$
- b.

$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$ car $x < -1 \implies x^2 > 1$ car x^2 est décroissante sur \mathbb{R}^- $x^2 - 1 > 0$

et de manière analogue $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$ car $x > -1 \implies x^2 < 1$ car x^2 est décroissante sur \mathbb{R}^- $x^2 - 1 < 0$

De plus $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ car $x > 1 \implies x^2 > 1$ car x^2 est croissante sur \mathbb{R}^+ $x^2 - 1 > 0$ Finalement $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ car $x < 1 \implies x^2 < 1$ car x^2 est croissante sur \mathbb{R}^+ $x^2 - 1 < 0$

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
signe de $xg(x)$		+		+	0	-		-	
var de f	$x+2$	↗		↗	0	↘		↘	$x+2$

4. a. $x + 2 + \frac{x+2}{x^2-1} = \frac{x+2+(x+2)(x^2-1)}{x^2-1} = \frac{x+2-2-x+x^3+2x^2}{x^2-1} = f(x)$
 b. Par conséquent $f(x) - (x+2) = \frac{x+2}{x^2-1}$ Donc quand x tend vers $-\infty$ (Cf) sera légèrement en dessous de Δ et inversement quand x tend vers $+\infty$

5.




Figure 1: Graphique

Partie D




Figure 2: $h(x)$ en pointillé

Exercice 3