

A partir das funções abaixo:

•

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{sujeito a:} & x \in \Omega. \end{array}$$

• $f(x_1, x_2) = x_1^2 + (e^{x_1} - x_2)^2$

• $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2\}$

1. Faça um pequeno estudo para um melhor entendimento do comportamento de suas funções. Exemplo: Pontos críticos, convexidade, existência de ótimo, plotar, etc.
2. Implemente o algoritmo para obter o(s) ponto(s) mínimo(s), caso exista(m), das funções acima.
3. Utilizando os métodos: Gradiente, Newton e quase-Newton.
4. Utilize a busca de seção Áurea e Armijo para as implementações.
5. Utilize um ou mais critérios de parada, lembrando-se de deixar claro quais foram utilizados.

Exemplos de critérios:

- (a) $x^k = x^{k-1}$
- (b) $\Delta f(x^k) = 0$
- (c) Limite de tempo
- (d) Limite de iterações

Poderão ser utilizados outros critérios de parada que o grupo achar conveniente, não ficando limitados aos citados acima.

6. Faça uma tabela com os resultados obtidos para cada método, contendo: ponto inicial, número de iterações, número de chamadas da busca, ponto ótimo encontrado, valor no ponto ótimo encontrado e erro absoluto de aproximação.

Para a apresentação do trabalho, serão considerados a implementação dos algoritmos, os resultados obtidos, as justificativas para os resultados obtidos e as decisões tomadas pelo grupo. É aconselhável levar uma folha com as tabelas de resultados e informações que o grupo achar válido comentar.

Tabela 1:

X^0	Iter.	Call. Armijo	Opt. Point	Opt. Value	Error
(0.45, 0.51)	65	65	(0.499999,0.5)	1.66511	9.27003e-007
(0.4,0.6)	71	71	(0.499999,0.500001)	1.66511	9.93398e-007
(0.1,0.9)	85	85	(0.499999,0.500001)	1.66511	8.92053e-007
(0.2,0.3)	79	79	(0.499999, 0.499999)	1.66511	8.79813e-007
(0.7,0.6)	75	75	(0.500001,0.500001)	1.66511	8.82938e-007