

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATÓRIO FINAL

Aprendizado de máquina e geometria hiperbólica complexa

Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e Computação

Aluno: Lucas Giraldo Almeida Coimbra
Orientador: Carlos Henrique Grossi Ferreira

Junho de 2023

São Carlos

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Geometria hiperbólica	2
2.1	Variedades e métricas riemannianas	2
2.2	Geodésicas	3
2.3	Modelos para a geometria hiperbólica	4
3	Redes neurais	4
4	Misturando tudo	4

1 Introdução

2 Geometria hiperbólica

2.1 Variedades e métricas riemannianas

Uma *variedade topológica de dimensão n* é um espaço topológico M Hausdorff com base enumerável que é *localmente euclidiano de dimensão n* , isso é, para cada $p \in M$ existe um aberto U e um homeomorfismo $\phi: U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$. O par (U, ϕ) será comumente chamado de *carta sobre p* . Se (V, ψ) é uma outra carta em M tal que $U \cap V \neq \emptyset$, chamamos de *mapas de transição* as funções

$$\phi \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap V) \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{e} \quad \psi \circ \phi^{-1}: \phi(U \cap V) \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Se os mapas de transição forem suaves, diremos que (U, ϕ) e (V, ψ) são *compatíveis*. Uma *estrutura diferenciável* em M é uma cobertura de M por cartas que são duas a duas compatíveis. Dizemos que M é *suave* ou *diferenciável* se possuir uma estrutura diferenciável.

A partir de agora, toda carta estará em uma estrutura diferenciável previamente fixada, e portanto toda variedade será suave. Se $p \in M$ dizemos que $F: M \rightarrow N$ é *suave em p* se existirem (U, ϕ) carta sobre p e (V, ψ) carta sobre $F(p)$ tais que $\psi \circ F \circ \phi^{-1}$ é suave. A função F é *suave em $U \subset M$* se for suave em todo ponto de U , e é apenas *suave* se for suave em todo ponto de M .

Uma *curva* em M é um mapa suave $c: I \rightarrow M$ onde I é um intervalo de \mathbb{R} . Se $p \in M$, definimos por C_p^∞ como o conjunto dos mapas $f: U \subset M \rightarrow \mathbb{R}$ suaves, onde U é uma vizinhança qualquer de p . Esse espaço é uma álgebra com as três operações:

- se $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: V \rightarrow \mathbb{R}$, definimos $f + g: U \cap V \rightarrow \mathbb{R}$ por $(f + g)(p) = f(p) + g(p)$;
- se $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, definimos $\lambda f: U \rightarrow \mathbb{R}$ por $(\lambda f)(p) = \lambda f(p)$;
- se $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: V \rightarrow \mathbb{R}$, definimos $fg: U \cap V \rightarrow \mathbb{R}$ por $(fg)(p) = f(p)g(p)$.

Dada uma curva $c:]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M$, definimos $c'(0)$ como sendo um mapa $c'(0): C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$c'(0)f = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (f \circ c)(t). \quad (2)$$

Esse mapa é linear e satisfaz a *regra de Leibniz*, isso é,

$$c'(0)(fg) = f(c(0)) \cdot c'(0)g + c'(0)f \cdot g(c(0)). \quad (3)$$

Se $p \in M$, o *espaço tangente a M em $p \in M$* como o conjunto

$$T_p M = \{c'(0) \mid c:]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow M \text{ e } c(0) = p\}. \quad (4)$$

Se M tem dimensão n , então $T_p M$ é um espaço vetorial de dimensão n . Seus elementos são chamados de *vetores tangentes*. Uma *métrica riemanniana* em M é a associação de um produto interno $\mathbf{g}_p(-, -)$ em $T_p M$ para cada $p \in M$. Mais do que isso, pedimos que essa associação seja suave. Entenderemos o que isso significa a seguir.

Um *campo vetorial* em M é uma associação X de um vetor $X_p \in T_p M$ para cada $p \in M$. Se $\phi = (x^1, \dots, x^n)$ é uma carta sobre $p \in M$ e $r = (r^1, \dots, r^n)$ são as coordenadas em \mathbb{R}^n , definimos as derivadas parciais de $f \in C_p^\infty$ por

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_p = \left. \frac{\partial}{\partial r^i} \right|_{\phi(p)} (f \circ \phi^{-1})(r). \quad (5)$$

Cada derivada parcial em p pode ser vista como um elemento de $T_p M$, afinal, se e^1, \dots, e^n é a base canônica de \mathbb{R}^n , então dadas as curvas $c^i(t) = te^i$ temos

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p = (\phi^{-1} \circ c^i)'(0). \quad (6)$$

Esses vetores tangentes formam uma base para $T_p M$.

Se (U, ϕ) é uma em M e X é um campo vetorial em M , então para cada $p \in M$ podemos escrever, de maneira única,

$$X_p = \sum_{k=1}^n a^k(p) \left. \frac{\partial}{\partial x^k} \right|_p. \quad (7)$$

Dizemos que o campo vetorial X é *suave* se existir uma cobertura de M por cartas tais que os mapas a^i são sempre suaves. Ao dizermos que a métrica riemanniana tem que ser suave, queremos dizer que, para quaisquer X, Y campos suaves em M , o mapa $p \mapsto \mathfrak{g}_p(X_p, Y_p)$ tem que ser suave. Uma *variedade riemanniana* é uma variedade suave equipada com uma métrica riemanniana.

2.2 Geodésicas

Denotamos o conjunto de todos os campos suaves em M por $\mathfrak{X}(M)$. Se $M = \mathbb{R}^n$, vamos entender quem é a derivada direcional. Se $X = (v^1, \dots, v^n) \in \mathbb{R}^n$ e X_p é o vetor tangente a p na direção X , então dada $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definimos a *derivada direcional de f na direção X_p*

$$D_{X_p} f = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p + tX) - f(p)}{t} = \sum_{k=1}^n v^k \left. \frac{\partial f}{\partial x^k} \right|_p = X_p f. \quad (8)$$

Podemos então trocar f por um campo vetorial suave $Y = \sum b^i \partial / \partial x^i$ e obtermos a *derivada direcional de Y na direção X_p*

$$D_{X_p} Y = \sum_{k=1}^n D_{X_p} b^i \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p. \quad (9)$$

Note que a derivada $D_{X_p} Y$ é um vetor tangente em p . Dessa forma, se X é um campo vetorial em \mathbb{R}^n podemos definir $D_X Y$ como o campo vetorial que, em p , vale $D_{X_p} Y$. Esse mapa é a *derivada direcional de Y na direção X* .

Agora vamos generalizar a derivada direcional em \mathbb{R}^n para uma variedade riemanniana qualquer. Uma *conexão afim* em M é um mapa

$$\begin{aligned} \nabla: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) &\rightarrow \mathfrak{X}(M) \\ (X, Y) &\mapsto \nabla_X Y \end{aligned}$$

que satisfaz as seguintes propriedades:

- se $C^\infty(M)$ é o conjunto dos mapas suaves $M \rightarrow \mathbb{R}$, então ∇ é $C^\infty(M)$ -linear na primeira coordenada;
- ∇ satisfaz a regra de Leibniz na segunda coordenada, isso é, se $f \in C^\infty(M)$, então

$$\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y, \quad (10)$$

onde Xf é o mapa suave dado por $(Xf)(p) = X_p f$.

Um campo vetorial *ao longo* de uma curva $c: I \rightarrow M$ é a associação V de um vetor $V(t) \in T_{c(t)}M$ para cada $t \in I$. Dizemos que V é *suave* se, para cada $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $(Vf)(t) = V(t)f$ é suave.

Se $c: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ é uma curva e V é um campo ao longo de c , temos

$$V(t) = \sum_{k=1}^n v^k(t) \left. \frac{\partial}{\partial x^k} \right|_{c(t)}, \quad (11)$$

portanto podemos definir a *derivada de V com respeito a t* como sendo o campo

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{dv^k}{dt} \frac{\partial}{\partial x^k}. \quad (12)$$

Essa derivada satisfaz algumas propriedades importantes:

- ela é linear com respeito a V , isso é, se $\lambda \in \mathbb{R}$ e U é outro campo ao longo de c , então

$$\frac{d(\lambda V + U)}{dt} = \lambda \frac{dV}{dt} + \frac{dU}{dt}; \quad (13)$$

- ela satisfaz a regra de Leibniz, isso é, se $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ (lembrando aqui que I é o domínio de c) é suave, então

$$\frac{d(fV)}{dt} = \frac{df}{dt}V + f\frac{dV}{dt}; \quad (14)$$

- ela é compatível com a derivada direcional em \mathbb{R}^n , isso é, se V se estende para um campo \tilde{V} em \mathbb{R}^n , então

$$\frac{dV}{dt} = D_{c'(t)}\tilde{V}. \quad (15)$$

Vamos agora generalizar o conceito da derivada de V para uma variedade M qualquer, utilizando de conexões afins. Se ∇ é uma conexão afim em M e $c: I \rightarrow \mathbb{R}$ é uma curva, então definimos uma *derivada covariante* como um operador D/dt que, para cada campo V ao longo de c associa um outro campo DV/dt ao longo de c . Pedimos que essa associação satisfaça as três propriedades que a derivada definida acima satisfaz:

- D/dt é linear, isso é, se V e U são campos ao longo de c e $\lambda \in \mathbb{R}$ então

$$\frac{D(\lambda V + U)}{dt} = \lambda \frac{DV}{dt} + \frac{DU}{dt}; \quad (16)$$

- D/dt satisfaz a regra de Leibniz, isso é, se $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ é suave, então

$$\frac{D(fV)}{dt} = \frac{df}{dt}V + f\frac{DV}{dt}; \quad (17)$$

- D/dt é compatível com a conexão afim, isso é: se \tilde{V} é um campo em M que estende V , então

$$\frac{DV}{dt} = \nabla_{c'(t)}V. \quad (18)$$

Definimos acima o que seria **uma** derivada covariante, mas acontece que, fixadas uma conexão e uma curva, sempre existe uma e apenas uma derivada covariante, portanto podemos falar **da** derivada covariante.

Se $c: I \rightarrow M$ é uma curva, então dizemos que c é uma *geodésica* se a derivada covariante DT/dt do seu campo velocidade $T(t) = c'(t)$ é nula. Note que a existência de uma conexão, e portanto de uma derivada covariante, não depende da existência de uma métrica riemanniana. Porém, caso a variedade M possua uma métrica, vamos sempre assumir que a conexão considerada é a única conexão riemanniana.

2.3 Modelos para a geometria hiperbólica

3 Redes neurais

4 Misturando tudo

Referências

- [1] Hugo Cattarucci Botós. «Geometrias Clássicas». 2020.
- [2] Loring W. Tu. *Differential Geometry: Connections, Curvature and Characteristic Classes*. Springer-Verlag New York Inc, 2017. ISBN: 978-3-319-55082-4.
- [3] Wei Peng e Tuomas Varanka e Abdelrahman Mostafa e Henglin Shi e Guoying Zhao. «Hyperbolic Deep Neural Networks: A Survey». Em: *JOURNAL OF LATEX CLASS FILES* 14.8 (2015).