

CRONOGRAMA PROTOCOLO IATF

Hernicol SRL — Alto Ubajay
Emitido: 17/09/2026

Rodeos incluidos

N°	Rodeo	Cabezas	Observación
1	Vacas 2° Servicio Hernicol	140	Esquema con PG adicional (ver cronograma)
2	Vacas Grales Hernicol	150	—
3	Vacas Capitalizadas	130	—
	Total	420	

Cronograma de actividades

Fecha	Horario	Día	Tarea	Dosis	Rodeo(s)
Miércoles 23/09	AM	Día 0	Colocación de dispositivo + Benzoato de estradiol + GnRH	Benzoato: 2 cc GnRH: 3 cc	Los 3 rodeos (420)
Miércoles 30/09	PM	Día 7	Prostaglandina	PG: 2 cc	Rodeo 1 — 2° Servicio (140)
Jueves 01/10	AM	Día 8	Retiro de dispositivo + Prostaglandina + Cipionato de estradiol + Novormon (eCG) + Pintado (marcación para detección de celo)	PG: 2 cc Cipionato: 1,5 cc Novormon: 2,5 cc	Los 3 rodeos (420)
Sábado 03/10	AM	Día 10	Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) + GnRH a vacas sin repintar (sin respuesta a celo)	GnRH: 3 cc (solo sin respuesta)	Los 3 rodeos (420)

Notas

- El Rodeo 1 (Vacas 2° Servicio Hernicol) recibe una dosis de Prostaglandina el 30/09 PM, un día antes que los Rodeos 2 y 3, además de la Prostaglandina del 01/10 AM.
- El pintado (marcación) del 01/10 AM se realiza para facilitar la detección de celo hasta el momento de la IATF.
- El 03/10, la GnRH (3 cc) se aplica únicamente a las vacas que no borraron la pintura, es decir, sin respuesta a celo.
- Confirmar disponibilidad de dosis de semen, insumos y personal para cada jornada con la anticipación necesaria.

Referencia de productos

Producto	Dosis	Función
Dispositivo	1 unidad	Dispositivo intravaginal con progesterona
Benzoato de estradiol	2 cc	Aplicado al inicio del protocolo (Día 0)
GnRH	3 cc	Aplicado en Día 0, y en la IATF solo a vacas sin respuesta a celo
Prostaglandina (PG)	2 cc	Inductor de la luteólisis
Cipionato de estradiol	1,5 cc	Inductor de la ovulación, aplicado al retiro del dispositivo
Novormon (eCG)	2,5 cc	Estimulación de la actividad folicular, aplicado al retiro del dispositivo