## PLATAFORMA LEONARDO - DISCIPLINA DE ÉTICA EM PESQUISA - PPGCIMH - FEFF/UFAM

Carimbo de data/hora: 2025-09-29 21:08:19.952000

Nome do Pesquisador: Candido Barbosa da Silva Neto

A pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? Maiores informações ver Resolução 466, Resolução 510: Sim

Instituição Proponente: PPGCiMH - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia

Este é um estudo internacional?: Não

Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq) (Selecione até três):: Grande Área 4. Ciências da Saúde

Propósito Principal do Estudo (OMS):: Saúde Coletiva / Saúde Pública

**Título Público da Pesquisa:**: A população alvo desta pesquisa será composta por idosos ribeirinhos residentes no Município de Nhamundá-AM.

Título Principal da Pesquisa:: Trata-se de um estudo de caráter transversal.

Será o pesquisador principal?: Sim

**Desenho:** Estudo observacional, transversal, de base populacional e analítico, voltado para avaliar a prevalência da dor lombar crônica e sua associação com a funcionalidade e propósito de vida em idosos ribeirinhos de Nhamundá-AM.

Financiamento:: Financiamento Próprio

Palavras-Chave 1: Dor crônica

Palavras-Chave 2: Funcionalidade

Palavras-Chave 3: idoso

Resumo: A dor lombar crônica (DLC) representa uma das principais causas de incapacidade em idosos, sendo ainda mais preocupante em populações ribeirinhas da Amazônia, devido às condições de vulnerabilidade socioeconômica e ao difícil acesso a serviços de saúde. Este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência da DLC e seus impactos sobre a funcionalidade e o propósito de vida em idosos residentes no município de Nhamundá-AM. Trata-se de um estudo observacional, transversal e de base populacional, com amostra calculada a partir da população idosa local. Serão coletados dados sociodemográficos, intensidade da dor, desempenho funcional e propósito de vida, por meio de instrumentos validados, incluindo o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), o algômetro, a Escala de Faces, o Short Physical Performance Battery (SPPB) e a Escala de Propósito de Vida. A análise estatística será realizada com o software SPSS, contemplando estatística descritiva e inferencial. Espera-se que os resultados revelem a magnitude da DLC na população estudada e sua associação com limitações funcionais e redução do propósito de vida, fornecendo subsídios para políticas públicas e estratégias de intervenção em saúde direcionadas a idosos ribeirinhos da região amazônica.

**Introdução:** A dor lombar crônica (DLC) é uma condição recorrente em diversas faixas etárias. Em idosos, seu impacto é especialmente relevante, sendo uma das principais causas de incapacidade em adultos com mais de 60 anos, sobretudo, os povos vulneráveis e de pouco acesso à saúde, como os ribeirinhos (Wong, et. al., 2022). As populações ribeirinhas, assim denominadas, porque são uma mistura de diversos grupos sociais que vivem às margens de rios e lagos da Amazônia brasileira. Em 2010, eles

representavam 20,1% da população total no estado do Amazonas. O isolamento geográfico e a precariedade econômica dessa população dificultam o acesso a diversos serviços públicos de saúde básica, o que restringe o diagnóstico e tratamento de diversas doenças, incluindo as dores na região lombar (GAMA et al., 2018; GUIMARÃES et al., 2020). Uma revisão sistemática realizada em 2019 aponta alta prevalência de DLC em idosos na população mundial, variando entre 21,7% e 75% nesse nicho populacional. (De SOUZA, et. al., 2019). Um estudo voltado para a região do Baixo Amazonas, realizado no município de Parintins-AM, identificou, a partir do questionário nórdico de dor, que 80% dos entrevistados apresentavam dor lombar crônica. Sendo assim, a DLC em idosos ribeirinhos pode estar associada a diversos fatores, como a dificuldade em ofertas dos servicos de saúde, atividades físicas de grande impacto, pouca adesão ao tratamento conservador e a realização de tratamentos alternativos com plantas medicinais (Moraes, et. al., 2014). Há uma associação moderada a forte entre a DLC e o déficit funcional em adultos mais velhos. Os idosos apresentam sintomas dolorosos, além de déficits funcionais específicos, sendo os mais presentes a dificuldade de ficar em pé no mesmo lugar por cerca de 15 minutos, caminhar 800 metros, alcançar ou estender os braços acima do nível dos ombros, entrar e sair do carro e empurrar ou puxar um objeto grande. Os dados mostram que essas alterações funcionais podem gerar alterações no propósito de vida desses idosos (EDMOND, S. L.; FELSON, D. T, 2003). O propósito de vida é de suma importância, pois ele está relacionado a um direcionamento de vida e de objetivos tangíveis, seja em curto, médio e longo prazo, uma visão mais otimista da vida, associada à percepção de crescimento pessoal, felicidade, satisfação, autoestima, motivação para viver e para realizar atividades cotidianas. Todos esses fatores estão correlacionados aos sintomas dos portadores de lombalgia crônica, visto que são associados a percepção de ansiedade e depressão. Os idosos apresentam medo à exposição ao movimento ou inadaptações emocionais, que geram quadros dolorosos mais severos e incapacidades funcionais (Ribeiro, et.al., 2018). Diante do exposto, faz-se necessária uma investigação mais consistente e direcionada para determinar o que a presença da DLC pode gerar na funcionalidade e propósito de vida da população idosa ribeirinha da cidade de Nhamundá-AM.

**Hipótese:** A presença de dor lombar crônica em idosos ribeirinhos está associada a maior comprometimento funcional e menor percepção de propósito de vida.

**Objetivo Primário:** Avaliar a prevalência da dor lombar crônica e sua associação com a funcionalidade e o propósito de vida em idosos ribeirinhos do município de Nhamundá-AM.

**Objetivo Secundário:** 1. Avaliar a prevalência da dor lombar crônica em idosos ribeirinhos do município de Nhamundá-AM; 2. Mensurar os níveis de dor nessa população; 3. Avaliar a capacidade funcional nessa população; 4. Avaliar a presença de propósito de vida;

Metodologia Proposta: Fundamentação Metodológica Delineamento Trata-se de um estudo de caráter transversal. Amostra A população alvo desta pesquisa será composta por idosos ribeirinhos residentes no Município de Nhamundá-AM. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de idosos na região de Nhamundá-AM era de 1.941 habitantes em 2022, o que corresponde a 9,63% da população geral. Esta proporção reflete o aumento demográfico da população com mais de 60 anos nessa região, quando comparado aos anos anteriores, seguindo assim a tendência mundial de envelhecimento populacional (IBGE, 2010; IBGE, 2022). A partir desse número, será feito o cálculo amostral pelo software Epi Info (versão 7.0), o nível de confiança será de 95% e o erro amostral de 5%. Instrumentação • Variáveis sociodemográficas: Será utilizado um questionário para avaliar informações sociodemográficas, o qual é construído com os dados referentes à idade, sexo, profissão, raça, estado civil, filhos, tempo de residência, se reside sozinho ou com familiares, tipo de moradia, renda, se utiliza serviço de saúde, hábitos como tabagismo, etilismo, audição, visão e uso de medicamentos, com o intuito de caracterizar o perfil dos idosos rurais da região de Nhamundá-AM. • Questionário sobre déficit cognitivo: Miniexame do Estado Mental (MEEM). • Intensidade de dor: Serão utilizados dois tipos de instrumentos para avaliação de dor: Escala de face em adultos (avaliação subjetiva); algômetro (avaliação objetiva). • Avaliação da funcionalidade: Será utilizado o Teste Short Physical Performance Battery (SPPB) para uma avaliação mais detalhada e concisa dos impactos funcionais em idosos. • Avaliação do propósito de vida: Será utilizada a escala de propósito de vida para avaliação desses pacientes. 2.6 Procedimento de análise de dados Os dados serão analisados no programa estatístico SPSS versão 29.0.2.0. A análise descritiva será realizada por meio de valores absolutos e relativos para as variáveis categóricas e cálculo de médias e desvios-padrão para variáveis quantitativas. A apresentação dos resultados será em gráficos e tabelas descritivas.

Critérios de Inclusão (Amostra): Critérios de inclusão • Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; • Residência fixa na zona rural há pelo menos 03 anos nos municípios de Nhamundá-AM; • Relatos de dores na região lombar por mais de 12 semanas; • Ter capacidade cognitiva para responder às indagações ou ser assistido por alguém que possa ajudá-lo durante a realização do estudo;

Critérios de Exclusão (Amostra): Critérios de exclusão • Idosos com grave comprometimento cognitivo; • Déficits funcionais graves que incapacitem a realização dos testes funcionais; • Incapacidade de compreensão para responder à escala de propósito de vida; • Idosos que se recusarem a participar do estudo

**Riscos:** A pesquisa apresenta riscos mínimos, relacionados principalmente ao desconforto durante a aplicação dos questionários e testes funcionais. A utilização do algômetro pode causar leve dor momentânea, porém dentro de limites seguros. Existe ainda a possibilidade de cansaço físico ao realizar o Short Physical Performance Battery (SPPB). Todos os procedimentos serão conduzidos por profissionais capacitados, com possibilidade de interrupção imediata caso o participante manifeste desconforto ou não deseje continuar.

Benefícios: Diretos: os participantes terão uma avaliação detalhada de sua condição de dor lombar, funcionalidade e percepção de propósito de vida, podendo receber orientações iniciais sobre cuidados em saúde e encaminhamentos quando necessário. Indiretos: o estudo contribuirá para ampliar o conhecimento científico sobre a dor lombar crônica em idosos ribeirinhos, possibilitando a elaboração de políticas públicas e estratégias de intervenção direcionadas a essa população. Além disso, os resultados poderão subsidiar ações de promoção de saúde, prevenção de incapacidades e valorização do envelhecimento saudável em comunidades amazônicas.

**Metodologia de Análise dos Dados:** A população alvo desta pesquisa será composta por idosos ribeirinhos residentes no Município de Nhamundá-AM. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de idosos na região de Nhamundá-AM era de 1.941 habitantes em 2022, o que corresponde a 9,63% da população geral. Esta proporção reflete o aumento demográfico da população com mais de 60 anos nessa região, quando comparado aos anos anteriores, seguindo assim a tendência mundial de envelhecimento populacional (IBGE, 2010; IBGE, 2022). A partir desse número, será feito o cálculo amostral pelo software Epi Info (versão 7.0), o nível de confiança será de 95% e o erro amostral de 5%.

**Desfecho Primário:** Prevalência de dor lombar crônica em idosos ribeirinhos do município de Nhamundá-AM e sua associação com funcionalidade (avaliada pelo SPPB) e propósito de vida (avaliado pela Escala de Propósito de Vida).

Tamanho da Amostra: Aproximadamente 320 idosos.

Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)?: Sim

Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa. Descreva por tipo de participante, ex.: Escolares (10); Professores (15); Direção (5): 320 idosos.

O estudo é multicêntrico: Não

Propõe Dispensa de TCLE?: Não

Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?: Sim

Cronograma (PDF): [clique aqui para acessar]

Orçamento Financeiro (Listar Item e valor, ao final, apresentar valor total): Orçamento Financeiro Estimado Impressão de questionários e TCLE 400 un: 200,00 Materiais de escritório (pranchetas, canetas, pastas) 1 kit :150,00 Algômetro (1 unidade): 800,00 Transporte fluvial para visitas às comunidades 5 viagens: 2.500,00 Alimentação da equipe em campo 20 dias: 1.000,00 EPIs (máscaras, luvas, álcool em gel) 1 kit: 200,00 Total estimado: R\$ 4.850,00

## Bibliografia (ABNT):

## Referências

DE SOUZA, I. M. B. et al. Prevalência de dor lombar na população idosa: uma revisão sistemática. Clínicas, São Paulo, v. 74, e789, 2019.

EDMOND, S. L.; FELSON, D. T. Function and back symptoms in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, Hoboken, v. 51, n. 12, p. 1702–1709, 2003.

GAMA, A. S. M. et al. Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 2, 2018.

GUIMARÃES, A. F. et al. Acesso a serviços de saúde por ribeirinhos de um município no interior do estado do Amazonas, Brasil. Revista Pan-Amazônica de Saúde, Belém, v. 11, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios: Resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: Resultados preliminares. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

MORAES, D. et al. Análise dos sintomas osteomusculares utilizando o questionário nórdico em trabalhadores ribeirinhos do município de Parintins-AM, Brasil. Anápolis: Centro Universitário de Anápolis - UNIEVANGÉLICA, 2014.

RIBEIRO, C. C.; NERI, A. L.; YASSUDA, M. S. Semantic-cultural validation and internal consistency analysis of the Purpose in Life Scale for Brazilian older adults. Dementia & Neuropsychologia, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 244–249, 2018.

WONG, C. K. W. et al. Prevalence, incidence, and factors associated with non-specific chronic low back pain in community-dwelling older adults aged 60 years and older: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Pain, Amsterdam, v. 23, n. 4, p. 509–534, 2022.

ProjetoDetalhado / Brochura do Investigador: [clique aqui para acessar]

TCLE (Amostra) / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência: [clique aqui para acessar]