

# Finanças Quantitativas: Lista 4

Lucas Moschen

08 de maio de 2020

## Problema 3.17

1. Sejam  $Z \sim N(0, 1)$ ,  $\sigma > 0$  e  $f$  uma função. Então:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(Z)e^{\sigma Z}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{\sigma z}e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{-\frac{z^2}{2} + \sigma z} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{-\frac{1}{2}(z^2 - 2\sigma z + \sigma^2)} e^{\frac{1}{2}\sigma^2} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{-\frac{1}{2}(z-\sigma)^2} dz, \quad x = z - \sigma, dx = dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x + \sigma)e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\ &= e^{\frac{1}{2}\sigma^2} \mathbb{E}[f(Z + \sigma)]\end{aligned}$$

Se  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , temos que  $X = \mu + \sigma Z$ , onde  $Z \sim N(0, 1)$ . Se tomarmos  $f(Z) = e^\mu$  e  $\sigma > 0$  o desvio padrão de  $X$ . Assim:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^X] &= \mathbb{E}[e^{\mu + \sigma Z}] \\ &= \mathbb{E}[e^\mu e^{\sigma Z}], \text{ pelo demonstrado} \\ &= e^{\frac{1}{2}\sigma^2} \mathbb{E}[f(Z + \sigma)] \\ &= e^{\frac{1}{2}\sigma^2} \mathbb{E}[e^\mu] = e^{\mu + \sigma^2/2}\end{aligned}$$

2. Assuma que  $X$  e  $Y$  são v.a. juntamente Gaussianas com média 0 e  $h$  uma função qualquer.

Temos que  $f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{x^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{xy}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y^2}{\sigma_Y^2}]\}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^X h(Y)] &= \int_{\mathbb{R}^2} e^x h(y) f_{XY}(x, y) dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\{-\frac{x^2}{2\sigma_X^2}\} \int_{\mathbb{R}} h(y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\{\frac{x^2}{2\sigma_X^2}\} \exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{x^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{xy}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y^2}{\sigma_Y^2}]\} dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\{-\frac{x^2}{2\sigma_X^2}\} \int_{\mathbb{R}} h(y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{x^2\rho^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{xy}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{y^2}{\sigma_Y^2}]\} dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\{-\frac{x^2}{2\sigma_X^2}\} \int_{\mathbb{R}} h(y) \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y - \frac{x\rho\sigma_Y}{\sigma_X}}{\sigma_Y}\right)^2\} dy dx \\ &= \mathbb{E}[e^X] \mathbb{E}[h(Y + cov(X, Y))]\end{aligned}$$

### Problema 3.18

1.  $\log X \sim N(0, 1)$  e  $\log X \sim N(0, \sigma^2)$ . Além,  $(\log X, \log Y)$  são juntamente Gaussianas. Compute a densidade de  $X$  quando  $\log X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Seja  $Y = \log X$ . Considere  $g(y) = e^y$ , então  $g$  transforma a variável  $Y$  na variável  $X$ . Desta forma, consigo calcular a densidade de  $X$ :

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{f_Y(y)}{g'(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{\sigma^2}} \frac{1}{e^y} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(\log x - \mu)^2}{\sigma^2} - \log x\right\} \end{aligned}$$

Temos, então, a densidade de  $X$ .

$$2. \rho_{\min} = (e^{-\sigma} - 1)/\sqrt{(e - 1)(e^{\sigma^2} - 1)}$$

Pelo descrito no exercício anterior, sabemos que:

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^{\log X}] = e^{\mu + \sigma^2/2} = e^{1/2} \\ E[Y] &= e^{\sigma^2/2} \\ E[X^2] &= E[e^{2\log X}] = e^{2\mu + 2\sigma^2} = e^2 \\ E[Y^2] &= e^{2\sigma^2} \\ \text{Var}[X] &= E[X^2] - E[X]^2 = e^2 - e \\ \text{Var}[Y] &= E[Y^2] - E[Y]^2 = e^{\sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1) \end{aligned}$$

Podemos dizer que  $X$  e  $Y$  são contramonotônicas, pois  $(X, Y) = (e^{\log X}, e^{-\log Y}) = (e^{\log X}, e^{-\sigma \log X})$ , isto é, existe uma variável aleatória e duas funções, uma crescente e uma decrescente, onde vale essa igualdade em distribuição. Logo, elas admitem o limite inferior Fréchet-Hoeffding na cópula, que no caso é de uma Gaussiana. Assim, o valor mínimo da correlação é atingido quando a cópula é mínima, que ocorre quando as variáveis são contramonotônicas.

Agora, podemos calcular os valores desejados:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= \min \frac{\text{Cor}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\text{Cov}(e^{\log X}, e^{-\sigma \log X})}{\sigma_X \sigma_Y} \\ &= \frac{E[e^{\log X - \sigma \log X}] - e^{1/2 + \sigma^2/2}}{\sqrt{e(e-1)}\sqrt{e^{\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)}} = \frac{e^{(-\sigma+1)^2/2} - e^{(\sigma^2+1)/2}}{e^{1/2 + \sigma^2/2} \sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}} \\ &= \frac{e^{(-\sigma+1)^2/2 - (\sigma^2+1)/2} - 1}{\sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}} = \frac{e^{-\sigma} - 1}{\sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}} \end{aligned}$$

Como queríamos mostrar.

$$3. \rho_{\max} = (e^{\sigma} - 1)/\sqrt{(e - 1)(e^{\sigma^2} - 1)}$$

De forma equivalente, podemos dizer que  $X$  e  $Y$  são comonotônicas, porque  $(X, Y) = (e^{\log X}, e^{\sigma \log X})$  e temos duas funções crescentes com uma variável em comum. Desta forma, elas admitem o limite superior de Fréchet-Hoeffding. Desta forma, maximizamos a covariância no valor máximo que a cópula assume. Utilizamos as contas do exercício anterior (3.17) e, da mesma forma que fizemos em 2. dessa exercício, a

correlação máxima acontece quando as variáveis são comonotônicas. Logo:

$$\begin{aligned}\rho_{\max} &= \max \frac{Cor(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{Cov(e^{\log X}, e^{\sigma \log X})}{\sigma_X \sigma_Y} \\ &= \frac{E[e^{\log X + \sigma \log X}] - e^{1/2 + \sigma^2/2}}{\sqrt{e(e-1)}\sqrt{e^{\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)}} = \frac{e^{(\sigma+1)^2/2} - e^{(\sigma^2+1)/2}}{e^{1/2 + \sigma^2/2}\sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}} \\ &= \frac{e^{(\sigma+1)^2/2 - (\sigma^2+1)/2} - 1}{\sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}} = \frac{e^{\sigma} - 1}{\sqrt{(e-1)(e^{\sigma^2} - 1)}}\end{aligned}$$

Como queríamos mostrar.

$$4. \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\min} = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\max} = 0$$

Como  $\sigma > 0$ , vemos que  $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} e^{-\sigma} = 0$ , e que  $e^{\sigma^2} \rightarrow \infty$ . Dessa maneira, pelo denominador ser ilimitado e o numerador limitado, temos que, de fato,  $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\min} = 0$ .

Para conferir que  $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\max} = 0$ , vemos que:

$$\begin{aligned}0 &\leq \frac{e^{\sigma} - 1}{((e-1)(e^{\sigma^2} - 1))^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{e^{\sigma}}{(e^{\sigma^2} - 1)^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{(e^{\sigma^2} - 1)^{\frac{1}{2}} / (e^{2\sigma})^{\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{(e^{\sigma^2 - 2\sigma} - e^{-2\sigma})^{\frac{1}{2}}} \\ &\rightarrow 0\end{aligned}$$

Isso ocorre porque  $e^{\sigma^2 - 2\sigma} \rightarrow \infty$ , logo o denominador é ilimitado e o numerador limitado.

Concluo que  $\lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\min} = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \rho_{\max} = 0$ .

## Problema 3.24

```
library(copula)      #carregando a copula
rho <- seq(from = 0, to = 1, by = 0.05)

for (param in rho){
  ncopula <- normalCopula(param = param)
  SD <- rCopula(ncopula, n = 2000)
}
```

## Análise da ETTJ Brasileira

Primeiro farei o import dos dados:

```
dir <- "/home/lucamoschen/Documents/GitHub/Quantitative_Finance/data/"
file <- "prices_Swap_PRE_DI.RData"
load(file = paste(dir, file, sep = ""))
```