

Finanças Quantitativas

Lista de exercícios 1

Lucas Emanuel Resck Domingues

Março de 2020

Referência: Carmona, René. Statistical analysis of financial data in R, 2014.

Problema 1.1

Ambas F_1 e F_2 são monótonas crescentes e $\forall x \ F_1(x) \leq F_2(x)$. Sejam X e Y o conjunto de $x, y \in \mathbb{R}$, respectivamente, que satisfazem $p = F_1(x) = F_2(y)$, para algum p entre 0 e 1. Justamente pela definição de quantil, buscamos $\pi_p^{(1)} = \inf\{x \in X\}$ e $\pi_p^{(2)} = \inf\{y \in Y\}$. Ora, podemos dizer que $\pi_p^{(1)} \geq \pi_p^{(2)}$ (a demonstração prova-se por absurdo: assume-se que exista algum p que não satisfaz a inequação, e mostra-se que $F_1(x) \leq F_2(x)$ não é satisfeito).

Feito isso, podemos concluir que:


1. Em um Q-Q plot, com $\pi_p^{(1)}$ na abscissa e $\pi_p^{(2)}$ na ordenada, no lado esquerdo do gráfico teremos pontos abaixo de $y = x$. Ou seja, para uma mesma área, F_2 "leva em quantis maiores (em valor absoluto)", portanto possui cauda esquerda mais pesada.
2. No lado direito do gráfico teremos pontos abaixo de $y = x$. Portanto, F_1 possui cauda direita mais pesada.

Seguimos com:

3. Como $-VaR$ é um quantil da distribuição do retorno, F_1 tem maior $-VaR$ e menor $+VaR$. Ou seja, F_2 entrega maior *Value at Risk*.

Para se guiar, observe um exemplo de F_1 e F_2 no gráfico abaixo.

```
x = seq(-5, 5, 0.01)
plot(x, pnorm(x, 1), type="l", main="Exemplo de cdfs", col=1)
lines(x, pnorm(x), col=2)
legend("topleft", c("F1", "F2"), fill=c(1, 2))
```




Problema 1.2

1.


```
X = rexp(1024, 0.2)
X[1:5]

## [1] 0.6366369 3.1721330 5.1406499 3.5945315 7.9269075
```
2.

```
x = seq(0, 40, 0.1)
plot(x, dexp(x, 0.2), type="l", col=1,
     main='Exponencial vs. histograma')
hist(X, add=T, freq=F, border=2, breaks=15)
legend("topright", c("Exponencial", "Histograma"),
     fill=c(1, 2))
```



```
3. x = seq(0, 40, 0.1)
   plot(x, dexp(x, 0.2), type="l", col=1,
        main='Exponencial vs. kernel density estimate')
   lines(density(X, 1), col=2)
   legend("topright",
        c("Exponencial", "Kernel density estimate"),
        fill=c(1, 2))
```



4.
 - No plot com o histograma, podemos ver que a função que gera a curva não é suave, diferentemente do plot com o *kernel density estimate* (utilizando um kernel gaussiano).
 - Como não há amostras com valor menor do que zero e a função kernel do *kde* é uma gaussiana, sua curva acaba por subir de valores próximos ao zero, enquanto a curva original já se inicia em 0,20. Ou seja, para valores de x muito próximos de zero, temos estimativas muito ruins para o *kde*.
 - O histograma, diferentemente do *kde*, não se centra na amostra, podendo não aproximar muito bem a distribuição teórica.

Me parece mais razoável a utilização do *kde*.

Problema 1.3

1. **Quantiles of Standard Normal x YY:** Os pontos, à direita no gráfico, estão acima de $y = x$; à esquerda, estão abaixo. Concluimos que YY tem caudas direita e esquerda mais pesadas que a normal padrão.


2. **Quantiles of Standard Normal x ZZ:** Os pontos, à direita no gráfico, estão próximos de $y = x$; à esquerda, estão abaixo. Não pode-se dizer muito sobre a cauda direita de ZZ, mas sabemos que sua cauda esquerda é mais pesada que a da normal padrão.
3. **XX x TT:** Pelo mesmo raciocínio, TT tem cauda direita mais pesada, porém XX tem cauda esquerda mais pesada.
4. **TT x EE:** Não se pode dizer muito sobre as caudas esquerdas, mas TT tem cauda direita mais pesada.

Problema 1.4


1.
 - **XX:** XX tem cauda direita mais pesada, em comparação à normal, pois os pontos no lado direito do gráfico estão acima da reta $y = x$. XX tem cauda esquerda mais leve, pois os pontos no lado direito estão acima da reta.
 - **YY:** YY tem caudas direita e esquerda mais pesadas do que a normal, pelo mesmo raciocínio.

2. 1.

```
X = rlnorm(10000)
Y = rcauchy(10000)
qqplot(X, Y, xlim=c(0, 24), ylim=c(-500, 600),
       main="Log-normal e Cauchy Q-Q Plot")
lines(seq(0, 30), seq(0, 30))
```



```
2. X = rlnorm(10000)
   Y = rnorm(10000)
   qqplot(X, Y, main="Log-normal e Gaussian Q-Q Plot")
   lines(seq(-10, 50), seq(-10, 50))
```




Problema 1.9


1.

```
myrexp = function(N, LAMBDA) {  
  Y = runif(N)  
  X = - 1/LAMBDA * log(1 - Y)  
  return(X)  
}
```
2.

```
N = 1024  
qqplot(myrexp(N, 1/1.5), rexp(2*N, 1/1.5),  
       main="myrexp e rexp Q-Q plot")  
lines(seq(-1, 15), seq(-1, 15))
```



```
plot(density(myrexp(2*N, 1/1.5)), col=1,
      main="myrexp e rexp")
lines(density(rexp(2*N, 1/1.5)), col=2) #, add=T)
legend("topright", c("myrexp", "rexp"), fill=c(1, 2))
```

A função de simulação se saiu muito bem, principalmente próximo à moda da distribuição (onde possui muitas amostras), pois os quantis têm valores muito próximos.