Chapitre X Recherche d'un boson de Higgs de haute masse

Sommaire

1	Introduction				
2	Sélection d'événements et catégorisation				
	2.1 Données				
	2.2 Simulation				
	2.3 Catégorisation				
3	Chaîne d'analyse				
4	Estimation du bruit de fond				
	4.1 Estimations de bruits de fond à partir de simulations				
	4.2 Estimations de bruits de fond à partir de données				
5	Incertitudes systématiques				
	5.1 Incertitudes de normalisation				
	5.2 Incertitudes de forme				
6	Résultats et interprétations				
7	Conclusion				

Citer The CMS Collaboration. « Search for additional neutral MSSM Higgs bosons in the di-tau final state in pp collisions at $\sqrt{s}=13\,\text{TeV}$ ». Journal of High Energy Physics **09**.007 (sept. 2018). DOI: 10.1007/JHEP09 (2018) 007

et aussi nouvelle version full runII si possible

Citer la thèse de Gaël:

G. TOUQUET. « Search for an additional neutral MSSM Higgs boson decaying to tau leptons with the CMS experiment ». Thèse de doct. Université Claude Bernard Lyon 1, oct. 2019. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02526393

Citer également la thèse d'Artur?

A. GOTTMANN. « Global Interpretation of $\tau\tau$ Events in the Context of the Standard Model and Beyond ». Thèse de doct. Fakultät für Physik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), juin 2020

Études déjà menées au LEP [4] et au Tevatron [5, 6] LHC : ATLAS et CMS cherchent aussi avec $b\bar{b}$ [7, 8] ATLAS $\mu\mu$ et $\tau\tau$ [9] CMS $\tau\tau$ [1, 10] reconstruction τ_h [11]

- 1 Introduction
- 2 Sélection d'événements et catégorisation
- 2.1 Données

gen_match	Type de particule	Propriétés de l'objet au niveau générateur		
1	électron natif	$ pdgID = 11, p_T > 8 \text{ GeV}, \text{ IsPrompt} == \text{True}$		
2	muon natif	$ pdgID = 13, p_T > 8 \text{GeV}, \text{IsPrompt} == \text{True}$		
3	au ightarrow e	$ pdgID = 11$, $p_T > 8 \text{ GeV}$,		
		<pre>IsDirectPromptTauDecayProduct == True</pre>		
4	$ au ightarrow \mu$	$ pdgID = 13$, $p_T > 8$ GeV,		
		<pre>IsDirectPromptTauDecayProduct == True</pre>		
5	$ au ightarrow au_{ m h}$	Tau hadronique généré		
6	Faux τ_h , τ_h de l'empilement	Tout objet ne rentrant pas dans les catégories 1 à 5		

Tableau X.1. Valeurs prises par gen_match, variable de correspondance des taus hadroniques à l'objet généré dans les événements simulés.

2.2 Simulation

2.3 Catégorisation

3 Chaîne d'analyse

 τ_h ID and reco?

4 Estimation du bruit de fond

- 4.1 Estimations de bruits de fond à partir de simulations
- 4.2 Estimations de bruits de fond à partir de données
- 4.2.1 Méthode de l'encapsulement ou embedding
- 4.2.2 Méthode du facteur de faux ou fake factor

5 Incertitudes systématiques

- 5.1 Incertitudes de normalisation
- 5.2 Incertitudes de forme

6 Résultats et interprétations

7 Conclusion

Références

- [1] The CMS Collaboration. « Search for additional neutral MSSM Higgs bosons in the di-tau final state in pp collisions at $\sqrt{s} = 13 \,\text{TeV}$ ». *Journal of High Energy Physics* **09**.007 (sept. 2018). DOI: 10.1007/JHEP09(2018)007.
- [2] G. TOUQUET. « Search for an additional neutral MSSM Higgs boson decaying to tau leptons with the CMS experiment ». Thèse de doct. Université Claude Bernard Lyon 1, oct. 2019. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02526393.
- [3] A. GOTTMANN. « Global Interpretation of $\tau\tau$ Events in the Context of the Standard Model and Beyond ». Thèse de doct. Fakultät für Physik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), juin 2020.

- [4] DELPHI, OPAL, ALEPH, LEP Working Group for Higgs Boson Searches, L3. « Search for neutral MSSM Higgs bosons at LEP ». European Physical Journal C47 (2006), p. 547-587. DOI: 10.1140/epjc/s2006-02569-7. arXiv: hep-ex/0602042 [hep-ex].
- The CDF Collaboration. « Search for Higgs bosons predicted in two-Higgs-doublet models via decays to tau lepton pairs in 1,96 TeV $p\bar{p}$ collisions ». Physical Review Letters 103 (2009). DoI: 10.1103/PhysRevLett.103.201801. arXiv: 0906.1014 [hep-ex].
- The DØ Collaboration. « Search for Higgs bosons decaying to $\tau\tau$ pairs in $p\bar{p}$ collisions at $\sqrt{s} = 1,96 \, \text{TeV}$ ». Physics Letters **B707** (2012), p. 323-329. DOI: 10.1016/j.physletb.2011.12. 050. arXiv: 1106.4555 [hep-ex].
- [7] The CMS Collaboration. « Search for a Higgs boson decaying into a *b*-quark pair and produced in association with b quarks in proton-proton collisions at 7 TeV ». Physics Letters **B722** (2013), p. 207-232. DOI: 10.1016/j.physletb.2013.04.017. arXiv: 1302.2892 [hep-ex].
- The CMS Collaboration. « Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying into a pair of bottom quarks ». Journal of High Energy Physics 11 (2015). DOI: 10.1007/JHEP11(2015)071. arXiv: 1506.08329 [hep-ex].
- The ATLAS Collaboration. « Search for the neutral Higgs bosons of the Minimal Supersymmetric Standard Model in pp collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV with the ATLAS detector ». Journal of High Energy Physics 02 (2013). DOI: 10.1007/JHEP02(2013)095. arXiv: 1211.6956 [hep-ex].
- [10] The CMS Collaboration. « Search for neutral Higgs bosons decaying to tau pairs in *pp* collisions at $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$ ». Physics Letters **B713** (2012), p. 68-90. DOI: 10.1016/j.physletb.2012.05.028. arXiv: 1202.4083 [hep-ex].
- [11] The CMS Collaboration. « Reconstruction and identification of tau lepton decays to hadrons and tau neutrino at CMS ». Journal of Instrumentation 11.1 (2016). DOI: 10.1088/1748-0221/ 11/01/P01019. arXiv: 1510.07488 [physics.ins-det].