C.Física Moderna: Taller 9

Longitud de onda de De-Broglie, experimento de Davisson-Germer y principio de incertidumbre

1 Electrón libre

Un electrón tiene velocidad v_0 NO relativista. Muestre que la velocidad de grupo del electrón es $v_g = v_0$.

2 Electrón libre relativista

La relación de dispersión para un electrón libre relativista está dada por:

$$\omega(k) = \sqrt{c^2 k^2 + (m_e c^2/\hbar)^2} \tag{1}$$

Obtenga una expresión para la velocidad de grupo v_g y de fase v_p . Muestre que el producto de dichas cantidades es constante. Del resultado comente que le pasa a v_g si $v_p > c$.

3 Humano Extra-dimensional

Nicolas Jaar es un humano que vive en un universo donde $h = 2\pi J \cdot s$. Él tiene una masa de 2.0 kg y inicialmente se sabe que se encuentra en una región de 1.0 m de largo.

- 1. ¿Cuál es la mínima incertidumbre de su velocidad?
- 2. Asumiendo que la incertidumbre de su velocidad va a durar 5.0 s, determine la incertidumbre de su posición luego de ese tiempo.

4 Detectores gamma

Un núcleo excitado con una vida media de 0.1 ns emite un rayo γ con energía de 2.00 MeV. Si los mejores detectores gamma pueden medir energías de \pm 5 eV, ¿pueden estos detectores medir el ancho de energía (ΔE) para dicha emisión?

5 Grosor natural de las lineas espectrales

Las lineas de un espectro tienen un grosor. Este grosor en varios casos es causado por el efecto doppler. Sin embargo existe también un grosor asociado a que las transiciones ocurren en un tiempo finito, lo cual da una incertidumbre intrínseca. Para transiciones atómicas la vida media para que ocurra una transición es $\tau = 10^{-8}s$.

- 1. Calcule la incertidumbre de energía para una transición.
- 2. La incertidumbre de la longitud de onda $\Delta\lambda$ de una transición de un estado excitado E al fundamental E_1 es:

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} \approx \frac{\Delta E}{E - E_1}$$

Calculela para la transición $2\rightarrow 1$ del átomo de hidrógeno.