

Álgebra Linear

Monitoria de 18 de agosto 13h

PAD: Lucas

August 17, 2021

3.2

$$\lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 3.2 Mostre que o conjunto de todas as matrizes reais de ordem n , que denotamos por $M_n(\mathbb{R})$, com a operação de adição de elementos, $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$, definida por: $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ e a operação de multiplicação por escalar definida por: $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$, é um espaço vetorial real.

Resolução

$(V, +, \cdot)$ Ser espaço vetorial sobre \mathbb{F} significa:

- Assoc. na soma

$$(v + w) + x = v + (w + x)$$

- Elemento inverso soma:

$$\forall v \in V, \exists \bar{v} \text{ tal que } v + \bar{v} = \bar{v} + v = \theta_v$$

- Existe $\theta_v \in V$

$$\theta_v + v = v + \theta_v = v$$

- Soma comutativa
 $a + b = b + a$

} Soma

Produto por escalar em $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \dots\}$

$\cdot : \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ precisa cumprir:

$$\sim \lambda \cdot (a + b) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot b$$

$$\sim 1_{\mathbb{F}} \cdot v = v$$

$$\sim (\lambda \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$$

Para todos $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$,
 $a, b, v \in V$

$$\sim (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$$

} Multiplicação por escalar

3.4



Exercício 3.4 Considere o conjunto $V = \{ x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \}$. Definimos as seguintes operações em V :

1. $\underline{x \oplus y = xy}, \forall x, y \in V;$
2. $\alpha \odot x = x^\alpha, \forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

Verifique se (V, \oplus, \odot) é um espaço vetorial real.

→ É sim

Inverso aditivo

✓

$$x \in V$$

$$\bar{x} \in V \text{ tal que } \underline{x \oplus \bar{x} = \theta_v}$$

$$x \bar{x} = 1$$

$$\bar{x} = 1/x$$

$$\bar{x} \oplus x = \theta_v$$

$$\theta_v \in V$$

$$\theta_v \oplus x = x$$

$$\theta_v x = x$$

$$\theta_v = 1 \in \mathbb{R}$$

$$x \oplus \theta_v \stackrel{?}{=} x$$

$$x \cdot \theta_v = x \cdot 1 = x \quad \checkmark$$

Zero existe

Resolução

Associatividade

$$\forall x, y, z \in V, \quad x \oplus (y \oplus z) \stackrel{?}{=} (x \oplus y) \oplus z \quad \checkmark$$

$\swarrow \quad \searrow$

$$= x(yz) = (xy)z$$

Comutatividade

$$xy = yx \quad \checkmark$$

Distributividade $\mu \in \mathbb{F} = \mathbb{R}, \quad a, b \in V$

$$\mu \odot (a \oplus b) = \mu \odot (ab) = (ab)^\mu = a^\mu \cdot b^\mu = (a^\mu) \oplus (b^\mu) \quad \checkmark$$
$$\stackrel{?}{=} (\mu \odot a) \oplus (\mu \odot b)$$

Identidade

$$1 \odot x \stackrel{?}{=} x$$

$$1 \odot x = x^1 = x \quad \checkmark$$

Associativo: $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad x \in V$

$$(\lambda \mu) \odot x = x^{(\lambda \mu)} = (x^\mu)^\lambda \quad \checkmark$$

$$\stackrel{?}{=} \lambda \odot (\mu \odot x)$$

$$= \lambda \odot (x^\mu)$$
$$= \lambda \odot (\mu \odot x)$$

Distributividade 2

$$(\mu + \lambda) \odot x = x^{(\mu + \lambda)} = x^\mu x^\lambda = (x^\mu) \oplus (x^\lambda) = \mu \odot x \oplus \lambda \odot x \quad \checkmark$$

$$\stackrel{?}{=} \mu \odot x \oplus \lambda \odot x$$