

# Monitoria de MA327

## semana 6

Monitor: Lucas

September 22, 2021

## Exercício 4.42

Considere o operador linear  $T$  sobre  $\mathbb{R}^2$  definido por

$$T(x, y) = (x + 2y, 2x + 4y).$$

Determine  $[T]_{\beta}^{\beta}$ ,  $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ ,  $[T]_{\beta}^{\alpha}$  e  $[T]_{\alpha}^{\gamma}$ , onde as bases  $\beta$ ,  $\alpha$  e  $\gamma$  são dadas por:

$$\beta = \{(1, 0), (0, 1)\}, \alpha = \{(1, -1), (0, 1)\} \text{ e } \gamma = \{(1, -1), (1, 1)\}.$$

# Resolução

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

(dica: aplique os vetores da base  $\beta$  em  $T$ , e o resultado já sai na base  $\beta$ )

Agora, notamos que podemos escrever:

$$[T]_{\alpha}^{\beta} = [I]_{\alpha}^{\beta} [T]_{\beta}^{\beta}$$

$$[T]_{\beta}^{\alpha} = [T]_{\beta}^{\beta} [I]_{\beta}^{\alpha}$$

$$[T]_{\alpha}^{\gamma} = [T]_{\alpha}^{\beta} [I]_{\beta}^{\gamma}$$

então o maior trabalho é encontrar as mudanças de base.

## Encontrando as matrizes mudança de base

Precisamos encontrar:  $[I]_{\alpha}^{\beta}$ ,  $[I]_{\beta}^{\alpha}$  e  $[I]_{\beta}^{\gamma}$ .

Temos:

$$[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[I]_{\beta}^{\gamma} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

*(pois  $\alpha$  e  $\gamma$  já foram dados nas coordenadas da base canônica  $\beta$ )*

Para encontrar  $[I]_{\alpha}^{\beta}$ , invertamos a primeira matriz.

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = ([I]_{\beta}^{\alpha})^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 1 - 0 \cdot (-1)} \begin{bmatrix} 1 & -0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$[T]_{\beta}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$[T]_{\alpha}^{\gamma} = [T]_{\alpha}^{\beta} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$