

Cálculo Numérico Computacional



Aula 11

Interpolação Interpolação Polinomial E Forma de Lagrange

Cálculo Numérico Computacional



Agenda:

1. O Conceito de Interpolação;
2. Interpolação Polinomial;
3. Forma de Lagrange;
4. Exemplo;
5. Exercícios.

Cálculo Numérico Computacional



1. O Conceito de Interpolação

- A aproximação de funções por polinômios é uma das ideias mais antigas de análise numérica, e ainda uma das mais usadas;
- Os polinômios são facilmente computáveis, suas derivadas e integrais são novamente polinômios, suas raízes podem ser encontradas com relativa facilidade etc.

Cálculo Numérico Computacional



- A aproximação polinomial pode ser obtida de várias formas: Interpolação, Método dos Mínimos Quadrados, Mini-Max etc;
- Além disso, o Teorema de Weirstrass afirma que *toda função contínua pode ser arbitrariamente aproximada por um polinômio*;
- Normalmente se faz uma aproximação para $f(x)$ quando não se conhece a expressão analítica de $f(x)$ (dados experimentais) ou $f(x)$ é de difícil manejo (complicada).

Cálculo Numérico Computacional



A seguinte tabela relaciona calor específico da água e temperatura:

temperatura (°C)	20	25	30	35	40
calor específico	0.99907	0.99852	0.99826	0.99818	0.99828
temperatura (°C)	45	50			
calor específico	0.99849	0.99878			

Cálculo Numérico Computacional




2. Interpolação polinomial

- Neste caso, dados x_0, x_1, \dots, x_n ; $(n + 1)$ pontos distintos em um intervalo I da curva, onde são conhecidos os valores da função $y_i = f(x_i)$. Desejamos determinar o polinômio de grau menor ou igual a n , $p_n(x) = a_n \times x^n + a_{n-1} \times x^{n-1} + \dots + a_1 \times x + a_0$ tal que $p_n(x_i) = f(x_i)$ para $i = 0, 1, 2, \dots, n$.
- **Teorema:** O polinômio de interpolação é único!

Cálculo Numérico Computacional



Graficamente, temos:





Cálculo Numérico Computacional

3. Forma ou Fórmula de Lagrange

- O polinômio de interpolação é definido por:

$$p_n(x) = f(x_0) \times L_0(x) + f(x_1) \times L_1(x) + \cdots + f(x_n) \times L_n(x)$$

Onde:

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0) \times (x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \times (x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \times (x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1}) \times (x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

Para $k = 0, 1, 2, \dots, n$

Cálculo Numérico Computacional



4. Exemplo

Usando a forma de Lagrange, determinar o polinômio de interpolação para a função $f(x)$ tabelada por:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

Diagram illustrating the interpolation data points:

- x_0 points to $x = -1$
- x_1 points to $x = 0$
- x_2 points to $x = 2$
- $f(x_0)$ points to $f(-1) = 4$
- $f(x_1)$ points to $f(0) = 1$
- $f(x_2)$ points to $f(2) = -1$

Cálculo Numérico Computacional



Solução:

- Neste caso, temos $n + 1 = 3$ (número de pontos)
- Vamos determinar um polinômio de grau menor ou igual a 2 tal que $p_2(x_i) = f(x_i)$
- O polinômio interpolador é dado por:

$$p_2(x) = f(x_0) \times L_0(x) + f(x_1) \times L_1(x) + f(x_2) \times L_2(x)$$

Cálculo Numérico Computacional



Agora, determinado $L_0(x)$, $L_1(x)$ e $L_2(x)$:

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1) \times (x - x_2)}{(x_0 - x_1) \times (x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0) \times (x - 2)}{(-1 - 0) \times (-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2 \times x}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0) \times (x - x_2)}{(x_1 - x_0) \times (x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1) \times (x - 2)}{(0 + 1) \times (0 - 2)} = \frac{x^2 - x - 2}{-2}$$

Cálculo Numérico Computacional



$$L_2(x) = \frac{(x - x_0) \times (x - x_1)}{(x_2 - x_0) \times (x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1) \times (x - 0)}{(2 + 1) \times (2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6}$$

Assim, na forma de Lagrange, teremos:

$$p_2(x) = 4 \times \left(\frac{x^2 - 2 \times x}{3} \right) + 1 \times \left(\frac{x^2 - x - 2}{-2} \right) + (-1) \times \left(\frac{x^2 + x}{6} \right)$$

$$p_2(x) = \frac{2}{3} \times x^2 - \frac{7}{3} \times x + 1$$

Cálculo Numérico Computacional



Verificando:

$$p_2(-1) = 4$$

$$p_2(0) = 1$$

$$p_2(2) = -1$$

OK!

2 condições básicas:

- Grau de $p_n(x) \leq n$
- $p_n(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n$



OUTRO EXEMPLO

*caderno



EXERCÍCIOS

Cálculo Numérico Computacional



Próxima aula:

Aula 12

- Interpolação: Forma de Newton

