

AUTORES

Dra. Evelyn Kidd, Dra. Débora Di Pilla, Dra. Valeria Yaleva. Dra. Julieta Arce, Dra. Sofía Seva. Data Scientist Luciano Lisachi

INTRODUCCIÓN

La coinfección VIH/TBC representa uno de los mayores desafíos en salud pública. La TBC es la principal causa de muerte infecciosa en personas con HIV, asociada a presentaciones diseminadas, diagnóstico tardío e inmunosupresión avanzada

OBJETIVO

Identificar factores asociados a la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con VIH/TBC internados en el Hospital Nacional A. Posadas entre 2019 y 2025


MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo
Periodo: 2019-2025
Hospital de tercer nivel
Pacientes > 18 años con diagnóstico de VIH y TBC
Análisis bivariado: Chi2 o Fisher OR con IC 95%

RESULTADOS


Los principales hallazgos del estudio se encuentran representados en los siguientes gráficos.

ADHERENCIA AL TARV




La baja adherencia al TARV se asoció a mayor riesgo de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA COHORTE



FORMAS CLÍNICAS DE TB



MORTALIDAD SEGÚN PRESENCIA DE FACTORES



CONCLUSIONES

- La coinfección VIH/TBC continúa asociándose a una elevada morbimortalidad hospitalaria.
- El ingreso a UTI: las infecciones oportunistas del SNC y las neoplasias son predictores independientes de mortalidad.
- La adherencia al TARV continúa siendo una oportunidad crítica de intervención.
- Estos hallazgos permiten identificar grupos de alto riesgo y orientar estrategias de prevención temprana.