Fdg 2109 — Procesos volcánicos

Formas de depósitos minerales.

Procesos externos.
Controlan los procesos de superficies.
Tasa de erosión.

Equilibrio dinámico y general.
Permite
Movimiento tectónico.

Límites de placas divergentes → choque continental-continental.

Nivel de detalle a especificar (Elementos)

Cantidad de actividad sísmica del volcán (actividad magmática)
y la fumarola. Indicios de cuándo puede ser la cámara próxima y es posible que haya erupción.

Origen del Magma. Fundidos pueden ser de T° de fusión de la roca
y se genera magma.

Si pasa de fusión → "Magma tiene estado fundido pero ha enfriado"
T° contenido en la roca

gradiente geotérmico.
La temperatura que aumenta una roca sube con profundidad. En promedio: 22°C/km



"Cristalizan fenocristales"
precipitan en zonas donde hay más minerales.

Anfíbol y la Volatilización

Si pasan los fundidos incompatibles + los volátiles
Magma residual
H_2O, gases; B, Cl, F, PO_3 (Densidades menores)
Presencia de la Alteración de los planos que tuvo Fe y Mg.



Alteración hidrotermal (por ejemplo → cuarzo cristalizado)

Alteración supergénica.
Cuando se enfría el agua de lluvia, la superficie cambia su estructura y libera agua.

Flogopita ferromagnésico. Con base cristalina de biotita (Mg)
Verde

Andesitas generalmente.

Depresión → depresurización en forma "amplia" extensivo.



Tipos de intrusión

Fuga lenguetas de lava.

y Diapirismo



Large Igneous Provinces

Morfología de tipos de volcanes. } En base a la forma de los edificios & como se relaciona la morfología con el tipo de erupción.

Origen de estos volcanes. } Saber que la forma de un volcán nos indica



CVZ → Riolitas o dacitas

SVZ → Andesitas, erupción poco explosiva

AVZ → poco y muy basálticos

Flat Slab: Subducción plana en zonas de subducción

Cerca a un cratón.

Cordillera Central

Depositional: proceso volcánico (Magmático) subterráneo.



Dyke son placas y muchas veces aparecen en volcanes.

Calderas : P

Productos volcánicos → (700 – 1200 °C)

- Coladas de lava.
  - Coladas cordadas
  - Coladas de bloque
  - Coladas alcalinas.
- Cenizas.
- Rocas piroclásticas.

WT % SiO_2

Basalto







Coladas cordadas (Pahoehoe): Ags.

ág: Basalto. Muy ágiles. Alejarse se con Cráteres Tipo brecha.

Bloque: Lavas viscosas Mayor ángulos y rígidas.

En altitud: Volcanes Subglaciales.

Flujos piroclásticos

Lahar: flujo de lodo. (Products piroclásticos)

Silicosis → 22 – 25 años mineros. Por exposición a polvos
Cristobalita "ojos de sílice".

↓

Se refiere con de flujo piroclástico. Ej Por explosión de domos / flujos.

Gran de Volcán Gr Vn. Ruapehu

En estudio basaltos. Vn Mauna Loa

Ej Hawai: Golpes. Crater Lake, Oregon.

Cono de escoria: Lava de una ka lavas, sino de proclastos o escoria.

Vn. Paricutin, México.

Domo de lava: Represa nsa de lava. Reológicos

Domo



Coulée

Magmas: Contos. se genera en superficie negativo.

Corta el nivel eratico:

Viscosidad	Wt SiO_2	Temp	Wt H_2O	Color explosiva
Hawaiano				
Estromboliano				
Vulcaniano				
Peleano				
Pliniano				