2209

Fdg-Lab. — Metamorfismo

Falla: se rompe una roca. Una sube y otra baja.

De contacto y regional

(o local)

Lo genérico "choque de placas".

- De enterramiento: por presión litostática
- Orogénico: entre placas continentales.
- De fondo oceánico: entre placas m

Procesos secundarios → De impacto Ej: Meteorito

Térmico

Dinámico

- De contacto ["cuerpo intrusivo"] → Pirometamorfismo
- Hidrotermal
- Coladas de lava. Ej: Andesítica por su calor y "cocer" roca adyacente.



Dinámico

Porfiroides

Bajo.

~~Rocas~~ Corneanas

~~Rocas~~ Azufre, etc.

Clasificación

- Cosmopolitas: Mineral Indicador A cierta temperatura y presión de la roca como te!

Rocas foliadas y no foliadas.

Orientación de la roca — Mayor presión que T°

Mayor T° que P

Pizarra → + Brillante (Mica, Biotita, etc) Esquisto, Gneis, Fundido.

Pizarra: Orientación sin mineral — por enterramiento

Esquisto: Más deformada, Grande Adabaito

Clasificación Diagrama de facies metamórficas.

Ejemplo: Esquisto verde

Facie ~~[illegible]~~ Serie ~~[illegible]~~ Importante pero no necesario
1 mineral índice.

Minerales A, B, C, D,

Aspectos texturales:

a Granoblástica. Puros granitos de otros
b Lepido: Micas orientadas (Clorita, Biotita, Moscovita)
c Nemato: Piroxenos, Anfíboles orientados.
d Porfido: Cristales índice visibles Aluminosilicatos en general.
e Poiquilo







Microestructuras y Fábrica →
Planar
Orientados
Lineal Minerales Orientados. →

Foliación.

Pliegues [illegible]

Micropliegues.

↓

Crenulación

Foliación milonítica

Gnéisica

Metamorfismo

} Estructuras.

Clasificación y Grado M. De acuerdo al Protolito.

Arcilla

Lutita y Arenisca

Pizarra
Lutita - Arenisca

Filita
y Wacita

Esquisto

Gneis

Menor Grado → Mayor Grado

0° 800°

Diferencia → Desarrollo mismo

Gneiss Moscovita mucho más grande (y plagioclasa) en el Gneiss que en el Esquisto

Brillo mate → Pizarra