Fay LAC 2309

Foliadas → Pizarrosidad
→ Esquistosidad
→ Bandeamiento gneisico Bandas claras y oscuras.

Foliación de Cizalla

Textura mixta → Ej. Migmatita "Metamorfismo + ígneo".

Pizarra Suele romper en capas
Metamorfismo regional.

Filita Tiene lepidoblástica
Moscovita/Sericita, clorita, cuarzo.

Esquisto Puede tener la cuarta textura juntas
Más común → Granolepidoblástica

Protolito → Roca mineral inicial.
Origen reconocible

Gneis Bandeamiento composicional.
~~Abundante [illegible] cuarz~~o y en feldespato potásico
protolito pelítico.

Milonita (Foliada)
Orientación es direccionada por el dinamismo de la falla
Temperatura más que deformación
Grano muchísimo más fino

Migmatitas "Fusión parcial".
Recristalización debido a los cuerpos intrusivos.

Rocas no foliadas → Esfuerzo en distintos ejes.
Cuarcita ~ >90% Qz Protolito Arenisca cuarzosa.

"Metasomatismo"
Minerales accesorios → porcentaje bajo.

Mármol.

Granoblástica

Calcita Dolomita

Cristales visibles, reacciona al HCl

Serpentinita No foliada Metamorfismo hidrotermal.

Parece o granoblástica

Débilmente orientada

Rocas ultramáficas y peridotitas

Anfibolita (puede ser foliada o no)

Textura estructura.

Corneana (Hornfels)

Textura muy reconocible por contacto.

Porfiroblástica.

Roca muy dura ~~pero~~ más reconocible ~~por~~ reacciona al HCl (olor a huevo podrido).

	Filita	Pizarra
Brillo	Sedoso	Terroso
Corte irregular	Angulosa VIS	Rectos