Myclas 2409

Br h

no metálico → Silicato, aluminosilicatos

Grafito → Sulfuros.

Formas: Euhedral, subhedral, Anhedral. "que tienen forma según el hábito."

Raya → para distinguir gelena de magnetita.

Notas: Compuesto por un elemento grupo. Bismutinita y muchos más duros.

- Cobre (Cu).

Hábito dendrítico, en láminas, granos irregulares o masas compactas.

Acuñe

Arenisca interestratificada

Roble masivo. rojo

Raya blanca.

Sulfuros. Alcohol y un metal.

Refringencia → Cambiando el brillo

Calcopirita ($CuFeS_2$)

3.5 - 4 dureza

No efervesce en HCl.

→ Calcosina (Cu_2S)

- Color Gris plomo a negro.
- Covelina Azul índigo (CuS)

Bornita (Cu_5FeS_4)

→ Color bronce, de alteración a púrpura/azul → Sulfuro de Plomo Galena (PbS)

Iridiscencia.

Pirita Amarillo latón pálido (FeS_2)

Negro verdoso: Raya.

Cobrizo, Hábito, granular.

Condrítica a disgregada

→ Sulfuro de Hierro.

Gris oscuro. Muy denso.

Nombre: Lucero Astudillo Borja Fecha: 29.09.2026

Nombre	Elemento principal	Grupo mineral	Sistema cristalino	Dureza	Color	Hábito	Brillo	Raya	Paragénesis	Génesis
Pirotina	Fe	Sulfuro	Hexagonal Monoclínico	3.5-4.5	Bronce amarillo marrón.	Tabular	Opaco Metálico	Negro Grisáceo Oscuro	Pirita, marcasita, calcopirita, etc. Sulfuros magnetita, calcita, dolomita	Principalmente en rocas ígneas máficas, sedimentarias y rocas metamórficas
Cobre	Cu	Nativo.	Cúbico	2.5-3	Rojo pardo rojo	Masivo laminar.	Metálico	Rojo cobre brillante	Platas, calcocita, bornita, cuprita, malaquita, azurita, tenorita, óxidos de cobre	Zonas porfídicas en rocas extrusivas máficas.
Magnetita	Fe	Óxido (Spinel)	Cúbico	5.5-6.5		octaédrico Masivo.	opaco Translúcido en finas algunas myy delgadas	Negro	Cromita, ilmenita, rutilo, apatito, silicatos, pirita, etc.	Un mineral accesorio in rocas ígneas y metamórficas
Galena	Plomo	Sulfuro	Cúbico	2.5-2.75	Gris	Cúbico	Opaco	Gris.	En vetas hidrotermales, depósitos metamórficos de contacto	Paragénesis Esfalerita, marcasita, pirita, calcopirita, tetraedrita, minerales de plata, siderita, cerusita, dolomita, barita, cuarzo, y otros muchos minerales metalíferos.

Génesis

obs

Pegmatita
— Puede ser metamórfico de contacto

Mackle

Molibdate

Hay blanda 1-1.5

Lemmas

Yeso

III Óxidos e hidróxidos Oxigen O2- o grupos hidroxilo (OH-)

Magnetita (Fe_3O_4)

Hab. tetraedros, mallas,

Negativa

Pirolusita (MnO_2) vs (Mn_xO_2 dendrítico: flujos ricos en óxido de manganeso)

cracqree los dedos al

manipular.

Ilmenita ($FeTiO_3$) Forma prismas

Rocas ígneas

Hematites (Fe_2O_3) Hábito tabular

Rojo puede Rojo

Cuprita (Cu_2O)

Dimorfo de cobre nativo.

Hábito tabular pero negruzco.

y

Mushketovita

Bipiramidal. Hematites

Hidróxidos. Limonita – Mezcla de óxidos e hidróxidos ($FeO(OH)\cdot nH_2O$)

no mineral puro.