

NOTIZIARIO

AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO

“REGIONALE”

Settimanale N. 36 Anno XL

02 - 08 settembre 2026




Sommario	
1	METEOROLOGIA
2	DATI PREVISTI
3	CLIMATOLOGIA
4	FITOPATOLOGIA



**Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali della Puglia**

METEOROLOGIA

Puglia



Situazione Attuale

Il quadro sinottico euro atlantico mostra il flusso perturbato che scorre intorno al 45°N delimitato da una saccatura estesa dalla Groenlandia meridionale, dove è posizionato un primo minimo, fino al nord Atlantico, poi si dirige ondulato verso est sulla penisola scandinava e i paesi Baltici, mentre un secondo minimo è posizionato nel mare del Nord a sud della Norvegia. Scendendo di latitudine, sul Mediterraneo si rileva ancora la presenza del promontorio di matrice sub-tropicale che dall'entroterra del nord Africa si spinge fino all'Anatolia. Sul resto dello scenario, ad ovest, si riscontra un promontorio sul medio Atlantico e un campo di alta pressione ad est sulla Russia centrale. L'Italia in questo contesto rimane interessata direttamente dal promontorio nord africano e dall'avvezione di aria calda con conseguente persistenza di temperature ancora al di sopra della media del periodo ma con maggiore ventilazione che abbasserà i tassi di umidità responsabili delle situazioni di disagio registrate nei giorni scorsi soprattutto nelle regioni meridionali. Per oggi sulle regioni settentrionali da poco nuvoloso a nuvoloso nelle ore più calde con rovesci ed isolati temporali sui rilievi alpini, sul Veneto ed Emilia Romagna. Al centro generalmente sereno eccetto sui rilievi dell'appennino toscano e sui rilievi delle Marche e dell'Abruzzo per via di addensamenti nuvolosi, in formazione nelle ore centrali della giornata, che potranno dare luogo a rovesci e ad isolati temporali in attenuazione serale. Sul meridione, prevalentemente sereno salvo sulla Sicilia meridionale e la Calabria dove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità anche su Molise, Basilicata, Calabria e Puglia con possibili locali rovesci.




mercoledì 02 settembre 2026

Cielo parzialmente nuvoloso alternato a schiarite eccetto sul Salento dove persisteranno condizioni di cielo sereno e soleggiato; dal pomeriggio estensione degli addensamenti a gran parte della Puglia con possibili piovoschi sul tarantino e altamurano.

Temperatura stazionaria.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, deboli meridionali su quello ionico.

Mari poco mossi.




giovedì 03 settembre 2026

Cielo sereno e soleggiato su Foggia e Bat, parzialmente nuvoloso alternato a transitorie schiarite sul resto della Puglia.

Temperatura stazionarie le minime, in diminuzione le massime.

Venti settentrionali, forti sul basso Adriatico, molto forti sullo Ionio, moderati sul litorale della Bat e del foggiano.

Mari poco mossi l'Adriatico e il Canale d'Otranto, mosso lo Ionio.




venerdì 04 settembre 2026

Cielo generalmente sereno e soleggiato.

Temperatura stazionaria.

Venti settentrionali, forti sul basso Adriatico, molto forti sullo Ionio, moderati sul litorale di Manfredonia e le zone esposte del Gargano.

Mari generalmente mossi.




sabato 05 settembre 2026

Cielo sereno e soleggiato.

Temperatura in diminuzione le minime, in aumento le massime.

Venti dai quadranti settentrionali da deboli a moderati sull'Adriatico, forti meridionali sullo Ionio.

Mari da poco mosso a mosso l'Adriatico, mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio.



domenica 06 settembre 2026

Cielo sereno e soleggiato.

Temperatura in aumento le minime, stazionarie le massime.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, forti meridionali su quello ionico.

Mari quasi calmo l'Adriatico, poco mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio.

Tendenza per lunedì 07 e martedì 08 settembre 2026

Continua il bel tempo con cielo sereno e soleggiato.


DATI PREVISTI Dal 02-09-2026 al 06-09-2026

DATA	CIELO		VENTO		TEMP.		UMID.		FENOMENI		PREC	MARE
	ORE 00:00	ORE 12:00	ORE 00:00	ORE 12:00	min	max	min	max	Tipo	%	mm	
FOGGIA												
02 set	Sereno	Nuvoloso	Calmo-Debole W	Debole N	25	35	35	70				
03 set	Poco nuvoloso	Sereno	Debole W	Quasi Forte N	25	32	40	70				
04 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Debole-Moderato N	24	34	35	65				
05 set	Sereno	Sereno	Calmo SW	Debole-Moderato E	23	38	20	55				
06 set	Sereno	Sereno	Calmo-Debole SW	Debole-Moderato E	25	36	30	65				
SAN NICANDRO GARGANICO												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole S	Quasi Forte NE	23	30	45	85				
03 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole W	Quasi Forte N	24	29	60	85				
04 set	Poco nuvoloso	Sereno	Quasi Forte NW	Moderato N	24	31	45	85				
05 set	Sereno	Sereno	Moderato S	Quasi Forte NE	22	37	25	60				
06 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato S	Moderato NE	24	34	40	85				
ANDRIA												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Calmo-Debole SW	Debole-Moderato NE	22	31	40	65				
03 set	Poco nuvoloso	Sereno	Debole-Moderato W	Moderato N	24	31	40	70				
04 set	Sereno	Sereno	Moderato W	Debole-Moderato NE	23	31	40	65				
05 set	Sereno	Sereno	Debole SW	Debole-Moderato NE	23	35	25	45				
06 set	Sereno	Sereno	Debole SW	Debole-Moderato NE	24	33	35	50				
BARI												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole SW	Moderato NE	24	30	55	70				Poco mosso
03 set	Sereno	Sereno	Moderato W	Molto Forte NW	25	31	50	70				Poco mosso
04 set	Sereno	Sereno	Forte W	Quasi Forte N	24	31	45	65				Mosso
05 set	Sereno	Sereno	Moderato SW	Moderato E	23	34	30	55				Poco mosso
06 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato W	Moderato NE	25	32	45	60				Quasi calmo
GIOIA DEL COLLE												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole-Moderato NW	Quasi Forte N	19	30	40	70				
03 set	Sereno	Sereno	Quasi Forte N	Molto Forte N	23	30	40	75				
04 set	Sereno	Sereno	Forte NW	Molto Forte N	22	31	35	65				
05 set	Sereno	Sereno	Moderato NW	Quasi Forte E	22	34	20	55				
06 set	Sereno	Sereno	Moderato NW	Forte NE	23	34	30	50				
BRINDISI												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Quasi Forte NW	Forte N	24	30	65	75				Poco mosso
03 set	Sereno	Poco nuvoloso	Molto Forte NW	Molto Forte NW	26	29	65	80				Poco mosso
04 set	Sereno	Sereno	Molto Forte NW	Molto Forte N	26	30	50	80				Mosso
05 set	Sereno	Sereno	Forte NW	Moderato N	25	32	45	75				Mosso
06 set	Sereno	Sereno	Moderato SW	Forte N	24	31	50	75				Quasi calmo
GINOSA												
02 set	Sereno	Coperto	Moderato N	Debole S	24	34	35	65	Rov/Temp	60	2	
03 set	Poco nuvoloso	Sereno	Quasi Forte N	Molto Forte N	24	32	25	65				
04 set	Sereno	Sereno	Molto Forte NW	Molto Forte N	23	33	25	65				
05 set	Sereno	Sereno	Moderato NW	Quasi Forte S	21	35	20	50				
06 set	Sereno	Sereno	Moderato NW	Quasi Forte S	23	36	25	50				
MANDURIA												
02 set	Sereno	Nuvoloso	Calmo-Debole N	Debole N	23	32	35	70				
03 set	Sereno	Sereno	Debole N	Quasi Forte N	24	32	35	70				
04 set	Sereno	Sereno	Moderato N	Quasi Forte N	24	33	30	70				
05 set	Sereno	Sereno	Debole N	Calmo-Debole S	23	35	25	60				
06 set	Sereno	Sereno	Calmo-Debole N	Debole-Moderato NE	24	35	30	55				
LECCE												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole NW	Debole-Moderato N	24	32	45	85				
03 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole-Moderato NW	Forte N	25	31	50	80				
04 set	Poco nuvoloso	Sereno	Moderato NW	Quasi Forte N	25	33	35	85				
05 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato NW	Debole N	24	34	35	80				
06 set	Sereno	Sereno	Calmo W	Debole-Moderato N	24	34	35	80				
OTRANTO												
02 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato NW	Moderato N	25	30	60	90				Poco mosso
03 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato NW	Forte N	26	29	65	80				Poco mosso
04 set	Poco nuvoloso	Sereno	Moderato NW	Forte N	26	31	50	85				Mosso
05 set	Sereno	Sereno	Moderato NW	Debole N	25	31	55	80				Mosso
06 set	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato N	25	31	50	80				Poco mosso
SANTA MARIA DI LEUCA												
02 set	Sereno	Poco nuvoloso	Molto Forte N	Quasi Forte N	25	34	45	85				Poco mosso
03 set	Sereno	Poco nuvoloso	Molto Forte N	Molto Forte N	24	32	50	90				Mosso
04 set	Poco nuvoloso	Sereno	Molto Forte N	Molto Forte N	24	33	35	85				Mosso
05 set	Sereno	Sereno	Molto Forte N	Quasi Forte SE	23	32	45	80				Mosso
06 set	Sereno	Sereno	Quasi Forte NW	Quasi Forte NE	23	34	40	85				Poco mosso


DATI RILEVATI

Dal 24-08-2026 al 30-08-2026


Temperatura a 2m - Massima




Temperatura a 2m - Media




Temperatura a 2m - Minima




Velocità del vento a 2m - Max



Velocità del vento a 2m - Min




Velocità del vento a 10m - Max




Velocità del vento a 10m - Min



Eliofania Totale



Precipitazione Totale



^(*) Dati Rilevati dalle Stazioni della Rete Agrometeorologica Regionale

CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE Dal 24-08-2026 al 30-08-2026

L'inizio della settimana tra il 24 e il 30 agosto è stato caratterizzato dall'avvezione di aria calda sul Mediterraneo centro occidentale per via di un promontorio sub-tropicale che avvolgeva l'est della Spagna, il meridione d'Italia, le isole maggiori e la Grecia, mentre un cavo d'onda del suddetto flusso risaliva sul mar Nero e poi si dirigeva sulla pianura russa. Ciò apportava in quest'area un aumento delle temperature e la tendenza ad un'ulteriore risalita dei valori massimi, in alcune zone del sud dell'Italia, nelle giornate tra giovedì e venerdì. Sul resto dello scenario il flusso perturbato scorreva al di sopra del 50°N delimitando una prima estesa saccatura tra la Groenlandia e l'Islanda che si spingeva ulteriormente, con un flusso secondario, sul medio Atlantico dove alimentava un vortice depressionario ad ovest del Portogallo; ad est la seconda depressione interessava l'area tra il mare di Barents, la penisola scandinava e i Paesi Baltici. Nella giornata di mercoledì 26, la situazione mostrava alle latitudini nordiche il flusso perturbato principale delimitato da due saccature di origine polare: la prima in discesa, in senso meridiano, dal mare del Labrador e la Groenlandia nel medio Atlantico sino al Portogallo, la seconda più ad est interessava invece l'area tra il mare di Barents e la pianura russa. Le due aree depressionarie erano intervallate da un vasto promontorio, con il suo massimo posizionato sulla penisola scandinava. Sul resto dello scenario, sul Mediterraneo occidentale era presente il flusso sub-tropicale delimitato da un esteso promontorio nord africano che risaliva dall'entroterra libico sull'Italia meridionale apportando masse d'aria particolarmente calde con conseguente aumento della temperatura su valori termici molto al di sopra della media del periodo. Sul Mediterraneo orientale, invece, si riscontrava un vortice in quota tra la Turchia e l'Egitto. Verso il weekend lo scenario euro atlantico mostrava all'estremo nord il flusso perturbato principale che si muoveva ondulato tra la Groenlandia e il mare di Barents delimitando due saccature: la prima ad ovest nel nord Atlantico, sino ad interessare le isole britanniche e il Golfo di Biscaglia, composto da diversi minimi posizionati a sud della Groenlandia, ad ovest dell'Islanda e nel mare del Nord; la seconda, con minimo sul mare di Barents, discendeva sino all'entroterra russo e risultava in fase con un cavo d'onda sull'Ucraina. L'Italia, come il resto del Mediterraneo, rimaneva sotto l'influsso di masse d'aria calda nord africane che risalivano dalla Libia determinando condizioni di caldo afoso con temperature molto elevate, in particolare nella giornata di venerdì ma altrettanto alte, anche se con una leggera flessione, anche in quella di sabato e domenica. Infatti la Puglia è stata sotto l'influsso di un'ondata di calore particolarmente anomala con valore medio settimanale regionale della temperatura massima di 41,1°C. I giorni più caldi sono stati martedì 25 agosto (massima rilevata 41,6°C), giovedì 27 (massima rilevata 40,2°C), venerdì 28 (massima rilevata 44,4°C, registrata nel foggiano ad Apricena), sabato 29 (massima rilevata 43,0°C, registrata nel tarantino) e domenica 30 agosto (massima rilevata 41,1°C). I venti, mediamente a livello regionale, hanno soffiato prevalentemente da sud/sud-ovest con velocità media settimanale di 65,9 Km/h, con intensità più elevata nella giornata di martedì 25 agosto (max 97,2 Km/h) e sabato 29 agosto (max 70,2 Km/h).

DATI RILEVATI DAL 24-08-2026 AL 30-08-2026


COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC. mm	EVAP mm
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX		
ALBEROBELLO	BA	ITAS	OPU31	29.3	20.9	39.3	45	15	93	0	46.3
ALTAMURA	BA	GUROLAMANNA	OPU01	29.4	20.3	39.8	43	17	82	0	55.1
ALTAMURA	BA	S.P. SANTERAMO	MBA22	27.9	17.8	41.3	54	18	94	0	n.d.
BARI	BA	C.N.R. IRSA	OPU48	30.8	22.5	40.4	49	15	84	0	34.2
CASAMASSIMA	BA	SERRONE(AZ.AGR.MANCINI)	MBA27	29.4	19.9	40.5	51	17	90	0	n.d.
CASSANO DELLE MURGE	BA	S.P. SANNICANDRO	MBA24	29.1	18.9	39.7	49	19	93	0	n.d.
CONVERSANO	BA	CONTRADA COZZE	OPU52	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
GRAVINA IN PUGLIA	BA	S.P. SPINAZZOLA	MBA23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
GRAVINA IN PUGLIA	BA	LIMELLI D'IMPERATORE	OPU03	29.1	20.6	40.9	47	17	87	0	49
LOCOROTONDO	BA	ITAS VIA PER CISTERNINO	OPU49	28.2	17.7	39	48	15	91	0	37.8
MONOPOLI	BA	CONTRADA MATER DOMINI	OPU18	29.9	22.5	39.4	53	21	86	0	43.8
NOCI	BA	MURGIA ANTICI	MBA28	28.4	17.4	41	51	15	92	0	n.d.
NOICATTARO	BA	VIA CASAMASSIMA	OPU30	29	20.8	39.1	54	20	84	0	44.5
PUTIGNANO	BA	LAMENDOLA I	MBA29	28.7	18.8	40.3	50	17	94	0	n.d.
SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA PER GIOIA DEL COLLE	MBA25	28.5	18.3	39.3	48	16	95	0	n.d.
TERLIZZI	BA	ITAS	OPU19	29.5	20.1	41.2	47	13	88	0	33.4
TORITTO	BA	QUASANO	OPU53	29.9	21.7	39.4	41	15	82	0	54.8
VALENZANO	BA	CAMPO SPER. UNIBA	MBA26	30	20.4	41.5	54	20	93	0	n.d.
BRINDISI	BR	TORRE MOZZA	OPU32	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CAROVIGNO	BR	VIA PER Ceglie MESSAPICA	OPU21	29.8	20.4	40.2	51	23	84	0	42.9
CEGLIE MESSAPICA	BR	FERRUZZO	MBR31	29.8	21.5	40.4	48	19	90	0	n.d.
FASANO	BR	FASCIANELLO	MBR30	30.2	23.1	39.1	51	22	81	n.d.	n.d.
FASANO	BR	OTTAVA SEDICI	OPU04	30.1	21.4	41.1	51	19	80	0	42
LATIANO	BR	MILETO	OPU34	28.6	18.3	39.9	54	19	96	0	32.1
MESAGNE	BR	MOCCARI	OPU33	29	20	38.9	62	23	93	0	37.3
OSTUNI	BR	MASSERIA SANTORO	OPU17	27.3	15.9	39.7	53	17	90	0	n.d.
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	MAINE	OPU06	28.7	19.9	39.8	63	19	91	0	36
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SIGNORANNA	OPU35	29.7	20.4	40.3	50	19	92	0	39.8
TORRE SANTA SUSANNA	BR	ARCIPRETE	OPU54	29.3	19	42.2	54	15	90	0	45
VILLA CASTELLI	BR	VIA PER FRANCAVILLA FONT	OPU20	29.8	19.6	41.9	48	16	86	0	45.1
ANDRIA	BT	PAPPARICOTTA	OPU16	29	18.3	42	50	15	93	0	40.6
ANDRIA	BT	MONTEGROSSO	MBA21	30.2	20.9	41.4	41	15	93	0	n.d.
CANOSA DI PUGLIA	BT	IPSAA	MBA20	29	19.6	42.1	54	17	92	0	n.d.
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	LA PERA DI BASSO	MFG17	28.2	18.9	40.9	60	17	99	0	n.d.
TRANI	BT	S.S. CORATO-TRANI	OPU28	29.3	20.5	41	52	16	89	0	42.3

DATI RILEVATI DAL 24-08-2026 AL 30-08-2026											
COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC.	EVAP
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm	mm
ALBERONA	FG	SERRONE	MFG12	29.9	21	42.4	46	17	84	0	n.d.
APRICENA	FG	CANALE	OPU22	29.4	19.3	44.4	54	15	90	0.4	42.1
ASCOLI SATRIANO	FG	BISCIGLIETO	MFG13	30.4	21.6	42.4	41	11	83	0	n.d.
CARLANTINO	FG	CAMPO SANTO VECCHIO	OPU56	26.9	19	39.5	53	17	92	0	n.d.
CARPINO	FG	ARIOLA	MFG09	30	21.3	40.7	34	8	100	0	n.d.
CERIGNOLA	FG	TRESSANTI	MFG04	29.7	20.4	40.2	53	16	85	0	n.d.
CERIGNOLA	FG	TAVOLETTA	MFG06	29.4	18.4	43.2	54	16	88	0	n.d.
FOGGIA	FG	LA PESCIA	MFG03	30.1	20.8	41.1	52	17	86	0.2	n.d.
FOGGIA	FG	COPPA D'ORO	MFG07	29.7	19.3	42.9	53	17	88	n.d.	n.d.
FOGGIA	FG	MONTEROZZI	MFG19	29.7	19.1	42.6	51	16	87	0.4	n.d.
FOGGIA	FG	BORGIO LA ROCCA	OPU38	29.8	19.1	43.2	49	15	86	1.2	42
LESINA	FG	RIPALTA	OPU55	29.3	21.1	39.7	59	18	94	0	40
LUCERA	FG	S. LUCIA	MFG01	30.4	21	43.9	46	15	81	0	n.d.
MANFREDONIA	FG	DAUNIA RISI	OPU23	27.7	19.5	41	66	18	89	0	40.8
ORTA NOVA	FG	TRIONFO	OPU07	29.6	19.6	43.9	59	19	100	0.8	41.3
PIETRAMONTECORVINO	FG	TORRETTA	OPU08	29.5	19.8	43.1	47	15	88	0	48.1
RIGNANO GARGANICO	FG	VILLANOVA	OPU36	30.4	18.4	43.9	48	14	90	0	34.3
RODI GARGANICO	FG	S. LUCIA	MFG14	29.2	21.6	41.3	60	22	99	0	n.d.
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	MATINE - CARNE SALATA	MFG10	30.2	20	42.3	44	16	81	0	n.d.
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	QUERCIA COPPE	MFG16	28.1	20.4	38.2	46	19	85	0	n.d.
SAN SEVERO	FG	CASA LORDA	MFG15	29.6	18.8	43.5	51	16	88	0.6	n.d.
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	PALOMBARA	OPU57	30.2	18.9	42.3	44	13	87	0	59.1
TORREMAGGIORE	FG	SELVA DELLE GROTTI	MFG11	28.9	16.7	42.3	55	18	88	0	n.d.
TROIA	FG	SERRA DEI BISI	MFG02	29.9	21.5	41.9	42	15	91	0	n.d.
TROIA	FG	COLAZZE - GIARDINETTO	OPU37	29.5	18.2	42.4	49	16	82	0	41.4
VIESTE	FG	MANDRIONE	MFG18	28.3	20.4	39.6	61	24	100	0	n.d.
ZAPPONETA	FG	RIVOLI	MFG05	n.d.	n.d.	n.d.	58	12	99	0	n.d.
LECCE	LE	ITAS	OPU41	29.5	19.2	40.4	58	18	91	0	35.7
LEVERANO	LE	ARCHE	OPU40	29.9	21.1	41.9	55	16	96	0	38.2
MARTANO	LE	MALOPRA	MLE35	28.8	20.6	39.8	63	23	94	0	n.d.
MINERVINO DI LECCE	LE	SCARCIGLIA (CNR)	OPU60	29.2	21.7	39.5	67	22	96	0	43
NARDO'	LE	BRUSCA	OPU61	29.6	20.5	41.7	62	17	97	0	46.9
NOCIGLIA	LE	VIA PER SUPERSANO	OPU25	29.5	20.8	39.7	61	21	97	0	43.8
OTRANTO	LE	FRASSANITO	OPU10	28.6	22.4	38.2	74	25	98	0	38
RACALE	LE	CONTE	OPU12	29.5	20.6	41.8	65	21	94	0.2	40.9
SALICE SALENTINO	LE	PANCAZZIO	OPU42	29.2	19.9	41.2	60	19	98	0	38.5
SQUINZANO	LE	BADESSA	OPU11	29.2	20.2	40.4	63	22	91	0	41.6
TRICASE	LE	LUCUGNANO	OPU43	29.9	22.5	39.6	60	24	97	0.2	35.7
UGENTO	LE	BARBARO	MLE34	29.5	20.3	41.4	59	18	94	0	n.d.
CASTELLANETA	TA	CASTELLANETA MARINA	OPU47	29.1	19.5	42.5	51	8	100	0	36
CASTELLANETA	TA	TAFURI	OPU14	29	19.1	41.2	51	19	80	0	49.6
GINOSA	TA	VERSO PALAGIANO	OPU58	30.1	21.1	42.1	52	16	86	0	45.2
GROTTAGLIE	TA	VERSO TARANTO-PAOLO VI	OPU27	29.1	19.4	41.9	52	14	88	0	n.d.
MANDURIA	TA	TORRE ROSSA	OPU44	29.9	21.1	42.3	55	18	88	0	36
MARTINA FRANCA	TA	VERSO MASSAFRA	MTA32	29.7	20.4	41.4	46	14	100	0	n.d.
MASSAFRA	TA	AMENDOLECCHIA	OPU46	29.7	21.5	42.1	49	15	83	0	33.7
MOTTOLA	TA	SAN BASILIO	OPU45	28.8	19.9	41.2	53	18	84	0	39.2
PALAGIANELLO	TA	MONTE D'ORO	OPU59	30.3	22	43	53	13	85	0	46.2
SAN GIORGIO IONICO	TA	VERSO TARANTO	MTA33	29.7	n.d.	n.d.	50	n.d.	n.d.	0	n.d.
TORRICELLA	TA	VERSO MARINA DI LIZZANO	OPU13	28.5	19.2	41.1	65	21	92	0	n.d.
MEDIA				29.3	20.1	41.1	52.7	17.3	90.2	0.1	41.8
MINIMO				26.9	15.9	38.2	34	8	80	0	32.1
MASSIMO				30.8	23.1	44.4	74	25	100	1.2	59.1


CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE
Dal 24-08-2026 al 30-08-2026

Temperatura a 2m - Massima




Temperatura a 2m - Minima



Precipitazione Totale



Eliofania Totale



^(*) Dati Rilevati dalle Stazioni della Rete Agrometeorologica Regionale

FITOPATOLOGIA

BARI E BAT

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di malattie fungine e rogna - oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*).
Sporadiche catture di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) nelle trappole a feromoni.

Programma di Difesa:

Nei giovani impianti, per il controllo dell'oziorrinco, applicare al tronco delle piante e ai paletti tutori delle fasce di fibra acrilica al fine di impedire la risalita notturna dell'insetto sulla pianta.

Le alte temperature, superiori alle medie stagionali, stanno ostacolando lo sviluppo delle infestazioni attive della mosca (*Bactrocera oleae*). Proseguire il monitoraggio tramite le trappole a feromoni e campionamenti delle olive e nel caso di superamento della soglia di infestazione, 4-5% per le olive da olio e le prime punture per le olive da tavola, si può intervenire con un trattamento insetticida.

I trattamenti insetticidi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulterici), utilizzando esclusivamente esche proteiche attivate con formulati specifici a base di *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, ecc.;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupyradifurone*.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza localizzata di peronospora (*Plasmopara viticola*) e oidio (*Uncinula necator*) .

Programma di Difesa:

Nessun trattamento fitosanitario.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza localizzata di peronospora (*Plasmopara viticola*) - oidio (*Uncinola necator*) e mosca della frutta (*Ceratitis capitata*).

Programma di Difesa:

Per la peronospora, in caso di infezioni, intervenire celermente con prodotti fitosanitari dotati di attività bloccante, utilizzando dosi di etichetta e curando una buona bagnatura della vegetazione.

Oidio, prestare attenzione alle foglie e ai tralci che presentano sintomi della malattia soprattutto se nell'anno precedente sono state rilevate infezioni. Nel caso di infezioni intervenire con prodotti specifici.

Per la tignoletta, si riscontrano poche catture nelle trappole a feromoni. Con le attuali temperature particolarmente elevate, l'efficacia di cattura delle trappole cala drasticamente, sarà meglio affidarsi all'osservazione dei grappoli per individuare le ovideposizioni e lo stadio prevalente di maturazione delle uova.

Si consiglia di programmare interventi insetticidi, con prodotti tradizionali dopo 8 - 12 giorni dall'inizio del volo; con regolatori di crescita, dopo 4 - 5 giorni dall'inizio del volo; con *Bacillus thuringiensis*, dopo 5 - 7 giorni dall'inizio del volo, da ripetersi dopo 7 - 10 giorni dal primo trattamento.

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta.

CILIEGIO



Situazione Fenologica:

Estivazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Le piante colpite da marciumi radicali devono essere estirpate, allontanate dal campo e bruciate.

Nella buca prodotta con lo svellimento distribuire calce viva.

ALBICOCCO



Situazione Fenologica:

Estivazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Tenere sotto controllo le malattie fungine.

Per le malattie fungine si possono utilizzare fungicidi specifici (a base di *pyrimethanil*, *metconazolo*), oppure prodotti biologici come il *polisolfuro di calcio* o il *bicarbonato di potassio*.

PATATA

**Situazione Fenologica:**

Nulla da segnalare.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento fitosanitario.

INSALATA

**Situazione Fenologica:**

Trapianto.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun consiglio di difesa.

MANDORLO

**Situazione Fenologica:**

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

FITOPATOLOGIA

FOGGIA

TERRITORIO ESCLUSO GARGANO

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutto.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di mosca dell'olivo e margaronia.

Programma di Difesa:

E' utile collocare in campo le trappole per il monitoraggio della mosca dell'olivo e nel caso di superamento della soglia, 4-5% per le olive da olio e le prime punture per le olive da tavola, si può ricorrere ad un intervento insetticida. Gli interventi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulticidi), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, *acetamiprid* o *lambda-cialotrina*, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupyradifurone*. Per la margaronia intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di accertato consistente attacco sulle piante adulte, utilizzando piretrine.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Catture di anarsia nelle trappole a feromoni.

Programma di Difesa:

Contro la cidia al superamento della soglia di intervento, che è di 10 catture per trappola a settimana, e contro l'anarsia, la cui soglia di intervento è di 7 catture per trappola a settimana o di 10 catture per trappola in due settimane, effettuare un intervento con le sostanze attive: *Bacillus thuringiensis*, *spinosad*, *emamectina*, *clorantraniliprole*, *acetamiprid*.

Si ricorda che le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della *confusione* o *disorientamento sessuale*.

In biologico per cidia e anarsia usare le seguenti sostanze attive: *Bacillus thuringiensis*, *spinosad* o *piretrine*.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Catture di tignoletta nelle trappole a feromoni. Presenza di mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Sono in atto le operazioni di raccolta.

Contro la tignoletta il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e della sostanza attiva impiegata oppure in base all'andamento delle ovideposizioni con specifici rilievi e/o modelli previsionali:

- insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
- regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
- *Bacillus thuringiensis*: 5-7 giorni dall'inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal primo trattamento.

Nei confronti del mal dell'esca si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale o di potarle separatamente da quelle sane.

Nei vigneti in cui non è ancora prevista la vendemmia, si raccomanda di prestare attenzione per una eventuale comparsa di muffa grigia e/o marciume del grappolo, in presenza di tali fitopatie intervenire effettuando un trattamento mirato ai grappoli, utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Invaiaura.

Situazione Fitosanitaria:

Catture di tignoletta nelle trappole a feromoni. Presenza di mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Contro la tignoletta il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e della sostanza attiva impiegata oppure in base all'andamento delle ovideposizioni con specifici rilievi e/o modelli previsionali:

- insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
- regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
- *Bacillus thuringiensis*: 5-7 giorni dall'inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal primo trattamento. Nei vigneti dove la raccolta è tardiva, occorre prevenire le infezioni di oidio con trattamenti di copertura, soprattutto dove negli anni precedenti si sono verificati attacchi consistenti, alternando le sostanze attive, a diverso meccanismo d'azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni).

Nei confronti del mal dell'esca si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale o di potarle separatamente da quelle sane.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Nuovi impianti - sviluppo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Per i nuovi impianti si raccomanda di impiegare materiale di propagazione sano e certificato.

CAVOLO



Situazione Fenologica:

Trapianto - sviluppo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di afidi.

Programma di Difesa:

Nelle zone dove sono stati riscontrati attacchi di elateridi negli anni precedenti è opportuno geodisinfestare con un prodotto a base di cipermetrina o lambdacialotrina.

In presenza di afidi intervenire alla comparsa delle infestazioni con: *deltametrina*, *lambdacialotrina*, *taufluvallinate*, *acetamiprid*.

POMODORO



Situazione Fenologica:

Maturazione (raccolta).

Situazione Fitosanitaria:

Catture di *Tuta absoluta* nelle trappole a feromoni e danni su foglie e frutto. Presenza di ragnetto rosso. Danni da nottue sulle bacche. Marciume apicale.

Programma di Difesa:

Per il controllo della tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*) si consiglia di impiegare trappole a feromoni per monitorare la presenza del parassita e di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie utilizzando *Bacillus thuringiensis*, *azadiractina*, *spinosad*, *emamectina*, *chlorantraniliprole*. Il trattamento va ripetuto due volte a distanza di 7-10 gg, alternando le sostanze attive disponibili per evitare fenomeni di resistenza. In biologico per il controllo della tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*) si consiglia di impiegare le seguenti sostanze attive: *Bacillus thuringiensis*, *azadiractina* e *spinosad*.

Per il controllo delle nottue si consiglia di impiegare le trappole a feromoni per una esatta indicazione della presenza degli adulti e nascita delle larve. Intervenire alla presenza delle prime larve con le seguenti sostanze attive: *cipermetrina*, *etofenprox*, *azadiractina*, *spinosad* gli ultimi due anche in biologico.

Per il ragnetto rosso utilizzare le seguenti sostanze attive: *acequinocyl*, *cyflumetofen*, *exitiazox*.

Per il biologico utilizzare *Phytoseiulus persimilis*;

- intervenire con la presenza 3- 4 acari per foglia;

- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale.

TERRITORIO GARGANO

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo dei frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Fumaggine. Presenza di aleurodide spinoso (*Aleurocanthus spiniferus*). Catture di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*). Ricontrata nelle trappole a feromone la cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*).

Programma di Difesa:

Si consiglia di effettuare opportune potature per eliminare le parti più attaccate da parassiti, avendo cura di garantire l'arieggiamento e l'illuminazione della chioma ed evitare eccessive concimazioni azotate. Nei confronti dell'*aleurodide spinoso* si consiglia di effettuare un trattamento con *olio minerale*, *sali potassici di acidi grassi* o *azadiractina* ammessi nel biologico, mentre nel convenzionale si consiglia l'utilizzo dell'*acetamiprid* o *flupiradifurone* o *cyantraniliprole* (quest'ultimo utilizzabile una sola volta ogni 3 anni). Si consiglia di installare in campo le trappole per il monitoraggio della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*) e di porre particolare attenzione al controllo di questo parassita. In caso di accertata presenza attraverso il monitoraggio attuato con le trappole, intervenire tempestivamente adottando una strategia di difesa basata su sistemi "*Attract and Kill*" oppure mediante l'impiego di esche proteiche attivate con *spinosad* o con un'altra sostanza attiva autorizzata. Per il controllo della cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), si consiglia di intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale*, *olio essenziale di arancio dolce* e *sali potassici di acidi grassi* (sostanze ammesse anche in agricoltura biologica), *acetamiprid*, *pyriproxyfen* e altri prodotti autorizzati.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Ingrossamento frutto - invaiatura.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di rogna. Presenze di punture di ovodeposizione da parte della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*).

Programma di Difesa:

Si consiglia di installare le trappole a feromone per la mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). Nella zona costiera del Gargano si ravvisano catture di adulti nelle trappole a feromone, con contestuale punture di ovodeposizione nelle olive anche se la stessa si attesta dal 2% al 7%. Date le condizioni meteo, con temperature elevate, si consiglia di tenere sotto controllo la popolazione sia dal punto di vista del numero di catture nelle trappole sia delle punture di ovodeposizione ricordando di intervenire al raggiungimento della soglia del 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve di prima età). Gli interventi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulterici), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, *acetamiprid* o *lambda-cialotrina*, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupiradifurone*.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di infezioni pregresse blande di peronospora e oidio.

Programma di Difesa:

Nei confronti dell'oidio (*Uncinola necator*) prestare attenzione alle foglie e ai tralci che presentano sintomi della malattia soprattutto se nell'anno precedente sono state rilevate infezioni; questo al fine di prevenire la proliferazione del micelio svernante sulle gemme. Si consiglia l'osservazione continua dei grappoli per individuare ovodeposizioni da parte della tignola e della tignoletta dell'uva che causano l'insorgere della muffa grigia (*Botritis cinerea*) e della presenza in concomitanza della mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) e dei moscerini della frutta (*Drosophila melanogaster*).

Nei vigneti in cui non è ancora prevista la vendemmia, si raccomanda di prestare attenzione per una eventuale comparsa di muffa grigia e/o marciume del grappolo, in presenza di tali fitopatie intervenire effettuando un trattamento mirato ai grappoli, utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

FITOPATOLOGIA

BRINDISI

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti.
Inizio invaiatura impianti in sofferenza da stress idrico.

Situazione Fitosanitaria:

Poche catture, punture fertili di mosca (*Bactrocera oleae*) ma solo in alcuni contesti ad alta suscettibilità, su cv sensibili, in irriguo e generalmente al disotto delle soglie di intervento. Cascola a causa della *Lasioptera berlesiana*, predatore delle mosca che, vivendo in simbiosi con un fungo (*Camarosporium dalmaticum*), infetta le drupe facendole cadere. Purtroppo questo antagonista della mosca, pur nel nobile intento di eliminare le uova, determina un vero e proprio danno. La cascola, comunque, è limitata alle poche situazioni di infestazioni con punture fertili o di solo assaggio. Lo stress idrico e le alte temperature registrate nelle ultime settimane rappresentano comunque condizioni di ostacolo allo sviluppo delle infestazioni. Presenza di rosure di margaronia (*Palpita unionalis*) soprattutto su piante giovani o piante potate.

Programma di Difesa:

L'assenza di piogge le temperature piuttosto elevate, continua ad essere di ostacolo allo sviluppo delle infestazioni di mosca. Premesso ciò è consigliabile, comunque, tenere sotto controllo le trappole a feromoni al fine di monitorare la presenza di mosca, in quanto minimi cambiamenti dei parametri climatici possono modificare sostanzialmente la situazione. Considerato che non c'è alcuna correlazione tra numero delle catture e reale infestazione in campo, si suggerisce sempre di effettuare osservazioni visive nell'oliveto e opportuni campionamenti per verificare la reale presenza del parassita e del suo eventuale grado di infestazione (punture fertili), soprattutto in presenza di cv suscettibili a drupa grossa ed irrigate come *Leccino Coratina*, *Picholine*, *Lecciana* ecc. Vista la scarsa disponibilità di sostanze attive ed i loro limiti di utilizzo, per combattere questo parassita si consiglia di predisporre per tempo una strategia di controllo integrata intervenendo in modo efficiente ed efficace. Pertanto sarebbe utile, indipendentemente dalla presenza o meno del parassita, di intervenire subito con prodotti repellenti a base di *silicato di magnesio*, *caolino*, *zeolite* ecc. il cui scopo è quello di rendere le drupe inadatte alle deposizioni delle uova. Limitare il trattamento chimico ai casi in cui, nonostante ciò, le infestazioni iniziano ad avvicinarsi alle soglie di intervento (4-5% di punture fertili per le olive olio e la sola presenza delle prime punture invece per olive da tavola). Ricordarsi che non tutte le sostanze attive hanno una grande capacità di penetrare nella polpa tanto da poter eliminare le larve all'interno dell'olivina, specie per quelle che hanno superato la 2^a età. I trattamenti devono essere effettuati con dosaggi corretti. Normalmente servono 10/12 q.li di acqua per ettaro utilizzando pompe a volume normale; in questo caso fare riferimento al dosaggio per ettolitro riportato in etichetta. Se, invece si utilizzano pompe a volume ridotto (atomizzatori a ventole, cannoni ecc.) che utilizzano minori volumi di acqua, il quantitativo di prodotto fitosanitario deve essere sempre riferito al dosaggio per ettaro. Su impianti in allevamento e su innesti monitorare la presenza di margaronia (*Palpita unionalis*) o attraverso l'uso di trappole a feromoni oppure osservando direttamente eventuali sintomi sulla vegetazione apicale. Intervenire tempestivamente con prodotti registrati, preferibilmente nelle ore serali, al riscontro dei primissimi sintomi della presenza del parassita, soprattutto su innesti e impianti giovani in fase di allevamento o su piante potate nel corso di questa annata su cui la vegetazione è sicuramente molto lussureggiante. Proteggere preventivamente gli innesti e le piante in fase di allevamento oltre che dalla margaronia anche dall'oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*) applicando al disotto delle chioma, compresi eventuali paletti tutori, fasce in resinato acrilico.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa : \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Invaiaura-maturazione cv tardive.

Situazione Fitosanitaria:

Tignole: *Cidia molesta* e *Anarsia lineatella*. Mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*).

Programma di Difesa:

Sulle cultivar tardive continuare a controllare il volo delle tignole *Cydia molesta* e *Anarsia lineatella* e, in caso di catture superiori a 10 per settimana, intervenire utilizzando prodotti fitosanitari a base di acetamiprid, spinosad, emamectina benzoato, etofenprox ecc.

In caso di forti infestazioni di mosca della frutta (*Ceratitis capitata*), intervenire già dalla fase di invaiatura con prodotti registrati assicurando una buona bagnatura della chioma e rispettando rigorosamente il periodo di carenza dei prodotti adoperati. Su alcune cultivar, soprattutto percoche, è possibile riscontrare infezioni di mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*) sulle foglie più giovani. In caso di infezioni consistenti intervenire con prodotti a base di bicarbonato di potassio, olio essenziale di arancio, zolfo, bupirimate, penconazole, tryfloxistrobin, boscalid e cyflufenamid ecc.

In prossimità della raccolta intervenire solo se si è sufficientemente sicuri che si possa rispettare il periodo di carenza degli insetticidi da impiegare, e se il trattamento possa essere effettivamente sostenibile ed in grado di garantire la salvaguardia della produzione.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Per alcune varietà è iniziata la raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di infezioni pregresse di peronospora e oidio. Si osservano variazioni cromatiche delle foglie dovute alla presenza di cicalina africana (*Jacobiasca lybica*) ma in minor misura rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In alcuni appezzamenti si notano delle mortificazioni della vegetazione, ed in alcuni casi anche delle vere e proprie filloptosi delle foglie.

Il fenomeno è stato osservato da alcune settimane e si sta procedendo ad ulteriori approfondimenti diagnostici per accertarne l'agente causale.

Programma di Difesa:

Data la fase fenologica e le condizioni meteorologiche, non si consiglia alcun trattamento anticrittogamico specifico. Invece, sulle barbatelle in fase di allevamento, considerato che sono presenti adulti di cicaline, compresa quella africana (*Jacobiasca lybica*) che provoca l'arrossamento anticipato delle foglie, per quanto possibile, si suggerisce di mantenere la protezione della vegetazione con prodotti insetticidi come, ad esempio, acetamiprid, cyantraniliprole, azadiractina ecc. Il trattamento risulta tanto più efficace quanto più esso è effettuato in maniera simultanea e comprensoriale e particolarmente necessario su barbatelle giovani in fase di allevamento.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Trapianto.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nella scelta dei materiali di propagazione (*ovoli, zampette*) accertarsi preventivamente della loro sanità e della provenienza da impianti in cui nella scorsa annata non vi erano problemi fitosanitari da *Verticillium d.*, *Sclerotinie* ed altri patogeni tellurici di difficile controllo in campo. Stessa raccomandazione vale anche per la scelta degli appezzamenti da mettere a coltura: effettuare una idonea rotazione e avvicendamento colturale onde evitare il selezionarsi di parassiti (*patogeni ed erbe infestanti*) che possono diventare resistenti e difficili da controllare. Nei campi più sviluppati possono essere presenti infestazioni di afidi le quali vanno controllate con interventi tempestivi, possibilmente, anche in forma localizzata.

POMODORO



Situazione Fenologica:

Maturazione- raccolta.

Situazione Fitosanitaria:

Catture di tignola (*Tuta absoluta*) e di nottue (*Helicoverpa armigera*): presenza generalizzata di virosi su cv a bacca lunga.

Programma di Difesa:

Considerata la fase di raccolta e fine ciclo delle colture **non si consigliano trattamenti**. Solo su impianti tardivi ove vi sia la presenza di tignola (*Tuta absoluta*) e/o di nottue (*Helicoverpa armigera*) accertata con l'utilizzo delle trappole a feromoni, solo negli appezzamenti lontani dalla raccolta, si consiglia di intervenire con prodotti specifici e registrati che possono combattere ambedue le specie parassitarie: *metaflumizone*, *emamectina benzoato*, *spinosad*, *etofenprox* ecc.

Le alte temperature e le basse umidità possono favorire l'insorgenza di infestazioni di raghetto rosso (*Tetranychus urticae*) contro cui bisogna intervenire ai primi sintomi di infestazione con prodotti a base di *olio minerale*, *maltodestrine*, *sali potassici di acidi grassi*, *exitiazox*, *cyflumetofen*, *tebufenpirad* ecc. curando una buona bagnatura della vegetazione.

Ogni trattamento è giustificato solo se si è in grado di rispettare in maniera assoluta il periodo di sicurezza dei vari formulati utilizzati e se lo stesso trattamento, effettuato in prossimità della raccolta, garantisce l'effettiva e sostenibile salvaguarda della produzione.

FITOPATOLOGIA

LECCE

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo dei frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Riscontrata nelle trappole a feromoni la presenza di cotonello (*Planococcus citri*), cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*) e sporadiche catture di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*). Sporadica presenza di ragnetto rosso (*Tetranychus urticae* - *Panonychus citri*) e minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*).

Programma di Difesa:

Contro il cotonello (*Planococcus citri*) intervenire chimicamente solo al raggiungimento della soglia di intervento del 5% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale bianco*, *acetamiprid* o altri prodotti autorizzati.

Per il controllo della cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), si consiglia di intervenire al superamento della soglia di intervento del 20% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale*, *olio essenziale di arancio dolce* e *sali potassici di acidi grassi* (sostanze ammesse anche in agricoltura biologica), *acetamiprid*, *pyriproxyfen* e altri prodotti autorizzati.

Prestare particolare attenzione alla mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*). In caso di accertata presenza attraverso il monitoraggio con trappole, intervenire tempestivamente adottando una strategia di difesa basata su sistemi "*Attract and Kill*" oppure mediante l'impiego di esche proteiche attivate con *spinosad* o con altro principio attivo autorizzato.

In presenza di ragnetto rosso, intervenire:

- per *Tetranychus urticae*, al superamento della soglia del 10% di foglie infestate da forme mobili e del 2% di frutti infestati;
- per *Panonychus citri*, al superamento del 30% di foglie infestate oppure in presenza di 3 acari per foglia. Per il controllo di questi fitofagi possono essere impiegati prodotti a base di *olio minerale*, *acequinocyl* e altri prodotti autorizzati.

Si consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta e di verificare sempre le autorizzazioni d'impiego vigenti.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Ingrossamento drupe.

Situazione Fitosanitaria:

Nelle trappole di monitoraggio sono state rilevate sporadiche catture di adulti di mosca (*Bactrocera oleae*). Presenza di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*) e cercosporiosi (*Cercospora cladosporioides*) e margaronia (*Palpita unionalis*).

Programma di Difesa:

Le temperature elevate, superiori alle medie stagionali, stanno ostacolando lo sviluppo delle infestazioni attive di mosca (*Bactrocera oleae*). Nei casi di accertata presenza dell'infestazione attiva dell'insetto, si consiglia di intervenire con prodotti a base di *acetamiprid* o *flupyradifurone* (utilizzabile una sola volta durante l'anno sulla coltura), attenendosi al raggiungimento della soglia d'intervento:

- per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture;
- per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve). In considerazione della presenza dell'insetto, è possibile intervenire con trattamenti preventivi adulticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato (*deltametrina*, *lambda-cialotrina*, *acetamiprid*, *cyantraniliprole* o *spinosad* ed eventualmente innescate con un feromone oppure, in alternativa, è possibile applicare sistemi di tipo *Attract and Kill* oppure installare trappole per la cattura massale. Inoltre si possono utilizzare caolino o zeolite, per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione, il trattamento è utile anche per proteggere la pianta dai danni causati dall'eccessiva insolazione. Nei giovani impianti, per il controllo dell'oziorrinco, raccomandiamo l'applicazione preventiva, al tronco delle piante e ai tutori, delle fasce di fibra acrilica al fine di impedire all'insetto la risalita notturna sulla pianta. Per il contenimento del rodilegno giallo si possono utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale o impiegare il metodo della confusione sessuale.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa : \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di vecchie infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) e oidio (*Uncinula necator*).

Si riscontrano nelle trappole catture di tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*) e isolate catture di tignoletta dell'uva (*Lobesia botrana*).

Riscontrata la presenza di cicaline. La sintomatologia prodotta dalle infestazioni di *Jacobiasca lybica*, in particolare, si distingue per la comparsa sulle foglie di ingiallimenti e necrosi del margine nei vigneti a bacca bianca, invece dall'arrossamento che porta al conseguente disseccamento e la caduta delle foglie nei vigneti a bacca nera.

Programma di Difesa:

Nei vigneti in cui non è ancora prevista la vendemmia, si raccomanda di prestare attenzione per una eventuale comparsa di muffa grigia e/o marciume del grappolo, in presenza di tali fitopatie intervenire effettuando un trattamento mirato ai grappoli, utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

Durante le osservazioni in campo, prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di cicaline. Qualora se ne riscontri la presenza, si consiglia di intervenire con prodotti a base di *olio essenziale di arancio dolce*, *sali potassici degli acidi grassi*, *piretrine*, *azadiractina*, *etofenprox*, *acetamiprid* o altri principi attivi autorizzati, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e del limite massimo di tre trattamenti.

Si raccomanda di garantire una bagnatura uniforme della vegetazione, di alternare i principi attivi al fine di ridurre il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza e di rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta per i prodotti fitosanitari impiegati, prestando particolare attenzione ai tempi di carenza.

MELOGRANO

**Situazione Fenologica:**

Crescita dei frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Riscontrata nelle trappole la presenza di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).

Programma di Difesa:

Con lo scopo di proteggere la pianta dalle scottature solari è possibile effettuare un trattamento a base di *polvere di roccia*; la stessa esplica un'azione protettiva, ostacolando l'inoculo e di conseguenza la proliferazione di funghi e batteri.

FITOPATOLOGIA

TARANTO

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*);
cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*);
cotonello (*Planococcus citri*);
minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*);
ragnetti rossi (*Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*);
Formiche (*Linepithema humile*, *Camponotus nylanderii*, *Tapinoma erraticum*).

Programma di Difesa:

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): riscontrate catture nelle trappole per il monitoraggio, è utile programmare la strategia di difesa con sistemi tipo "Attract and Kill" (trappole con esche avvelenate da posizionare in campo) o trattare la vegetazione con esche costituite da sostanze attrattive specifiche attivate con spinosad o con insetticidi tradizionali purché ammessi. Prestare molta attenzione alle varietà precocissime (es. *Mjiagawa*) nella fase fenologica di suscettibilità dei frutti (invasatura e affinamento della buccia).

Cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*): nei campi monitorati non si riscontrano nuove catture di adulti, laddove il parassita è presente e nelle annate precedenti si sono riscontrati attacchi sui frutti, sarà opportuno intervenire con prodotti a base di *olio minerale estivo* + *azadiractina*. Considerate le alte temperature è sempre consigliabile intervenire nelle ore più fresche. Cotonello (*Planococcus citri*): riscontrate catture nelle trappole. Monitorare anche i frutti osservando il movimento delle neanidi che migreranno dalla rosetta verso l'ombelico. Al superamento della soglia del 5% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base *olio minerale estivo* + *azadiractina*. Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*): occorre ricordare che può determinare danni rilevanti su giovani impianti in allevamento. Quindi, è bene seguire l'andamento con maggiore attenzione per intervenire, se necessario, con prodotti specifici in modo che non venga compromesso lo sviluppo vegetativo. Poiché è necessario ripetere periodicamente il trattamento, è importante alternare le sostanze attive ammesse (*olio minerale azadiractina*, *acetamiprid*, *cyantraniliprole*, *clorantpriliprole*, *emamectina*, *milbectina*) per evitare l'insorgenza di forme di resistenza. In generale, adottando opportune tecniche agronomiche, non eccedendo con le concimazioni azotate e somministrando la giusta quantità di acqua durante l'irrigazione, si contribuisce a contenere il rigoglio vegetativo riducendo gli attacchi di insetti quali afidi, cocciniglie, mosche bianche e la stessa minatrice, che si avvantaggiano soprattutto della maggiore disponibilità di azoto solubile.

Ragnetti rossi (*Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*): le perduranti condizioni di forte caldo secco favoriscono i ragnetti, anche perché deprimono l'entomofauna utile. Si consiglia di osservare il proprio campo per individuare i primi attacchi e, al superamento della soglia del 10% di foglie infestate, programmare un intervento scegliendo tra i diversi acaricidi disponibili (*fenpyroximate*, *pyridaben*, *extiazox*, *tebufenpirad*, *milbemectina*, *cyflumetofen*, *acequinocil*).

Formiche (*Linepithema humile*, *Camponotus nylanderii*, *Tapinoma erraticum*): Per contrastare le infestazioni di insetti produttori di melata (afidi, cocciniglie e mosche bianche), è fondamentale monitorare e ostacolare la presenza delle formiche, che proteggono questi parassiti dai nemici naturali in cambio del nutrimento zuccherino. Le formiche sono disturbate da lavorazioni del terreno mentre un'azione diretta è data da fasce biadesive intorno al tronco principale, a circa 30-50 cm da terra. In alternativa, se la corteccia è molto rugosa, applicare direttamente sul tronco una colla entomologica per creare una barriera invalicabile. Altri interventi agronomici che contribuiscono a ridurre la risalita delle formiche sono il taglio dei rami che toccano sul terreno e il taglio dell'erba alta che va a contatto con la chioma degli alberi.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*); margaronia (*Palpita unionalis*); oziorrinco (*Otiiorhynchus cribricollis*).

Programma di Difesa:

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): proseguire il monitoraggio mediante le trappole a feromoni e, alle prime catture, eseguire i campionamenti sulle drupe. Le elevate temperature hanno limitato l'attività del fitofago soprattutto negli oliveti in asciutta ma eventuali precipitazioni potrebbero favorirne la ripresa. Al momento non si giustificano interventi fitosanitari. Chi ha optato per sistemi "Attract and kill" a lunga durata (3-4 mesi) potrà posizionare i supporti attrattivi alle prime catture delle trappole spia.

Margaronia (*Palpita unionalis*): intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e, solo a seguito di accertato e consistente attacco, intervenire anche sulle piante adulte con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* o *cyantraniliprole*.

Oziorrinco (*Otiiorhynchus cribricollis*): su piante giovani, si consiglia di installare sui tronchi, compresi i paletti tutori, delle fasce di resinato acrilico le quali hanno lo scopo di intrappolare gli adulti del parassita quando questi risalgono dal terreno verso la chioma.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa : \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*); tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*); cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*); cicalina africana (*Jacobiasca lybica*); mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*).

Programma di Difesa:

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): si riscontrano catture disomogenee anche in punti di osservazione a breve distanza. La terza generazione si è completata e si è in attesa della quarta, che potrebbe interessare solo le varietà più tardive. In generale, non si prevedono trattamenti.

Tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*): non si segnalano catture di questo insetto nei campi monitorati. Si ricorda che i trattamenti per il controllo della 'tignoletta della vite' sono efficaci anche sulla 'tignola rigata' sebbene le due specie non hanno dei cicli esattamente coincidenti. Nei vigneti in cui si utilizza la confusione sessuale per la 'tignoletta della vite' (*Lobesia botrana*) è consigliabile posizionare le trappole sessuali per la 'tignola rigata' (*Cryptoblabes gnidiella*) in modo da seguirne il volo e valutare eventuali trattamenti insetticidi.

Cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*): presente in qualche campo di osservazione del territorio e in particolare laddove il vigneto è coperto con teli plastici creando un ambiente molto più umido. In questo periodo, nei vigneti infestati, sono presenti tutti i suoi stadi. Gli individui concentrati soprattutto sotto la corteccia migrano verso le foglie e i grappoli. Contro questo insetto, oltre alla confusione sessuale, è possibile il controllo biologico con insetti come *Cryptolaemus montrouzieri* o *Anagyrus pseudococchi*.

Cicalina africana (*Jacobiasca lybica*): potrebbe essere presente in qualche campo. Le punture di alimentazione di questo insetto provocano una significativa riduzione dell'attività fotosintetica delle foglie le quali si presentano arrossate e, talvolta, anche parzialmente necrotizzate. Pertanto, se presente, si consiglia di effettuare interventi specifici.

Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*); si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale. Siamo in prossimità della raccolta. Per le varietà da raccogliere a settembre non si consigliano interventi.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) ;
tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*);
cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*);
cicalina africana (*Jacobiasca lybica*);
mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*).

Programma di Difesa:

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): si riscontrano catture disomogenee anche in punti di osservazione a breve distanza. La terza generazione si è completata e si è in attesa della quarta, che potrebbe interessare solo le varietà più tardive. In generale, non si prevedono trattamenti.

Tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*): non si segnalano catture di questo insetto nei campi monitorati. Si ricorda che i trattamenti per il controllo della 'tignoletta della vite' sono efficaci anche sulla 'tignola rigata' sebbene le due specie non hanno dei cicli esattamente coincidenti. Nei vigneti in cui si utilizza la confusione sessuale per la 'tignoletta della vite' (*Lobesia botrana*) è consigliabile posizionare le trappole sessuali per la 'tignola rigata' (*Cryptoblabes gnidiella*) in modo da seguirne il volo e valutare eventuali trattamenti insetticidi.

Cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*): presente in qualche campo di osservazione del territorio e in particolare laddove il vigneto è coperto con teli plastici creando un ambiente molto più umido. In questo periodo, nei vigneti infestati, sono presenti tutti i suoi stadi. Gli individui concentrati soprattutto sotto la corteccia migrano verso le foglie e i grappoli. Contro questo insetto, oltre alla confusione sessuale, è possibile il controllo biologico con insetti come *Cryptolaemus montruzieri* o *Anagrus pseudococci*.

Cicalina africana (*Jacobiasca lybica*): potrebbe essere presente in qualche campo. Le punture di alimentazione di questo insetto provocano una significativa riduzione dell'attività fotosintetica delle foglie le quali si presentano arrossate e, talvolta, anche parzialmente necrotizzate. Pertanto, se presente, si consiglia di effettuare interventi specifici.

Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*); si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale o di potarle separatamente da quelle sane. Siamo in prossimità della raccolta. Per le varietà da raccogliere a settembre non si consigliano interventi.

MELOGRANO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

INFORMAZIONI SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO

Nel marzo 1985 è stato avviato il primo **Piano Agrometeorologico Regionale** nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Il Piano, così come avvenuto nelle successive fasi, ha avuto come principale obiettivo la costituzione e la gestione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico-agronomiche finalizzate al mondo agricolo.

Le principali realizzazioni del Servizio Agrometeorologico riguardano:

- la Rete Agrometeorologica Regionale composta da 94 stazioni di rilevamento dati meteorologici e agrometeorologici, completamente automatiche e in tempo reale;
- la Rete dei Campi di osservazioni Agrofenologiche e Fitopatologiche;
- la Banca Dati Agrometeorologica Regionale costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (SIAN) , i dati storici dell'ex UCEA, oggi C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico oggi Regione Puglia, Settore Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico e dell'Aeronautica Militare a partire dal 1951 fino all'anno corrente, da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazioni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale, e da una componente agrofenologiche e fitopatologica;
- i Prodotti Agro-Climatologici (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro-climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, piani di concimazione, modelli previsionali sviluppo patogeni, pianificazione del territorio, ecc.);
- il Notiziario Agrometeorologico e Fitosanitario settimanale con previsioni fino a 7 giorni;
- il Bollettino Meteorologico giornaliero Regionale con previsioni fino a 7 giorni;

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO REGIONALE

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle previsioni del tempo consultare il sito www.arifpuglia.it (Sezione Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario).

Registrandosi al suddetto sito è possibile usufruire di diversi servizi utili per la pianificazione delle attività delle aziende agricole e consultare i dati di monitoraggio sia di tipo agrometeorologico che agrofienologico, nonché acquisire consigli utili alla difesa fitosanitaria integrata.



REGIONE PUGLIA SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO REGIONALE ARIF PUGLIA

Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari)

DIREZIONE GENERALE
Legale Rappresentante Direttore Generale:
Dott. Agr. Francesco Ferraro

Dirigente della Sezione Fitosanitaria:
Dott. Agr. Michele Tenore

www.arifpuglia.it
PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO REGIONALE

SU INFORMAZIONI: Rete Agrometeorologica Regionale - Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - Servizio Informativo Agricolo Nazionale.

Realizzato in proprio

La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni è **vietata a termini di legge**. È consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.