



Bilancio Fitosanitario

Olivo

2024 - 2025



Regione : MARCHE

Servizio Agrometeorologico Regionale-AMAP

Relatore: Alesi Alberto

Superficie coltivata

Regione: Marche	ha		Trend
	2024	2025	
Olivo	9020	8985	In leggero calo
di cui Olivo in Biologico	4520	In Corso di definizione	In leggero aumento

Fonte Regione Marche

Destinazione d'uso delle olive prodotte:
Quasi totalmente Olio, con la nicchia delle olive Ascolane da mensa

Presenti: olio DOP "Cartoceto", DOP "Oliva Ascolana del Piceno" e olio IGP "Marche"

27 novembre 2025

Olivo

♦ olio prodotto: il **2024** lo si può considerare un anno record per la produzione di olio nelle Marche, secondo i dati SIAN, le olive molite sono state 36.306 tonnellate con una produzione di 3.905 tonnellate di olio, con una resa piuttosto bassa, poco superiore al 10%

Il 2025 invece, ad oggi, sempre secondo dati SIAN, vede una produzione ed una quantità di olive molite pari a 9.046 tonnellate e una produzione di olio di 1.157 tonnellate, con una resa di circa del 12.8%.

anno	Tonnellate olive	Tonnellate olio	Resa %
2025	9.046	1157	10
2024	36.303	3.905	12.8
2023	10.650	1.325	12.8
2022	21.871	2.936	13.4
2021	26.156	3.352	12.4

♦ varietà maggiormente coltivate: nelle Marche le varietà maggiormente coltivate sono: Leccino, Frantoio, Piantone di Mogliano, ma sono presenti ben 23 varietà tipiche iscritte al Repertorio Regionale (L.R. 12/2003 - Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano)

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Ascolana dura | 13 Piantone di Falerone |
| 2 Ascolana tenera | 14 Piantone di Mogliano |
| 3 Capolga | 15 Raggia |
| 4 Carboncella | 16 Raggiola |
| 5 Cornetta | 17 Rosciola Colli Esini |
| 6 Coroncina | 18 Sargano di Fermo |
| 7 Lea | 19 Sargano di S. Benedetto |
| 8 Mignola | 20 Carbò |
| 9 Nebbia del Menocchia | 21 Zampello |
| 10 Nostrale di Rigali | 22 Sarganella |
| 11 Oliva grossa | 113 Mignolone |
| 12 Orbetana | |



◆ sistema di allevamento prevalente: Vaso, Vaso Policonico, sono in aumento gli impianti con sistema semintensivo o superintensivo

Sul territorio Marchigiano la Prevalenza è di olivi secolari o comunque ultra trentennali



Servizi AMAP



Servizi

 Agrometeorologia

 Analisi di laboratorio

 Analisi sensoriale

 Attività formative

 Fitosanitario

 Vivai Forestali

 Servizi per la Tartuficoltura

 Rintracciabilità delle produzioni

Analisi di laboratorio

 Consultazione risultati online

Fitosanitario

 Iscrizione e aggiornamento RUOP

 Passaporto delle piante

 Importazioni di piante e prodotti vegetali

 Certificazione fitosanitaria per l'esportazione

 Certificazione fitosanitaria elettronica

 Emergenze Fitosanitarie

Servizio Agrometeorologico AMAP



Servizio Agrometeo della Regione Marche

<https://meteo.regione.marche.it/>

Assistenza e Informazione specialistica alle imprese agricole marchigiane e ai consulenti del settore

Supporto agli organi di programmazione, pianificazione e gestione del territorio.

Raccolta ed elaborazione dei dati agro-meteorologici della Regione Marche.

Le reti di monitoraggio

Fitopatologia

Stazioni meteorologiche

Fenologia

Maturazione olivo

<https://meteo.regione.marche.it/Monitoraggi>

Servizi AMAP



In sintesi l'attività di monitoraggio ambientale e di elaborazione delle informazioni di supporto alle scelte aziendali può essere così schematizzata:




REGIONE MARCHE
AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

**LINEE GUIDA
PER LA PRODUZIONE INTEGRATA
DELLE COLTURE:
DIFESA FITOSANITARIA
E CONTROLLO DELLE INFESTANTI**


Monitoraggio fenologico



Monitoraggio fitopatologico




Modelli previsionali



Elaborazione Dati

Informazioni di Supporto alle scelte aziendali

Monitoraggio meteorologico



AGROMETEOROLOGICO
Notiziario
di PRODUZIONE INTEGRATA

**Notiziari settimanali, a
carattere provinciale**

Precipitazione. Il 2024 è stato appena meno piovoso rispetto alla norma


Il 2024 è risultato meno piovoso della norma, anche se di poco. Il suo valore medio regionale di 801mm corrisponde ad un ammanco di circa il 6% rispetto al totale medio del 1991-2020.

Inverno (dicembre 2023 - febbraio 2024) L'inverno è stato decisamente poco piovoso sia come totale di precipitazione sia come numero di giorni di pioggia. Il totale medio complessivo di precipitazione rilevata sul territorio regionale è stato di soli 98mm corrispondente ad un -52% rispetto alla media 1991-2020; il numero di giorni di pioggia è stato in media pari a 14, in flessione di -11 rispetto al 1991-2020.

Primavera (marzo 2024 - maggio 2024) Primavera meno piovosa della norma con un deficit del 12% rispetto al 1991-2020; il totale medio regionale di pioggia caduta è stato di 193mm. A differenza di marzo, mese piovoso come la media, gli altri due mesi sono stati più secchi del normale, specie aprile che con un totale medio di 54mm segna un ammanco del 29%. Interessante osservare che, nonostante il deficit di mm, in complesso è piovuto cinque giorni in più.

Estate (giugno 2024 - agosto 2024) Estate meno piovosa della norma con un deficit del 37% rispetto al 1991-2020; il totale medio regionale di pioggia caduta è stato di 98mm. Tutti e tre i mesi sono stati più secchi del normale, specie luglio che, con un totale medio di 15mm, segna un ammanco del 65%. Anche il numero di giorni di pioggia è stato inferiore alla media

Autunno (settembre 2024 - novembre 2024) Autunno più piovoso della norma con un surplus del 24% rispetto al 1991-2020; il totale medio regionale di pioggia caduta è stato di 328mm. Due mesi su tre sono stati più piovosi del normale



Mese	Precipitazione (mm)	Storico 1991-2020 (mm)	Anomalia (mm)
Gen. 2024	45	56	-11
Feb. 2024	27	60	-33
Mar. 2024	75	74	1
Apr. 2024	53	75	-22
Mag. 2024	63	72	-9
Giu. 2024	47	61	-14
Lug. 2024	15	42	-27
Ago. 2024	34	49	-15
Set. 2024	170	83	87
Ott. 2024	119	80	39
Nov. 2024	36	100	-64
Dic. 2024	108	85	23

Tabella 2. Precipitazione media mensile (mm) anno 2024, storico e anomalia rispetto allo storico. (Fonte: AMAP Regione Marche – Servizio Agrometeorologico Regionale)


il 2024 è stato il più caldo dal 1800 (anno di inizio della serie storica) con una temperatura media superiore di 1.35°C rispetto alla media storica di riferimento. È stato così battuto il precedente record che apparteneva al 2023.

Inverno (dicembre 2023 - febbraio 2024) Quello del 2024 è stato di gran lunga l'inverno più caldo per le Marche. Il valore medio regionale della temperatura, pari a 8.5°C . Eccezionalmente elevato è stato lo scarto rispetto alla media di riferimento 1991-2020: $+2.8^{\circ}\text{C}$. Con il 2024 siamo giunti al quinto inverno consecutivo più caldo del normale.

Primavera (marzo 2024 - maggio 2024) Nonostante la discesa dei valori termici di maggio, la primavera 2024 è risultata essere la più calda per le Marche dal 1961. La temperatura media stagionale è stata di 14°C corrispondente ad un'anomalia di $+1.4^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020.

Estate (giugno 2024 - agosto 2024) L'estate 2024 è risultata essere la seconda più calda per le Marche dal 1961 a pari merito con quella del 2012 e quella del 2017. La temperatura media stagionale è stata di 24.9°C corrispondente ad un'anomalia di $+2.1^{\circ}\text{C}$. L'esito è scaturito dalle temperature molto miti che hanno caratterizzato i mesi di luglio e agosto: 26.2°C di media per luglio, $+2.5^{\circ}\text{C}$ rispetto al trentennio di riferimento; 26°C per agosto, $+2.4^{\circ}\text{C}$ di anomalia rispetto al trentennio di riferimento.


Autunno (settembre 2024 - novembre 2024) L'autunno 2024 è stato mediamente più caldo della norma. La temperatura media stagionale è stata di 15.3°C corrispondente ad un'anomalia di $+0.9^{\circ}\text{C}$.



Mese	Temperatura media (°C)	Storico 1991-2020 (°C)	Anomalia (°C)
Gen. 2024	7.1	5.2	1.9
Feb. 2024	9.4	5.9	3.5
Mar. 2024	11.3	9.0	2.3
Apr. 2024	13.7	12.2	1.5
Mag. 2024	17.1	16.7	0.4
Giu. 2024	22.5	21.1	1.4
Lug. 2024	26.2	23.7	2.5
Ago. 2024	26.0	23.6	2.4
Set. 2024	19.5	18.8	0.7
Ott. 2024	16.4	14.5	1.9
Nov. 2024	9.9	9.9	0.0
Dic. 2024	6.3	6.1	0.2

Tabella 1. Temperatura media mensile (°C) anno 2024, storico e anomalia rispetto allo storico. (Fonte: AMAP Regione Marche – Servizio Agrometeorologico Regionale)

Per le Marche il 2024 è stato un anno estremamente caldo e la temperatura media ha uguagliato il precedente record del 2023. La temperatura media annua è stata infatti di 15.4°C, superiore di ben 1.5°C rispetto al valore del trentennio di riferimento 1991-2020; questo significa che il 2024 si conferma l'anno più caldo per le Marche dal 1961 alla pari col 2023



Il 2024 in pillole

Parametro	Descrizione
<i>Temperatura media</i>	15.4°C, +1.5°C rispetto al 1991-2020; <i>valore record per le Marche dal 1961 alla pari col 2023</i> .
<i>Temperatura media stagionale</i>	Inverno: 8.5°C, +2.8°C rispetto al 1991-2020, <i>il più caldo per le Marche dal 1961</i> . Primavera: 14°C, +1.4°C rispetto al 1991-2020, <i>la più calda per le Marche dal 1961 a pari merito con quella del 2007</i> . Estate: 24.9°C, +2.1°C rispetto al 1991-2020, <i>la seconda più calda per le Marche dal 1961 a pari merito con quella del 2012 e quella del 2017</i> . Autunno: 15.3°C, +0.9°C rispetto al 1991-2020.
<i>Temperatura media mensile (mese più freddo e più caldo del 2024 rispetto al 1991-2020)</i>	Novembre: 9.9°C, in linea con il 1991-2020. Febbraio: 9.4°C, +3.5°C rispetto al 1991-2020, <i>il più caldo per le Marche dal 1961</i> .
<i>Precipitazione totale</i>	801mm, -6% rispetto al 1991-2020.
<i>Precipitazione totale stagionale</i>	Inverno: 98mm, -52% rispetto al 1991-2020, <i>settimo inverno meno piovoso per le Marche dal 1961</i> . Primavera: 193mm, -12% rispetto al 1991-2020. Estate: 98mm, -37% rispetto al 1991-2020. Autunno: 328mm, +24% rispetto al 1991-2020.
<i>Precipitazione totale mensile (mese più piovoso e meno piovoso del 2024 rispetto al 1991-2020)</i>	Settembre: 170mm, +105% rispetto al 1991-2020, <i>il terzo settembre più piovoso per le Marche dal 1961</i> . Novembre: 36mm, -64% rispetto al 1991-2020, <i>il quinto novembre meno piovoso per le Marche dal 1961 a pari merito col 2002</i> .
<i>La precipitazione giornaliera più intensa</i>	Camerano, 18 settembre: 154mm.
<i>La precipitazione oraria più intensa</i>	Pesaro, ore 2 del 20 agosto: 54mm.
<i>La precipitazione in 10 minuti più intensa</i>	Castignano, ore 16:30 del 3 agosto: 35mm.

Precipitazione 2025

Nel corso del 2025, la piovosità è stata piuttosto irregolare, con mesi che sono stati più piovosi della norma (in primis marzo con 124mm, +70% rispetto al 1991-2020) e altri che sono stati meno piovosi della norma (spicca giugno con appena 11mm, -82% rispetto al 1991-2020).


Da inizio anno: 592mm, risulta di poco inferiore allo storico di riferimento, pari a 652mm, con un ammanco di circa il 10%.

Inverno (dicembre 2024 - febbraio 2025) La piovosità stagionale è stata in linea con il 1991-2020 (205mm). Due mesi su tre sono stati più piovosi del normale, tranne gennaio che, con un totale medio di 30mm, segna un deficit del 47%. Il numero di giorni di pioggia è stato anch'esso in linea con lo storico 1991-2020; nel dettaglio mensile mentre l'anomalia di dicembre è stata nulla, essa è stata di -2 giorni a gennaio e di +2 giorni a febbraio così da riportare in pari il bilancio stagionale.

Primavera (marzo 2025 - maggio 2025) Con un totale medio regionale di pioggia caduta di 258mm, è stata più piovosa del normale del +17%. Particolarmente secco il mese di aprile: 41mm, -46% rispetto alla media. Anche come numero di giorni di pioggia la precipitazione ha fatto registrare una prestazione superiore alla media grazie soprattutto ai +5 giorni di marzo; negativa invece l'anomalia di aprile, -3 giorni, positiva quella di maggio +2 giorni sempre considerando il 1991-2020 come riferimento.

Estate (giugno 2025 - agosto 2025) In linea con lo storico 1991-2020 la piovosità totale stagionale, pari a 154mm. Particolarmente secco è stato il mese di giugno il quale, con un totale medio di 11mm, ha fatto registrare un deficit del 82% rispetto alla media storica, valore che si riflette anche sul numero di giorni di pioggia, 5 giorni di pioggia in meno rispetto allo storico. La precipitazione è poi tornata sopra la norma nei due mesi successivi con un totale medio regionale di 75mm in luglio (+73%) e di 68mm (+35%).

Autunno (settembre 2025 - non ancora terminata) I due primi mesi autunnali (conclusi) sono stati più secchi del normale; il deficit della precipitazione cumulata di settembre (47mm) è stato pari al 43%, quello di ottobre (45mm) del 44%.



Mese	Precipitazione (mm)	Storico 1991-2020 (mm)	Anomalia (mm)
Gen. 2025	29	56	-27
Feb. 2025	62	60	2
Mar. 2025	124	74	50
Apr. 2025	41	75	-34
Mag. 2025	92	72	20
Giu. 2025	11	61	-50
Lug. 2025	75	42	33
Ago. 2025	68	49	19
Set. 2025	47	83	-36
Ott. 2025	43	80	-37

Tabella 5. Precipitazione media mensile (mm) anno 2025, storico e anomalia rispetto allo storico.

(Fonte: AMAP Regione Marche – Servizio Agrometeorologico Regionale)


Con i primi dieci mesi, il **2025 si posiziona al quarto posto degli anni più caldi di tutta la serie storica**, con una temperatura media di 16.0°C corrispondente ad un'anomalia di circa $+1.0^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020.

Inverno (dicembre 2024 - febbraio 2025) L'inverno 2025 è stato mediamente più caldo della norma. La temperatura media stagionale è stata di 6.9°C , corrispondente ad un'anomalia di $+1.2^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020. Molto hanno inciso le temperature miti di gennaio: 7.5°C di media per gennaio, $+2.3^{\circ}\text{C}$ rispetto al trentennio di riferimento; più contenuta invece l'anomalia di febbraio con $+1.0^{\circ}\text{C}$ rispetto allo storico; pressoché in media il mese di dicembre.

Primavera (marzo 2025 - maggio 2025) La primavera 2025 è stata lievemente più calda della norma. La temperatura media stagionale è stata di 13.2°C corrispondente ad un'anomalia di $+0.6^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020. Valori termici medi mensili caldi hanno caratterizzato i mesi di marzo e aprile, rispettivamente di 9.8°C ($+0.8^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020) e 13.1°C ($+0.9^{\circ}\text{C}$); in linea con la norma il mese di maggio.

Estate (giugno 2025 - agosto 2025) L'estate 2025 è stata più calda della norma, la decima più calda dal 1961. La temperatura media stagionale è stata di 23.8°C , corrispondente ad un'anomalia di $+1.0^{\circ}\text{C}$ rispetto al 1991-2020. Eccezionali le temperature di giugno: 24.3°C di media, $+3.2^{\circ}\text{C}$ rispetto al trentennio di riferimento. Meno caldi, invece, sono stati luglio e agosto, rispettivamente 24.1°C e 23.1°C di media che corrispondono ad un'anomalia di appena $+0.4^{\circ}\text{C}$ per luglio e di -0.5°C per agosto.

Autunno (settembre 2025 - non ancora terminata) La temperatura media di settembre, di 20.2°C , risulta essere di un circa un grado e mezzo più alta del normale; ottobre invece è stato più freddo della media con una temperatura media regionale di 14 ed un'anomalia di -0.5°C .



Mese	Temperatura media (°C)	Storico 1991-2020 (°C)	Anomalia (°C)
Gen. 2025	7.5	5.2	2.3
Feb. 2025	6.9	5.9	1.0
Mar. 2025	9.8	9.0	0.8
Apr. 2025	13.1	12.2	0.9
Mag. 2025	16.7	16.7	0.0
Giu. 2025	24.3	21.1	3.2
Lug. 2025	24.1	23.7	0.4
Ago. 2025	23.1	23.6	-0.5
Set. 2025	20.2	18.8	1.4
Ott. 2025	13.9	14.5	-0.6


Tabella 4. Temperatura media mensile (°C) anno 2025, storico e anomalia rispetto allo storico. (Fonte: AMAP Regione Marche – Servizio Agrometeorologico Regionale)

Il 2025 in pillole

Parametro	Descrizione
<i>Temperatura media</i>	16°C, +0,9°C rispetto al 1991-2020, quarto valore più alto per le Marche dal 1961.
<i>Temperature media stagionale</i>	Inverno: 6,9°C, +1,2°C rispetto al 1991-2020, <i>nono</i> inverno più caldo per le Marche dal 1961. Primavera: 13,2°C, +0,6°C rispetto al 1991-2020. Estate: 23,8°C, +1,0°C rispetto al 1991-2020. Autunno (settembre-ottobre): 17,1°C, +0,5°C rispetto al 1991-2020.
<i>Temperatura media mensile (mesi più freddo e più caldo del 2025 rispetto al 1991-2020)</i>	Ottobre: 14°C, -0,5°C rispetto al 1991-2020. Giugno: 24,3°C, +3,2°C rispetto al 1991-2020; <i>terzo</i> mese di giugno più caldo per le Marche dal 1961.
<i>Precipitazione totale</i>	911mm, +8% rispetto al 1991-2020.
<i>Precipitazione totale stagionale</i>	Inverno: 205mm, valore in linea con la media 1991-2020. Primavera: 258mm, +17% rispetto al 1991-2020. Estate: 154mm, in linea con il 1991-2020. Autunno (settembre-ottobre): 92mm, -44% rispetto al 1991-2020.
<i>Precipitazione totale mensile (mesi meno piovoso e più piovoso dei primi dieci mesi del 2025)</i>	Giugno: 11mm, -82% rispetto al 1991-2020, <i>secondo</i> valore più basso per il mese di giugno dal 1961. Marzo: 124mm, -72% rispetto al 1991-2020.
<i>La precipitazione giornaliera più intensa</i>	Pollenza, 27 settembre: 90mm.
<i>La precipitazione oraria più intensa</i>	Pollenza, ore 16 del 27 settembre: 78camm.
<i>La precipitazione in 10 minuti più intensa</i>	Sassocorvaro, ore 19:40 del 20 agosto: 24mm.

Nel grafico il confronto del numero di **giorni di pioggia mensili** registrati nel 2024 e quello dei giorni di pioggia mensili registrati nel 2025.

Fino alla fine della stagione estiva nel 2025 si è registrato un numero di giorni piovosi mediamente maggiore rispetto al 2024, mentre con la stagione autunnale la tendenza si inverte, ovvero nel 2024 si sono registrati più giorni di pioggia rispetto al 2025. La differenza più sostanziale si riscontra proprio nel mese di settembre, con 11 giorni di pioggia nel 2024 contro i 5 del 2025.



Confronto tra il numero di giorni di pioggia, anno 2024 e 2025

Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleagina*) e Cercosporiosi o Piombatura (*Mycocentrospora cladosporioides*) queste malattie funginee sono presenti sporadicamente soprattutto nelle zone più umide su cultivar più suscettibili, in oliveti fitti e vigorosi, nel 2024 la presenza è stata piuttosto contenuta e non ha destato particolari problemi mentre nel 2025 la presenza è stata più diffusa, in maniera più marcata quella della Cercosporiosi a seguito delle maggiori precipitazioni primaverili

2024 Intensità bassa, soglia 1-10%



2025 Intensità media, soglia 11-40%



Effetti della Cercosporiosi nel 2025

Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*) nel 2024 non sono stati riscontrati casi riconducibili a lebbra, tale patologia nelle Marche non risulta abbia provocato danni.

Nel 2025 sono stati segnalati danni da **Lebbra** tuttavia, al fine di accertare la presenza del patogeno, presso il laboratorio fitopatologico di AMAP sono stati analizzati diversi campioni di olive provenienti da tutte le provincie della Regione; l'esito non ha evidenziato presenza di *Colletotrichum* sp., mentre è emersa la presenza di **Camarosporium dalmaticum**, (ora *Botryosphaeria dothiodea*).

Anche nel 2024 era stata riscontrata presenza di **Camarosporium** in associazione alla presenza di *Lasioptera berlesiana*

Lebbra: 2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0% 😊

Camarosporium: 2024 Intensità bassa, soglia 1-10% 😊

Camarosporium: 2025 Intensità medio alta, soglia 11-40% 😐



Effetti del Camadosporium dalmaticum, nel 2024



Olive palesemente colpite da Mosca, parzialmente mummificate la cui causa è stata erroneamente attribuita alla Lebbra, nel 2025

Fumaggine si conferma ormai da diversi anni la pressoché totale assenza, solitamente la fumaggine è conseguenza della cocciniglia mezzo grano di pepe (ma anche questo patogeno da qualche anno praticamente non è più presente), inoltre potature più razionali, periodi estivi piuttosto siccitosi, hanno influito sul contenimento del complesso fungineo

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Verticilliosi sia nel 2024 sia nel 2025 non sono state segnalate piante colpite da Verticillosi, anche se nella primavera del 2025 le precipitazioni siano risultate piuttosto abbondanti non sono state segnalate problematiche riconducibili a tale fitopatia.

2024 e 2025 presenza nulla, soglia 0%



Carie anche questa fitopatìa è in forte regressione, certamente il miglioramento delle tecniche di potatura con la riduzione dei tagli di ritorno effettuati sui rami di grandi dimensioni ha sicuramente influito sul contenimento della malattia, la si riscontra solo su piante particolarmente vecchie.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Trattamenti a base di rame:

Sono stati consigliati trattamenti con prodotti rameici sia dopo le potature sia dopo la raccolta.

Questi interventi vengono consigliati principalmente per contrastare la Rogna dell'olivo e con effetti anche su altre malattie funginee.

Rogna (*Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*), Sul territorio marchigiano la presenza è piuttosto diffusa di sulle cultivar più sensibili (Frantoio, Raggia, Raggiola, ecc.), la diffusione di questa malattia è stata maggiore negli areali interessati da grandinate. Con le operazioni di potatura si cerca di limitare la presenza e conseguente diffusione. Sono inoltre stati consigliati trattamenti a base di rame per la disinfezione delle ferite provocate sia dalle potature, sia dalle operazioni di raccolta.

Annate normali di bassa intensità, soglia 1-10%



Tubercoli di Rogna dell'olivo

Nelle Marche non è presente *Xylella Fastidiosa*.

I controlli e i campionamenti sono stati eseguiti secondo le disposizioni ministeriali che recepiscono il regolamento comunitario, con monitoraggi in campo, in aree urbane e in vivaio, sia su olivo sia su altre specie sensibili, viene inoltre monitorato anche il vettore attraverso l'installazione ed il controllo di trappole cromotropiche.

	Vivaio	Territorio	Totale	N° analisi
Campioni analizzati per <i>Xylella fastidiosa</i> nel 2024	3.162	411	3.573	3.993
Campioni analizzati per <i>Xylella fastidiosa</i> primi 6 mesi del 2025	1.824	198	2.022	2.000

Attualmente la Regione Marche risulta indenne da *Xylella fastidiosa*.

Crittogame e altre avversità

Conclusioni

	2024	2025
Occhio di pavone		
Cercosporiosi		
Fumaggine		
Verticilloso		
Carie		
Lebbra		
Camarosporium		
Rogna		
Xylella		

% Soglia di danno			
0		11-40	
1-10		41-100	

Fitofagi



Presenza di mosche in
uliveto, nel mese di agosto
e settembre 2025;
era possibile trovarne in
gran numero sia posate
sulle olive, sia nelle
trappole con anche oltre
200 catture a settimana



Mosca 2025

Fitofagi



Olive con numerose punture di mosca, dopo ogni trattamento le olive venivano nuovamente attaccate

Mosca 2025



Olive gravemente danneggiate dalla mosca e in parte disidratate e/o mummificate per il successivo attacco di Camarosporium

Il 2024 e il 2025 risultano due annate per l'olivicoltura marchigiana esattamente opposte l'una all'altra.

Il **2024** si contraddistingue per produzione abbondante, caldo e siccità hanno ostacolato in maniera significativa lo sviluppo della mosca dell'olivo per quasi tutta la stagione, solo a fine settembre con la ripresa delle piogge si è riscontrato un tardivo attacco del dittero ma senza causare danni significativi alla produzione.

Il **2025** di contro si è caratterizzato per una allegagione medio bassa, la carica di olive si è ulteriormente ridotta, fino all'indurimento del nocciolo, per il disseccamento e cascola di un buon numero di olive. La mosca ha iniziato il suo attacco nella seconda decade di luglio, quando seppur con catture piuttosto contenute è riuscita a concretizzare un'infestazione attiva particolarmente elevata soprattutto in quegli oliveti con bassa carica.

Le condizioni meteorologiche estive ottimali per lo sviluppo e la proliferazione della mosca. La presenza di adulti da metà luglio è stata costante con numeri di oltre 20 unità / trappola a settimana in gran parte degli oliveti; il picco di presenze lo si è registrato nella seconda decade di agosto quando nella maggior parte delle trappole di monitoraggio le catture hanno superato i 100 adulti a settimana con punte anche di oltre 250 individui; non da meno sono state le catture delle trappole utilizzate per la cattura massale, in un oliveto il contenuto di una di queste nelle due settimane a cavallo di ferragosto è stato di ben oltre 850 adulti catturati.

Con una pressione così forte salvaguardare le olive non è stato semplice, infatti chi non ha eseguito interventi o anche chi li ha eseguiti in maniera tardiva, non posizionandoli correttamente o con una distribuzione non adeguata ha subito danni e perdite del 100% della produzione.

Chi ha puntualmente eseguito i trattamenti consigliati nei tempi e nei modi corretti è riuscito a garantirsi il raccolto comunque con un'infestazione dannosa più o meno importante ma tollerabile.

2024 Intensità di danno bassa, soglia 1-10%



2025 Intensità di danno altissima, soglia 41-100%



Fitofagi

Mosca 2024-2025

Disciplinare Marche - ver. 2.0 - Finestra estiva

Allegato 1 - Difesa 2025

DIFESA Olivo 2025 v2							
Note coltura							1/3
Avversità	Nome latino	Criteri di intervento: vincoli	Criteri di intervento: consigli	Sostanza attiva	(1) n. max. interv. per singola s.a. indep. dall'avv.	(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indep. dall'avv.	Limitazioni d'uso e note
MOSCA DELL'OLIVO	<i>Badrocera oleae</i>	Trattamenti adulticidi con utilizzo di trappole "attract and kill". Trattamenti adulticidi a chioma parziale - soglia di intervento: 1% di infestazione attiva (uova e larve di I e II età). Trattamenti larvicidi a tutta chioma - soglia di intervento: 1% di infestazione attiva (uova e larve di I e II età). Trattamenti larvicidi - soglia di intervento: 4-5 % di infestazione attiva (uova e larve di I e II età) per le cv. da olio; inizio infestazione attiva per le cv. da mensa	Installare le trappole per il monitoraggio e per l'applicazione del metodo "attract and kill" prima del raggiungimento della fase ricettiva delle drupe e comunque in post allegagione. Il campione per la verifica dell'infestazione attiva deve essere effettuato anche in caso di adozione del metodo "attract and kill" (con trappole) e deve essere costituito da almeno 100 drupe, raccolte in modo casuale, in ragione di 10 per pianta (rappresentative dell'oliveto). Nelle zone olivicole raggiunte dai comunicati dei CAL, attenersi alle indicazioni contenute nei notiziari agrometeorologici.	<i>Opius concolor</i>			
				<i>Beauveria bassiana</i>			Sostanza attiva esclusa dal limite dei 2 trattamenti larvicidi
				Attract and kill con: Deltametrina			Ammessa esclusivamente in trappole con tecnologia "Attract and Kill"
				Attract and kill con: Lambda-cialotrina			Ammessa esclusivamente in trappole con tecnologia "Attract and Kill"
				Attract and kill con: Spinosad			
				Esca Attrattiva con: Acetamaprid			
				Flupyradifurone	1		
				Acetamiprid	2		Ammesso 1 solo trattamento per olive da mensa
				Cytraniliprole			Solo come esca attrattiva
				Piretrine	2		Ammesso massimo 1 trattamento per olive destinate alla produzione di olio e massimo 2 trattamenti per olive da mensa.
TIGNOLA DELL'OLIVO	<i>Prays oleae</i>	Soglia: 10% di drupe infestate da olive da olio, 5% in olive da tavola.	Si consiglia di combattere questo parassita esclusivamente su varietà a drupa grossa.	<i>Azadiractina A</i>			
				Spinetoram	1		Impiegabile fino al 30/12/2025
				Acetamiprid	2		Ammesso 1 solo trattamento per olive da mensa
				<i>Azadiractina A</i>			
				<i>Bacillus thuringiensis</i>			


Nel 2025 nelle Marche è stata richiesta ed autorizzata la deroga per ulteriori 2 trattamenti larvicidi ed è stata richiesta e concessa la deroga per il secondo piretro anche su olive da olio.

Con catture come quelle dell'anno in corso, sebbene non presente sul disciplinare diverse aziende, che non avevano il vincolo del rispetto del disciplinare, per abbattere gli adulti hanno utilizzato deltametrina.

Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): il monitoraggio è stato effettuato sia sulle trappole per il controllo delle curve di volo degli adulti sia sulle olive per il controllo delle deposizioni.

Nel 2024 la presenza è stata piuttosto modesta, dalla prima decade di giugno si segnala il volo e la cattura degli adulti nelle trappole di monitoraggio.

Numero catture e infestazioni



Adulti di tignola dell'olivo su trappola

2024 Intensità di danno bassa, soglia 1-10%



Tignola dell'olivo (*Prays oleae*): il monitoraggio è stato effettuato sia sulle trappole per il controllo delle curve di volo degli adulti sia sulle olive per il controllo delle deposizioni.

Nella seconda decade di giugno del **2025**, fase fenologica di fine allegagione BBCH 69, si è riscontrato un incremento di adulti sulle trappole ed il superamento, in alcuni casi, della soglia di intervento del 10% di olive con deposizione, pertanto è stato consigliato un intervento specifico.



Uovo di tignola dell'olivo

2025 Intensità medio alta, soglia 11-40%



Margaronia (*Palpita vitrealis*); **Nel 2024** la presenza è stata rilevata in diversi oliveti ma con rosure ai germogli apicali molto limitati, non ha prodotto danni significativi, anche **nel 2025** la presenza è stata rilevata ma in maniera ancora più modesta e sporadica



Adulto di Margaronia

2024-2025 Annate normali di bassa intensità, soglia 1-10%



Cecidomia dell'olivo (*Dasineura oleae*) è un dittero cecidomide che anche nelle Marche, in particolare in alcuni oliveti limitatamente alla provincia di Pesaro e Urbino dal 2019 al 2022 ha provocato danni significativi. Già nel 2023 il dittero era quasi scomparso.

Anche **nel 2024 e 2025** la presenza è stata praticamente nulla, solo raramente ed occasionalmente si riscontrano alcune galle su qualche isolata foglia.



Danni da Cecidomia su foglie e apici di olivo



larva nella galla su foglia

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Cecidomia dell'olivo (*Lasioptera berlesiana*) è un altro dittero cecidomide che invece lo si ritrova sulle olive.

La *Lasioptera* vive in simbiosi con il fungo *Camarosporium dalmaticum*, pertanto quando la femmina depone il suo uovo nella cella di deposizione della mosca, in quanto parassitoide della mosca stessa, infetta la cavità con il micelio del fungo.

Dunque se da un lato la larva della *Lasioptera*, oltre al micelio del fungo, nutrendosi dell'uovo o della larva di mosca svolge un'azione utile, d'altro canto il fungo *Camarosporium* determina marciume della polpa dell'oliva, visibile esternamente con una tacca nerastra e depressa.

Pertanto se l'infestazione della mosca, o altre lesioni, sono limitate anche la presenza di *Lasioptera* e del fungo *Camarosporium* sono contenute, come **nel 2024**, e pertanto non creano problemi alla produzione e qualità di olio.

Invece **nel 2025** l'attacco di mosca è risultato particolarmente elevato pertanto anche la presenza di *Lasioptera* e di *Camarosporium* sono risultati maggiori.



Larva di Lasioptera ed Effetti del Camadosporium

2024 Intensità di danno bassa, soglia 1-10%



2024 Intensità di danno bassa, soglia 1-10%



Fitofagi

Cicale (*Cicada orni* e *Tettigetta brullei*); **Nel 2024** ha provocato danni, non gravissimi ma comunque degni di nota, in diverse piante di olivo e in diversi areali marchigiani. **Nel 2025** la presenza è risultata molto più sporadica.

Dall'analisi dei rametti sono evidenti nel punto di passaggio fra la parte verde e quella disseccata porzioni di corteccia sollevata, dall'osservazione al binoculare si possono notare le celle di deposizione con internamente un uovo riconducibile appunto alle deposizioni della cicala.



Adulti di cicale e danni su rametti

Intensità di danno bassa, soglia 1-10%



Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), si ritrova sempre più frequentemente anche negli oliveti marchigiani in particolare in quelli a conduzione biologica, in frutticoltura sono stati riscontrati danni anche significativi sui frutti, mentre al momento su olivo non risultano criticità riconducibili a questo insetto. La presenza **nel 2024** si è riscontrata maggiormente a fine estate quando le olive avevano già raggiunto la dimensione quasi definitiva, **nel 2025** la presenza è stata rilevata già da inizio estate quando le olive erano ancora in accrescimento.



Adulti di Cimice asiatica

2024 e 2025 presenza ma senza danni, soglia 0%



Cantaride (*Lytta vesicatoria*), la presenza negli oliveti marchigiani è sporadica, localizzata e molto temporanea, tuttavia in quegli sporadici casi di attacco le erosioni dei germogli apicali è particolarmente evidente e la presenza dell'insetto è accompagnata dal caratteristico odore, in genere il danno è irrilevante.

Nel 2024 la presenza è stata particolarmente contenuta, **nel 2025**, attorno a metà giugno, sono stati segnalati un numero maggiore di casi ma comunque non si è ritenuto opportuno consigliare nessun intervento specifico.



Adulti di Cantaride

2024 e 2025 presenza ma senza danni, soglia 0%



Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), questo fitofago è pressoché scomparso, dai monitoraggi non è stato rilevato e non sono stati segnalati danni, il caldo e la siccità estiva negli anni, molto probabilmente hanno determinato il naturale contenimento.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*), anche questo insetto nelle due annate in esame non ha determinato danni significativi, la presenza con le caratteristiche rosure fogliari, è a volte evidente ma generalmente limitata ai polloni. Non sono stati consigliati interventi specifici.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Fleotribo (*Phloeotribus scarabeoides*) anche questo insetto è presente in quasi tutti gli oliveti ma non provoca danni significativi. Il consiglio di lotta per contenerne ulteriormente la presenza è di tipo agronomico, si consiglia infatti di lasciare dei fascetti di rametti alla base del tronco, durante le operazioni di potatura e di asportarli e distruggerli fra fine aprile e primi giorni di maggio (prima dello sfarfallamento)

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*), presente su tutto il territorio regionale, si riscontra sui mazzetti fiorali ma con danni insignificanti. Non è stato consigliato nessun tipo di intervento.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Ilesino (*Hylesinus oleiperda*) non si sono riscontrati danni ascrivibili a questo coleottero.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



Moscerino suggiscorza (*Resseliella oleisuga*) presente sporadicamente negli oliveti marchigiani, la sua presenza, con disseccamento di alcuni apici, nel 2024 e 2025 è stata molto sporadica e insignificante.

2024 e 2025 presenza praticamente nulla, soglia 0%



	2024	2025
Mosca delle olive		
Tignola dell'olivo		
Margaronia		
Cecidomia della foglia		
Cecidomia del frutto		
Cicala		
Cimice Asiatica		
Cantaride		

% Soglia di danno				
0			11-40	
1-10			41-100	

	2024	2025
Coccingilia mezzo grano di pepe		
Oziorrinco		
Fleotribo		
Cotonello dell'olivo		
Ilesino		
Moscerino suggiscorza		

% Soglia di danno				
0			11-40	
1-10			41-100	

Disseccamento di mazzetti fiorali e di olive appena allegate

Nel 2024 si è riscontrato un disseccamento di mazzetti fiorali e di olive appena formate e **nel 2025** in maniera ancora più accentuata il disseccamento di olive fino all'indurimento nocciolo, tale fenomeno non è ascrivibile a problematiche di natura fitosanitaria ma a fenomeni fisiologici della pianta, il danno è stato abbastanza contenuto.



Altri fenomeni



Olivo 2024-2025



Stress idrico

Nel 2024 in numerosi oliveti della Regione si sono manifestati evidenti fenomeni da stress idrico con raggrinzimento delle olive e accartoccciamento delle foglie, questo ha portato ad un minor sviluppo delle dimensioni del frutto, ad un accentuato blocco vegetativo estivo, ad un ritardo nella maturazione delle olive, a basse o bassissime rese e ad una ripresa vegetativa preinvernale. Alcune localizzate precipitazioni estive, in particolare nella parte meridionale della Regione, hanno permesso un decorso più regolare della coltura.





Differenza di dimensione delle olive, della stessa cultivar, in due areali, con differenti precipitazioni



Olive con effetti di cracking dopo le piogge di fine settembre



Nuova vegetazione presente a fine ottobre-inizi di novembre, che si è sviluppata dopo le piogge di fine settembre



Bilancio Fitosanitario

Olivo

2024 - 2025



Grazie per l'attenzione



27 novembre 2025