

## BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

### OLIVO

**Bollettino n. 28 del 26/08/2026**

#### FENOLOGIA E STATO PRODUTTIVO

Ingrossamento/inolizione, le olive hanno ormai raggiunto la pezzatura finale e si avviano verso la fase di indurimento dei tessuti e accumulo oleoso.

#### SITUAZIONE FITOSANITARIA

**Mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*): il controllo settimanale evidenzia una pressione sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. Il calo termico degli ultimi giorni, accompagnato da un incremento dell'umidità relativa, sta creando una finestra favorevole alla ripresa dell'ovideposizione. Distribuzione regionale della pressione (rilievi + modelli previsionali)

- Alto lago di Garda: 3 – 4%
- Medio e basso lago di Garda: 3 – 4%
- Entroterra gardesano: 3 – 4%
- Colline veronesi Nord: 3 – 4%
- Colline veronesi Centrali: 3 – 4%
- Colline veronesi Sud: 3 – 4%
- Colli Berici: 3 – 4%
- Colli Euganei: 3 – 4%
- Pedemontana vicentina: 3 – 4%
- Grappa–Asolo: 3 – 4%
- Litorale veneziano: 4 – 6%

La pressione rimane disomogenea sul territorio regionale, con una maggiore attività delle femmine mature negli areali più freschi, irrigui e con buona escursione termica.

##### Strategie di controllo

**Antideponenti** (polveri di roccia): Le piogge degli ultimi giorni possono aver ridotto la copertura di caolino, bentonite, zeolite o gesso. È opportuno verificare la protezione delle drupe e, se necessario, ripristinare la copertura, soprattutto negli areali irrigui e a maggiore pressione.

**Esche adulticide**: Per chi utilizza Spinosad (biologico) o Cyantraniliprole (integrato), è fondamentale verificare l'intervallo dall'ultimo trattamento. L'efficacia media è di 12–15 giorni: oltre tale periodo è consigliabile intervenire nuovamente per ridurre la popolazione adulta prima della ripresa delle ovideposizioni.

**Adulticidi**: Azadiractina e Piretro naturale rimangono opzioni utili nei contesti con pressione crescente.

**Ovo-larvicidi**: in caso di superamento della soglia del 5%, è possibile intervenire con Acetamiprid o Flupyradifurone (non ammessi in biologico). Rispettare scrupolosamente le indicazioni di etichetta.

Altri fitofagi

## BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

**Margaronia** (*Palpita unionalis*): si osserva un aumento delle infestazioni, con danni agli apici vegetativi e alle drupe. I trattamenti adulticidi contro la mosca contribuiscono a contenerne la popolazione. In alternativa, miscela di Olio di Neem + Sapone molle di potassio.

**Cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*): si osserva la presenza degli adulti contemporaneamente ad un aumento delle forme giovanili, per effetto di nuove ovideposizioni e nascite della seconda generazione.

**Parassiti fungini:** le precipitazioni previste e l'aumento dell'umidità possono favorire Occhio di pavone, Piombatura e Lebbra. Se necessario e negli oliveti storicamente sensibili è consigliabile intervenire con Rame + Zolfo, utili anche come antideponenti nei confronti della mosca. Trattare nelle ore più fresche.

### **Eventi grandinigeni**

In caso di grandinate, intervenire con Rame e Zolfo alle dosi di etichetta per proteggere le ferite e limitare l'ingresso di patogeni.