




Bollettino Fitosanitario

ZONA PROGETTUALE	AVVERSITA'	n. 08/2026	
PIANURA INTERNA VITERBESE	Mosca dell'olivo <i>Bactrocera oleae</i>	dal	01/09/2026
		al	07/09/2026



Fase fenologica:	SVILUPPO DEI FRUTTI (Scala BBCH Olio 75)	"Le drupe hanno raggiunto circa il 70% delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al taglio)"
Condizioni meteo:	NON FAVOREVOLI	Temperature superiori a 32°C; elevata percentuale di umidità relativa; Schiusa uova: T min 17° C – T max 30°. Voli notte di 16-17 ° C / giorno fino a 35° C
Metodologia:	Si esaminano 20 olive a pianta su 10 piante scelte a caso per cultivar per ettaro, un totale di 200 olive.	
Soglia di intervento:	Metodo Adulticida Olive da olio: 4-5% di punture fertili o 2 femmine ovigere/trappola/settimana Olive da mensa 1-2% di punture fertili (uova, larve, pupari)	
Rilievo infestazione:	Attacco rilevato: 0%	

PRESCRIZIONE

PER CHI ANCORA NON LO AVESSE FATTO SI CONSIGLIANO TRATTAMENTI "SPORCANTI" CON PRODOTTI A BASE DI ZEOLITE, CAOLINO, POLVERE DI BASALTO E SIMILARI COME SCHERMANTI DELLE RADIAZIONI SOLARI PERMETTENDO COSI' UN ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA DELLA CHIOMA DI CIRCA 3-4 °C

Fonte dati climatici
ARSIAL (SIARL)

OP LATIUM Soc. Coop. Agr.
Quadrivio dei Quirani, 00018 Palombara Sabina RM
Sede legale: Via Raffaele Piria, 6 – 00156 Roma
e-mail: collisabini@oplatium.it
web: www.oplatium.it / www.agroambientelazio.it

