

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Il passaggio di una saccatura sul nord Italia determinerà condizioni di tempo instabile tra giovedì e venerdì, con fasi di precipitazioni discontinue e generale calo termico. Nelle prime ore di sabato la depressione scorrerà definitivamente verso est, lasciando spazio all'avanzare di un promontorio anticiclonico, in espansione dall'Europa occidentale.

<https://meteo.arpa.veneto.it/?page=MV>

	venerdì 11		sabato 12		domenica 13	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
						
Probabilità Precipitazioni	0/20%	40/60%	0/20%	0%	Nulla 0%	Nulla 0%
Venti	Deboli-Settentrionali		Deboli-Settentrionali		Deboli-Settentrionali	
Temperatura	Min ↓	Max ↑	Min ↓	Max =	Min ↓	Max ↑

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2026	2025	storica	2026	2025	storica
GL	4485	4238.1	4035	2102	1849	1764
GR	4203	4050.4	3909	1933	1761	1699

GL = Conegliano; GR = Gaiarine

Precipitazioni (mm) ultimi giorni

stazione/giorni	09/9
Conegliano	29.8
Gaiarine	19
Vittorio Veneto	38

Dai Servizi Fitosanitari

- settore olivicolo -

Fase fenologica Invaiaura in corso, con viraggio poco evidente, la colorazione procede lentamente per effetto delle alte temperature delle settimane precedenti.

Difesa fitosanitaria Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): i dati rilevati dai controlli su trappole da monitoraggio mostrano una limitata presenza di catture d'adulti. Le infestazioni rimangono pressoché costanti rispetto alla settimana scorsa.

Strategie di difesa

- Interventi ovo-larvicidi: Acetamiprid (max 2 trattamenti/anno); Flupyradifurone (Sivanto Prime - max 1 trattamento/anno);
- Difesa adulticida con esche avvelenate: Spinosad (max 8 applicazioni/anno - ammesso in biologico); Cyantraniliprole (Exirel Bait - max 3 applicazioni/anno) Verificare la copertura delle esche, soprattutto dopo piogge >10 mm.;
- Difesa adulticida diretta: Azadiractina; Piretro naturale (fotolabile - applicare al tramonto, bagnando bene le chiome); Beauveria bassiana (fungo entomopatogeno attivo contro adulti, va applicato al mattino presto o al tramonto, quando l'umidità è più elevata e gli insetti sono meno attivi. È ammesso in agricoltura biologica);
- Protezione antideponente: rinforzare la copertura con farine fossili abbinate a adesivanti, soprattutto dopo eventi piovosi.

Patogeni fungini


Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*); **Piombatura** (*Mycosphaella dearnessii*); **Lebbra** (*Colletotrichum spp.*): in caso di sintomi o condizioni favorevoli (umidità elevata, piogge recenti, bagnatura fogliare prolungata), intervenire con prodotti RAMEICI abbinati a ZOLFO.

Attenzioni particolari: con l'avvicinarsi della raccolta, verificare con attenzione i tempi di carenza riportati sulle etichette dei prodotti fitosanitari.

In collaborazione con AIPO Reg. (UE) 2021/2116 P.O. OCM Olio anno 2026


www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/bollettino_agrometeo_regionale_settimanale.pdf

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.




Indice di Fienagione

Stazione di Conegliano



Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Gaiarine



Revoche Fitosanitari

Nuovo aggiornamento

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/revoche-fitosanitari

Riduzione delle emissioni


Bando per l'interramento dei reflui

venetorurale.it/riduzione-delle-emissioni-aperto-bando-regionale-per-interramento-degli-effluenti-zootecnici/

Bollettino Culture Erbacee

www.venetoagricoltura.org/newsletter/bollettino-culture-erbacee

Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

Se fa belo de San Gorgon, la vendema la va benon

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

giovedì 17 settembre