

Il tempo previsto nei prossimi giorni


Evoluzione Generale Il transito di una perturbazione dal nord Atlantico porta anche sul Veneto qualche giorno di instabilità e frequente copertura nuvolosa, con delle piogge e un calo termico più sensibile giovedì; il successivo incremento della pressione fa diminuire la probabilità di piogge, aumentare gli spazi.....

<https://meteo.arpa.veneto.it/?page=MV>

	giovedì 10		venerdì 11		sabato 12	
	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio	Mattina	Pomeriggio
						
Probabilità Precipitazioni	Alta 80/100%		Media 40/60%		Medi/Bassa 20/40%	
Venti	Deboli/Moderati-Orientali		Deboli/Moderati-Variabili		Deboli/Moderati-Variabili	
Temperatura	Min ↓	Max ↓	Min ↓	Max ↓	Min =	Max =

Informazioni agroclimatiche e territoriali

Temperatura aria 2m (°C) ultimi 4 g.



Somme termiche (°C)

	base 0 dal 1 gennaio			base 10 dal 1 aprile		
	2026	2025	storica	2026	2025	storica
CO	4375	4161	3980	2107	1858	1787
VS	4278	4111	3913	2020	1823	1732

CO = Concadirame; VS = Villadose

Dai Servizi Fitosanitari

- settore olivicolo -


Fase fenologica Invaiaura in corso, con viraggio poco evidente, la colorazione procede lentamente per effetto delle alte temperature delle settimane precedenti.

Difesa fitosanitaria Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): i dati rilevati dai controlli su trappole da monitoraggio mostrano una limitata presenza di catture d'adulti. Le infestazioni rimangono pressoché costanti rispetto alla settimana scorsa.

Strategie di difesa


- Interventi ovo-larvicidi: Acetamiprid (max 2 trattamenti/anno); Flupyradifurone (Sivanto Prime - max 1 trattamento/anno);
- Difesa adulticida con esche avvelenate: Spinosad (max 8 applicazioni/anno - ammesso in biologico); Cyantraniliprole (Exirel Bait - max 3 applicazioni/anno) Verificare la copertura delle esche, soprattutto dopo piogge >10 mm.;
- Difesa adulticida diretta: Azadiractina; Piretro naturale (fotolabile - applicare al tramonto, bagnando bene le chiome); Beauveria bassiana (fungo entomopatogeno attivo contro adulti, va applicato al mattino presto o al tramonto, quando l'umidità è più elevata e gli insetti sono meno attivi. È ammesso in agricoltura biologica);
- Protezione antideponente: rinforzare la copertura con farine fossili abbinate a adesivanti, soprattutto dopo eventi piovosi.

Umidità rel. aria 2m (%) ultimi 4 g.



Indice di Fienagione

Stazione di Villadose



Meteo Veneto

Primi dati Estate 2026

www.arpa.veneto.it/notizie/in-primo-piano/meteo-veneto-primi-dati-estate-2026

Revoche Fitosanitari

Nuovo aggiornamento

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/servizi/revoche-fitosanitari

Riduzione delle emissioni

Bando per l'interramento dei reflui

venetorurale.it/riduzione-delle-emissioni-aperto-bando-regionale-per-interramento-degli-effluenti-zootecnici/

Bollettino Colture Erbacee

www.venetoagricoltura.org/newsletter/bollettino-culture-erbacee

Patogeni fungini

Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*); **Piombatura** (*Mycocentrospora cladosporoides*); **Lebbra** (*Colletotrichum* spp.): in caso di sintomi o condizioni favorevoli (umidità elevata, piogge recenti, bagnatura fogliare prolungata), intervenire con prodotti RAMEICI abbinati a ZOLFO.


Attenzioni particolari: con l'avvicinarsi della raccolta, verificare con attenzione i tempi di carenza riportati sulle etichette dei prodotti fitosanitari.

In collaborazione con AIPO Reg. (UE) 2021/2116 P.O. OCM Olio anno 2026


www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/bollettino_agrometeo_regionale_settimanale.pdf

Bagnatura Fogliare (ore) ultimi 4 g.

Stazione di Concadirame



Evapotraspirazione Potenziale (mm/g) ultimi 8 giorni



Il proverbio della settimana

Se fa belo de San Gorgon, la vendema la va benon

La fase lunare

Luna calante



Il prossimo bollettino

mercoledì 16 settembre