

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

OLIVO

Bollettino n. 29 del 02/09/2026**FENOLOGIA E STATO PRODUTTIVO**

Inolizione – inizio invaiatura.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): il monitoraggio della settimana evidenzia una pressione stabile. Le temperature rimangono elevate, ma l'umidità non ha ancora determinato una ripresa significativa dell'ovideposizione. In molti areali non sono state rilevate nuove infestazioni attive. La riduzione della popolazione adulta è coerente con il fatto che numerosi olivicoltori hanno effettuato un trattamento negli ultimi 10 giorni, con esche adulticide o adulticidi, contribuendo a contenere ulteriormente la pressione del fitofago. I dati riportati derivano da osservazioni dirette e da analisi previsionali, tenendo conto della forte variabilità territoriale, i valori rimangono invariati:

- Alto lago di Garda: 3 – 4%
- Medio e basso lago di Garda: 3 – 4%
- Entroterra gardesano: 3 – 4%
- Colline veronesi Nord: 3 – 4%
- Colline veronesi Centrali: 3 – 4%
- Colline veronesi Sud: 3 – 4%
- Colli Berici: 3 – 4%
- Colli Euganei: 3 – 4%
- Pedemontana vicentina: 3 – 4%
- Grappa–Asolo: 3 – 4%
- Litorale veneziano: 4 – 6%

La pressione rimane disforme sul territorio, con maggiore attività nelle zone irrigue e negli areali più freschi, ma senza incrementi significativi.

Le strategie di controllo rimangono quelle della settimana scorsa.

Cimici: presenza di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e di cimice verde (*Nezara viridula*), a vari stadi di sviluppo, al momento i livelli di popolazione non giustificano azioni a contrasto.

Euzophera pinguis - Euzophera bigella: (areale del Garda) la popolazione di adulti sono contenute per entrambe le specie.

Margaronia (*Palpita unionalis*): si osservano danni agli apici vegetativi su più oliveti, al momento sono sotto delle soglie d'intervento, le eventuali azioni a contrasto della mosca ne contengono indirettamente la popolazione.

Parassiti fungini: le precipitazioni della settimana scorsa e l'aumento dell'umidità relativa possono favorire Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), Piombatura dell'olivo (*Mycocentrospora cladosporioides*), Lebbra dell'olivo

BOLLETTINI FITOSANITARI DIFESA INTEGRATA

(*Colletotrichum spp.*), soprattutto negli oliveti storicamente sensibili; al momento nessuna recrudescenza significativa è stata rilevata nei campionamenti.

Negli oliveti con storia di sensibilità ai patogeni fogliari, se necessario, è consigliabile intervenire con Rame più Zolfo, rispettando le dosi di etichetta.

Il trattamento rameico, se applicato come adesivante, svolge anche una funzione antideponente nei confronti della mosca, utile in questa fase.

Trattare nelle ore più fresche della giornata per evitare stress termico e migliorare l'adesione del prodotto.

Dove sono stati utilizzati antideponenti schermanti (Caolino/Zeolite), valutare se la copertura è ancora presente, in caso di forte dilavamento, il Rame può rappresentare una strategia alternativa più equilibrata, evitando ulteriori riduzioni della fotosintesi.

Eventi grandinigeni: in caso di grandinate, intervenire con Rame più Zolfo alle dosi di etichetta per proteggere le ferite e limitare l'ingresso di patogeni.