

NOTIZIARIO

AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO


“REGIONALE”

Settimanale N. 38 Anno XL

16 - 22 settembre 2026




Sommario	
1	M ETEOROLOGIA
2	D ATI PREVISTI
3	C LIMATOLOGIA
4	F ITOPATOLOGIA



**Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali della Puglia**

METEOROLOGIA

Puglia



Situazione Attuale

La situazione sinottica euro atlantica è caratterizzata dal flusso principale che scorre ondulato oltre il 45°N che delimita due saccature di origine polare: la prima in discesa dalla Groenlandia nel nord Atlantico fino alle isole britanniche; la seconda posizionata tra il mare di Barents e il nord della Scandinavia si collega ad una serie di perturbazioni instabili, in fase di dissolvimento, che stazionano sul mar Nero, sui Balcani e il mar Libico. Sul resto dello scenario è presente un vasto promontorio esteso dal Mediterraneo centroccidentale verso l'area posta più ad ovest dell'Europa continentale e il nord della penisola scandinava. L'Italia settentrionale e centrale attualmente rimangono sotto l'influsso dell'anticiclone atlantico con conseguenti condizioni di tempo pressoché stabile, mentre le regioni meridionali risentono dell'instabilità generata dal vortice posizionato tra lo Ionio e il mar Libico. Per oggi sul nord Italia, prevalentemente sereno eccetto nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini e sulla Liguria dove l'aumento degli addensamenti nuvolosi daranno luogo a rovesci sparsi. Al centro, da sereno a poco nuvoloso salvo il nord della Toscana dove locali annuvolamenti daranno luogo a brevi rovesci. Sul meridione, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con associati rovesci e locali temporali sulla Calabria, la Sicilia in estensione sul basso Salento.



mercoledì 16 settembre 2026

Cielo al mattino poco nuvoloso con maggiori schiarite pomeridiane sul versante adriatico e foggiano; sul versante ionico e basso Salento sviluppo di locali addensamenti nuvolosi con possibili isolati e brevi piovасchi.

Temperatura stazionarie le minime, in aumento le massime.

Venti deboli settentrionali sul basso Adriatico, forti meridionali sullo Ionio, moderati da est sul litorale foggiano e della Bat.

Mari poco mosso l'Adriatico, mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio.




giovedì 17 settembre 2026

Cielo generalmente sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio eccetto sul versante ionico dove prevorranno condizioni di cielo sereno.

Temperatura in aumento.

Venti deboli da SW sul basso Adriatico, forti da S sul versante ionico; moderati orientali sul litorale di Manfredonia e zone esposte del Gargano.

Mari poco mossi.



venerdì 18 settembre 2026

Cielo generalmente poco nuvoloso o velato; nel pomeriggio locali addensamenti sul Salento e Bat potranno dare luogo a piovасchi sparsi.

Temperatura in aumento le minime, stazionarie le massime.

Venti moderati meridionali sul basso Adriatico, deboli sullo Ionio, moderati da nord-est sul litorale della Bat e del foggiano.

Mari poco mosso l'Adriatico, mossi il Canale d'Otranto e lo Ionio.



sabato 19 settembre 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento della nuvolosità nel pomeriggio associata a rovesci e locali temporali in particolare nell'entroterra barese e Murgia, tarantino, brindisino e nord Salento.

Temperatura stazionarie le minime, in diminuzione le massime.

Venti in generale deboli orientali.

Mari poco mosso l'Adriatico e lo Ionio, mosso il Canale d'Otranto.



domenica 20 settembre 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con deboli rovesci e locali piovасchi pomeridiani sulla Puglia occidentale.

Temperatura stazionaria.

Venti moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, forti da nord-est su quello ionico.

Mari poco mossi.

Tendenza per lunedì 21 e martedì 22 settembre 2026

Lunedì, poco nuvoloso al mattino con schiarite pomeridiane. Martedì, generalmente sereno.


DATI PREVISTI Dal 16-09-2026 al 20-09-2026

DATA	CIELO		VENTO		TEMP.		UMID.		FENOMENI		PREC	MARE
	ORE 00:00	ORE 12:00	ORE 00:00	ORE 12:00	min	max	min	max	Tipo	%	mm	
FOGGIA												
16 set	Sereno	Sereno	Debole W	Debole-Moderato E	20	30	30	70				
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Calmo SW	Debole-Moderato SW	22	31	35	70				
18 set	Sereno	Poco nuvoloso	Calmo SW	Debole SW	22	31	40	70				
19 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole W	Debole N	22	29	50	85				
20 set	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole NW	Moderato N	22	28	55	85				
SAN NICANDRO GARGANICO												
16 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato W	Forte NE	18	26	55	80				
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato S	Forte NE	21	29	45	75				
18 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato S	Quasi Forte NE	21	30	40	85				
19 set	Coperto	Coperto	Calmo-Debole SW	Debole-Moderato N	22	28	60	90				
20 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Moderato NW	Moderato N	22	27	65	90				
ANDRIA												
16 set	Sereno	Sereno	Debole-Moderato SW	Debole-Moderato E	19	27	45	70				
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole SW	Moderato E	21	29	35	60				
18 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole SW	Debole-Moderato NE	22	29	40	70				
19 set	Poco nuvoloso	Coperto	Debole SW	Debole NE	22	27	55	85				
20 set	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole W	Debole-Moderato NE	21	27	60	85				
BARI												
16 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato W	Moderato NE	18	26	60	80				Poco mosso
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole-Moderato SW	Forte E	22	29	45	70				Poco mosso
18 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole-Moderato SW	Quasi Forte E	22	29	50	75				Poco mosso
19 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole-Moderato W	Moderato N	23	27	65	85				Poco mosso
20 set	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Quasi Forte N	22	26	70	85				Poco mosso
GIOIA DEL COLLE												
16 set	Sereno	Nuvoloso	Moderato NW	Moderato NE	16	26	45	80				
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Debole S	Forte S	19	28	40	80				
18 set	Nebbia	Coperto	Debole SW	Forte S	20	28	40	85				
19 set	Poco nuvoloso	Coperto	Debole-Moderato NW	Quasi Forte NE	20	27	55	90	Rov/Temp	50	4	
20 set	Nuvoloso	Coperto	Quasi Forte N	Forte N	20	26	60	90				
BRINDISI												
16 set	Sereno	Sereno	Quasi Forte NW	Moderato N	22	26	65	80				Poco mosso
17 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole-Moderato S	Quasi Forte SE	22	29	55	80				Poco mosso
18 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Debole-Moderato S	Quasi Forte SE	22	29	55	85				Poco mosso
19 set	Nuvoloso	Coperto	Debole-Moderato S	Moderato E	23	28	70	90	Rov/Temp	40	4	Poco mosso
20 set	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Quasi Forte NW	Molto Forte N	24	26	75	85				Poco mosso
GINOSA												
16 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato NW	Forte S	18	27	40	80				
17 set	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato N	Quasi Forte S	19	29	40	80				
18 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Moderato NW	Debole S	21	29	35	80				
19 set	Poco nuvoloso	Coperto	Debole-Moderato N	Debole E	21	29	50	90	Rov/Temp	40	3	
20 set	Poco nuvoloso	Coperto	Moderato N	Quasi Forte NE	21	28	55	90	Rov/Temp	40	1	
MANDURIA												
16 set	Sereno	Nuvoloso	Calmo-Debole NW	Calmo S	18	25	50	85				
17 set	Poco nuvoloso	Sereno	Calmo NE	Debole S	21	28	50	75				
18 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Calmo S	Debole S	21	29	45	85				
19 set	Poco nuvoloso	Coperto	Calmo E	Debole NE	22	29	45	85	Rov/Temp	40	2	
20 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole N	Debole-Moderato N	22	28	50	85				
LECCE												
16 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Calmo-Debole NW	Calmo-Debole N	21	27	55	85				
17 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Calmo S	Debole SW	21	28	50	85				
18 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Calmo-Debole S	Debole-Moderato S	21	30	50	90				
19 set	Nuvoloso	Coperto	Calmo-Debole SE	Debole E	22	28	60	90	Rov/Temp	40	3	
20 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole NW	Moderato N	22	28	65	90				
OTRANTO												
16 set	Coperto	Nuvoloso	Debole NW	Calmo NE	19	25	60	85				Mosso
17 set	Sereno	Nuvoloso	Calmo W	Debole-Moderato S	22	27	60	80				Poco mosso
18 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Calmo-Debole S	Moderato S	22	28	65	85				Mosso
19 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole SE	Debole SE	23	27	70	85				Mosso
20 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Debole NW	Moderato N	23	27	75	85				Poco mosso
SANTA MARIA DI LEUCA												
16 set	Nuvoloso	Poco nuvoloso	Quasi Forte NW	Debole-Moderato SW	20	25	55	75				Mosso
17 set	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Debole W	Forte S	23	27	60	70				Poco mosso
18 set	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Moderato S	Molto Forte S	24	27	60	75				Mosso
19 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Moderato SE	Moderato SE	24	27	65	80				Poco mosso
20 set	Nuvoloso	Nuvoloso	Forte N	Forte N	23	27	60	80				Poco mosso


DATI RILEVATI

Dal 07-09-2026 al 13-09-2026


Temperatura a 2m - Massima




Temperatura a 2m - Media




Temperatura a 2m - Minima




Velocità del vento a 2m - Max



Velocità del vento a 2m - Min




Velocità del vento a 10m - Max




Velocità del vento a 10m - Min



Eliofania Totale



Precipitazione Totale



^(*) Dati Rilevati dalle Stazioni della Rete Agrometeorologica Regionale

C

CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE
Dal 07-09-2026 al 13-09-2026

La settimana scorsa è iniziata con una situazione sinottica, euro atlantica, caratterizzata dal flusso principale che scorreva sopra il 45°N delimitando due saccature: la prima ad ovest che discendeva dalla Groenlandia fino al medio Atlantico, con il suo minimo posizionato tra le isole britanniche e l'Islanda; la seconda verso est che dal Circolo Polare Artico attraversava la Scandinavia e poi si spingeva sui Paesi dell'Est sino al Mar Nero. Alle basse latitudini si riscontrava la presenza dell'alta pressione dell'anticiclone atlantico ancora caratterizzato da masse di aria calda nei bassi strati che dall'entroterra, algerino e tunisino, del nord Africa risalivano sul Mediterraneo e su gran parte dell'Italia con conseguente aumento delle temperature ben al di sopra della media del periodo e generando tempo stabile. Sul resto dello scenario si rilevavano due aree depressionarie, una sul Golfo di Biscaglia, in fase di traslazione verso la Francia dove apportava una diminuzione delle temperature, e l'altra sulla Turchia. In seguito, tra mercoledì 9 e giovedì 10, la situazione in area euro atlantica mostrava il flusso perturbato che scorreva sopra il 45°N tra nord America e mare di Barents delimitando una depressione che dalla Groenlandia scendeva sul nord Atlantico e sul cui bordo orientale si inseriva un promontorio che si estendeva fino all'Islanda, mentre tra la Gran Bretagna e i Paesi Baltici era presente un'altra saccatura composta da diversi minimi che si muoveva, nel corso della giornata, verso sud-est investendo la Francia e in parte i rilievi alpini. Sul resto dello scenario si rilevava ad est un promontorio intercyclonico esteso tra la Danimarca e la Russia occidentale che si spingeva verso i Paesi Balcanici; una debole circolazione zonale tra la Spagna e la Turchia; infine sul Mediterraneo e sul meridione d'Italia la persistenza di masse d'aria calda di provenienza nord africana che risalivano verso nord-est generando prevalentemente tempo stabile. Nel weekend la situazione mostrava tre saccature: la prima ad ovest, tra la Groenlandia e l'Islanda che si spingeva verso le isole britanniche; la seconda discendeva dalla Scandinavia, dove si rilevava il suo minimo tra la Svezia e i Paesi baltici, fino alla penisola iberica; la terza estesa tra la Russia siberiana e la penisola scandinava. Le tre aree depressionarie erano a loro volta intervallate da due promontori, uno sui Paesi Balcanici in movimento verso nord sulla Polonia e le Repubbliche Baltiche e l'altro sul nord Atlantico. La depressione scandinava in fase di allungamento verso sud andava ad interessare dapprima la Francia e successivamente l'Italia settentrionale e poi quella centrale fino a raggiungere le coste nord africane del Marocco e dell'Algeria. L'Italia nel fine settimana è stata investita da correnti atlantiche umide ed instabili con conseguenti fenomeni precipitativi, anche di forte intensità, sulle regioni settentrionali, centrali e al sud in particolare sulla Campania. Sul meridione, invece, si è registrata una discreta stabilità grazie all'alta pressione atlantica e alle masse d'aria calda di matrice nord africana. Sulla Puglia le condizioni sono state caratterizzate soprattutto dalle alte temperature, molto al di sopra del periodo sino a venerdì 11 settembre, poi si è registrato un netto calo. I valori rilevati sono stati anche superiori ai 38°C in molte località pugliesi (massima di 39°C nel foggiano a Orta Nova), mentre le minime hanno fatto scendere i termometri, tra sabato e domenica, fino a 13°C. Importante è sottolineare lo scarto climatico registrato nella settimana scorsa: + 6°C le massime e in generale dai + 2 ai + 3°C su gran parte della Puglia, fino a + 4°C sull'area adriatica tra il nord brindisino e il sud barese. Le piogge anche se non ben distribuite su tutto il territorio regionale sono cadute nella giornata di mercoledì 9 settembre sul versante adriatico del basso Salento, giovedì 10 sul Gargano, venerdì 11 sulla Bat e barese e sabato 12 in maniera abbondante sul Salento. Gli accumuli settimanali più importanti si sono registrati in provincia di Lecce a Nociglia e Otranto, rispettivamente con 46,8 mm e 32,8 mm.

DATI RILEVATI DAL 07-09-2026 AL 13-09-2026


COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC. mm	EVAP mm
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX		
ALBEROBELLO	BA	ITAS	OPU31	24.9	17	33.5	64	28	97	0	33.8
ALTAMURA	BA	GUROLAMANNA	OPU01	24.2	15.5	33.9	63	29	94	0	35.8
ALTAMURA	BA	S.P. SANTERAMO	MBA22	24.1	16.3	35.7	69	27	100	10	n.d.
BARI	BA	C.N.R. IRSA	OPU48	27.5	20.7	37.7	61	28	86	3.6	n.d.
CASAMASSIMA	BA	SERRONE(AZ.AGR.MANCINI)	MBA27	25.3	17	34.9	70	31	100	0.6	n.d.
CASSANO DELLE MURGE	BA	S.P. SANNICANDRO	MBA24	24.8	16.5	35	69	29	100	0	n.d.
CONVERSANO	BA	CONTRADA COZZE	OPU52	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
GRAVINA IN PUGLIA	BA	LIMELLI D'IMPERATORE	OPU03	24.3	15.5	34.9	63	25	91	7	33
GRAVINA IN PUGLIA	BA	S.P. SPINAZZOLA	MBA23	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
LOCOROTONDO	BA	ITAS VIA PER CISTERNINO	OPU49	24.7	15.6	33.4	66	27	96	0.2	n.d.
MONOPOLI	BA	CONTRADA MATER DOMINI	OPU18	26.9	20.4	36.8	64	30	91	0	35.9
NOCI	BA	MURGIA ANTICI	MBA28	24.7	13.8	34.8	69	28	98	0.2	n.d.
NOICATTARO	BA	VIA CASAMASSIMA	OPU30	25.7	17.4	35.4	68	31	89	3.8	35.3
PUTIGNANO	BA	LAMENDOLA I	MBA29	24.8	16.3	35.2	68	29	97	0.2	n.d.
SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA PER GIOIA DEL COLLE	MBA25	24	16.7	34.4	67	25	100	1.6	n.d.
TERLIZZI	BA	ITAS	OPU19	25.5	16.3	37.2	62	26	96	4.4	26
TORITTO	BA	QUASANO	OPU53	24.9	17.5	34.5	61	27	97	1.4	n.d.
VALENZANO	BA	CAMPO SPER. UNIBA	MBA26	26.1	18.2	38	73	32	100	4	n.d.
BRINDISI	BR	TORRE MOZZA	OPU32	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
CAROVIGNO	BR	VIA PER CEGLIE MESSAPICA	OPU21	26.7	20.1	35.6	65	33	88	0	35
CEGLIE MESSAPICA	BR	FERRUZZO	MBR31	25.6	18.2	33.7	66	30	93	0	n.d.
FASANO	BR	FASCIANELLO	MBR30	27	20.7	36.3	63	32	87	n.d.	n.d.
FASANO	BR	OTTAVA SEDICI	OPU04	27.2	20.4	36.8	65	35	89	0.6	34.7
LATIANO	BR	MILETO	OPU34	25.7	15.6	34.6	68	25	100	0	n.d.
MESAGNE	BR	MOCCARI	OPU33	26.7	18.7	35.2	70	34	97	0.4	n.d.
OSTUNI	BR	MASSERIA SANTORO	OPU17	24.6	13.2	33.3	68	29	97	0	n.d.
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	MAINE	OPU06	26.6	19.2	35.9	67	32	94	2.6	30.2
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SIGNORANNA	OPU35	27.1	18.4	35.8	64	26	97	0	n.d.
TORRE SANTA SUSANNA	BR	ARCIPRETE	OPU54	26.1	16.6	35.4	67	26	94	1	n.d.
VILLA CASTELLI	BR	VIA PER FRANCAVILLA FONT	OPU20	26.3	17.2	34.9	64	29	93	0	34.7
ANDRIA	BT	MONTEGROSSO	MBA21	25.4	16.6	36.3	55	24	90	5.6	n.d.
ANDRIA	BT	PAPPARICOTTA	OPU16	25.4	14.5	36	60	25	94	0.4	32.4
CANOSA DI PUGLIA	BT	IPSAA	MBA20	26	15.3	38.7	61	25	93	5	n.d.
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	LA PERA DI BASSO	MFG17	25.5	15	36.6	65	25	99	1.6	n.d.
TRANI	BT	S.S. CORATO-TRANI	OPU28	26.3	19.3	35.5	61	27	87	0	35.3

DATI RILEVATI DAL 07-09-2026 AL 13-09-2026											
COMUNE	PROV	LOCALITA	CODICE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA (%)			PREC.	EVAP
				MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm	mm
ALBERONA	FG	SERRONE	MFG12	25.6	17.9	35.6	57	29	82	0	n.d.
APRICENA	FG	CANALE	OPU22	26.8	16.4	38.3	59	24	91	0	40.4
ASCOLI SATRIANO	FG	BISCIGLIETO	MFG13	25.8	18.5	36.5	52	17	85	0	n.d.
CARLANTINO	FG	CAMPO SANTO VECCHIO	OPU56	22.7	15.2	32.8	66	28	97	1	n.d.
CARPINO	FG	ARIOLA	MFG09	26.3	17.3	35.7	47	22	100	1.6	n.d.
CERIGNOLA	FG	TRESSANTI	MFG04	26.7	18.9	36.5	60	24	90	1.6	n.d.
CERIGNOLA	FG	TAVOLETTA	MFG06	26	14.4	38.6	62	21	92	0	n.d.
FOGGIA	FG	MONTEROZZI	MFG19	26.9	17.6	38.5	57	18	84	0	n.d.
FOGGIA	FG	LA PESCIA	MFG03	26.9	17.4	37.9	58	24	84	0.2	n.d.
FOGGIA	FG	BORGIO LA ROCCA	OPU38	26.9	17.9	38	55	18	83	0	n.d.
FOGGIA	FG	COPPA D'ORO	MFG07	26.8	17.1	37.6	59	23	86	n.d.	n.d.
LESINA	FG	RIPALTA	OPU55	26.4	20.1	36.1	63	31	88	1.6	n.d.
LUCERA	FG	S. LUCIA	MFG01	26.8	18.4	37.5	54	22	80	0	n.d.
MANFREDONIA	FG	DAUNIA RISI	OPU23	25.4	16.3	35	67	28	86	7.2	35.3
ORTA NOVA	FG	TRIONFO	OPU07	26.9	16	39	63	24	98	0.2	35
PIETRAMONTECORVINO	FG	TORRETTA	OPU08	25.4	17.1	37	57	27	86	0.2	36.6
RIGNANO GARGANICO	FG	VILLANOVA	OPU36	27.8	18.7	38.1	55	25	87	0	n.d.
RODI GARGANICO	FG	S. LUCIA	MFG14	26.8	19.1	36	61	33	93	0	n.d.
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	MATINE - CARNE SALATA	MFG10	26.6	18.5	38	54	20	91	0	n.d.
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	QUERCIA COPPE	MFG16	23.6	16.8	33.1	63	30	100	0	n.d.
SAN SEVERO	FG	CASA LORDA	MFG15	26.6	17.8	37.6	58	19	86	0	n.d.
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	PALOMBARA	OPU57	25.4	15.3	36.9	55	19	90	0	n.d.
TORREMAGGIORE	FG	SELVA DELLE GROTTI	MFG11	25.9	15.3	37.9	62	25	90	8.8	n.d.
TROIA	FG	COLAZZE - GIARDINETTO	OPU37	25.7	15.7	35.8	57	27	83	0	n.d.
TROIA	FG	SERRA DEI BISI	MFG02	25.1	17.5	36	55	25	90	0	n.d.
VIESTE	FG	MANDRIONE	MFG18	25.4	18.6	35.9	68	36	100	4.2	n.d.
ZAPPONETA	FG	RIVOLI	MFG05	n.d.	n.d.	n.d.	63	17	100	12.5	n.d.
LECCE	LE	ITAS	OPU41	26.6	16.4	35.3	68	26	96	18	n.d.
LEVERANO	LE	ARCHE	OPU40	26.7	19	35	67	25	99	27.8	n.d.
MARTANO	LE	MALOPRA	MLE35	26.2	18.2	35.8	70	29	95	12.4	n.d.
MINERVINO DI LECCE	LE	SCARCIGLIA (CNR)	OPU60	26.2	18.7	34.9	74	28	97	20.2	n.d.
NARDO'	LE	BRUSCA	OPU61	26.7	19	35.8	70	25	93	13	n.d.
NOCIGLIA	LE	VIA PER SUPERSANO	OPU25	26.2	17.5	35	71	28	95	46.8	32.4
OTRANTO	LE	FRASSANITO	OPU10	26.2	18.7	35.1	77	33	98	32.8	29.6
RACALE	LE	CONTE	OPU12	26.7	17.4	37.2	71	28	92	2.4	32.3
SALICE SALENTINO	LE	PANCAZZIO	OPU42	26.1	16.1	35	72	31	96	8.2	n.d.
SQUINZANO	LE	BADESSA	OPU11	26.9	19.7	36	68	37	93	0	34.6
TRICASE	LE	LUCUGNANO	OPU43	26.6	19.1	35.4	71	29	96	13.7	n.d.
UGENTO	LE	BARBARO	MLE34	26.3	17.7	35.7	71	25	94	3.8	n.d.
CASTELLANETA	TA	TAFURI	OPU14	25.1	17.1	34.7	66	32	93	0.2	35
CASTELLANETA	TA	CASTELLANETA MARINA	OPU47	25.9	16.9	36.2	69	19	100	5.3	n.d.
GINOSA	TA	VERSO PALAGIANO	OPU58	26.6	18.1	35.5	68	31	100	0.2	n.d.
GROTTAGLIE	TA	VERSO TARANTO-PAOLO VI	OPU27	26	16.9	34.5	68	29	100	0	n.d.
MANDURIA	TA	TORRE ROSSA	OPU44	26.5	18.4	34.7	67	30	90	0.2	n.d.
MARTINA FRANCA	TA	VERSO MASSAFRA	MTA32	25.5	17.7	35.1	65	33	100	0	n.d.
MASSAFRA	TA	AMENDOLECCHIA	OPU46	26.4	17.7	36.7	64	30	99	0	n.d.
MOTTOLA	TA	SAN BASILIO	OPU45	25.1	15.4	34.4	68	37	94	0	n.d.
PALAGIANELLO	TA	MONTE D'ORO	OPU59	26.7	17.6	36.5	68	32	90	0	n.d.
SAN GIORGIO IONICO	TA	VERSO TARANTO	MTA33	27.2	n.d.	n.d.	60	n.d.	n.d.	0	n.d.
TORRICELLA	TA	VERSO MARINA DI LIZZANO	OPU13	26.1	13.2	35.7	70	28	93	0	n.d.
MEDIA				26	17.3	35.9	64.1	27.3	93.2	3.7	34
MINIMO				22.7	13.2	32.8	47	17	80	0	26
MASSIMO				27.8	20.7	39	77	37	100	46.8	40.4


CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE
Dal 07-09-2026 al 13-09-2026

Temperatura a 2m - Massima




Temperatura a 2m - Minima



Precipitazione Totale



Eliofania Totale



^(*) Dati Rilevati dalle Stazioni della Rete Agrometeorologica Regionale

FITOPATOLOGIA

BARI E BAT

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti - invaiatura.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di malattie fungine e rogna - oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*).
Sporadiche catture di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) nelle trappole a feromoni.

Programma di Difesa:

Nei giovani impianti, per il controllo dell'oziorrinco, applicare al tronco delle piante e ai paletti tutori delle fasce di fibra acrilica al fine di impedire la risalita notturna dell'insetto sulla pianta.

Le alte temperature, superiori alle medie stagionali, stanno ostacolando lo sviluppo delle infestazioni attive della mosca (*Bactrocera oleae*). Proseguire il monitoraggio tramite le trappole a feromoni e campionamenti delle olive e nel caso di superamento della soglia di infestazione, 4-5% per le olive da olio e le prime punture per le olive da tavola, si può intervenire con un trattamento insetticida.

I trattamenti insetticidi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulti), utilizzando esclusivamente esche proteiche attivate con formulati specifici a base di *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, ecc.;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nelle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupyradifurone*.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Sono iniziate le operazioni di vendemmia.
Presenza localizzata di peronospora (*Plasmopara viticola*) e oidio (*Uncinula necator*) .

Programma di Difesa:

Nessun trattamento fitosanitario.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza localizzata di peronospora (*Plasmopara viticola*) - oidio (*Uncinola necator*) e mosca della frutta (*Ceratitis capitata*).

Programma di Difesa:

Per la peronospora, in caso di infezioni, intervenire celermente con prodotti fitosanitari dotati di attività bloccante, utilizzando dosi di etichetta e curando una buona bagnatura della vegetazione.

Oidio, prestare attenzione alle foglie e ai tralci che presentano sintomi della malattia soprattutto se nell'anno precedente sono state rilevate infezioni. Nel caso di infezioni intervenire con prodotti specifici.

Per la tignoletta, si riscontrano poche catture nelle trappole a feromoni. Con le attuali temperature particolarmente elevate, l'efficacia di cattura delle trappole cala drasticamente, sarà meglio affidarsi all'osservazione dei grappoli per individuare le ovideposizioni e lo stadio prevalente di maturazione delle uova.

Si consiglia di programmare interventi insetticidi, con prodotti tradizionali dopo 8 - 12 giorni dall'inizio del volo; con regolatori di crescita, dopo 4 - 5 giorni dall'inizio del volo; con *Bacillus thuringiensis*, dopo 5 - 7 giorni dall'inizio del volo, da ripetersi dopo 7 - 10 giorni dal primo trattamento.

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e nei vigneti con la raccolta tardiva.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta.

CILIEGIO



Situazione Fenologica:

Estivazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Le piante colpite da marciumi radicali devono essere estirpate, allontanate dal campo e bruciate.

Nella buca prodotta con lo svellimento distribuire calce viva.

ALBICOCCO



Situazione Fenologica:

Estivazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Tenere sotto controllo le malattie fungine.

Per le malattie fungine si possono utilizzare fungicidi specifici (a base di *pyrimethanil*, *metconazolo*), oppure prodotti biologici come il *polisolfuro di calcio* o il *bicarbonato di potassio*.

PATATA



Situazione Fenologica:

Nulla da segnalare.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento fitosanitario.

INSALATA



Situazione Fenologica:

Trapianto.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun consiglio di difesa.

MANDORLO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di attacchi parassitari pregressi.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

FITOPATOLOGIA

FOGGIA

TERRITORIO ESCLUSO GARGANO

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutto.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di mosca dell'olivo.

Programma di Difesa:

E' utile collocare in campo le trappole per il monitoraggio della mosca dell'olivo e nel caso di superamento della soglia, 4-5% per le olive da olio e le prime punture per le olive da tavola, si può ricorrere ad un intervento insetticida. Gli interventi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulticidi), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, *acetamiprid* o *lambda-cialotrina*, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupyradifurone*. Per la margaronia intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di accertato consistente attacco sulle piante adulte, utilizzando piretrine.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Maturazione (raccolta).

Situazione Fitosanitaria:

Catture di anarsia nelle trappole a feromoni.

Programma di Difesa:

Per eventuali trattamenti, prima di decidere quale prodotto fitosanitario utilizzare, porre la massima attenzione alla data prevista di raccolta, in maniera da poter rispettare, con ampio margine, il tempo di carenza dello stesso.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione (raccolta).

Situazione Fitosanitaria:

Catture di tignoletta nelle trappole a feromoni. Presenza di mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Nei confronti del mal dell'esca si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale o di potarle separatamente da quelle sane. Nei vigneti in cui non è ancora prevista la vendemmia, si raccomanda di prestare attenzione per una eventuale comparsa di muffa grigia e/o marciume del grappolo; in presenza di tali fitopatie intervenire, sempreché si possa rispettare il periodo di carenza del prodotto fitosanitario da utilizzare, effettuando un trattamento mirato ai grappoli, utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Catture di tignoletta nelle trappole a feromoni. Presenza di mal dell'esca.

Programma di Difesa:

Contro la tignoletta il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e della sostanza attiva impiegata oppure in base all'andamento delle ovideposizioni con specifici rilievi e/o modelli previsionali:

- insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
- regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
- *Bacillus thuringiensis*: 5-7 giorni dall'inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal primo trattamento. Tali interventi è possibile effettuarli sempreché è possibile rispettare il periodo di carenza.

Nei confronti del mal dell'esca si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale o di potarle separatamente da quelle sane.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Nuovi impianti - sviluppo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Per i nuovi impianti si raccomanda di impiegare materiale di propagazione sano e certificato.

CAVOLO



Situazione Fenologica:

Trapianto - sviluppo vegetativo.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di afidi.

Programma di Difesa:

Nelle zone dove sono stati riscontrati attacchi di elateridi negli anni precedenti è opportuno geodisinfestare con un prodotto a base di *cipermetrina* o *lambdacialotrina*.

In presenza di afidi intervenire alla comparsa delle infestazioni con: *deltametrina*, *lambdacialotrina*, *tauflluvalinate*, *acetamiprid*.

POMODORO



Situazione Fenologica:

Maturazione (raccolta).

Situazione Fitosanitaria:

Catture di *Tuta absoluta* nelle trappole a feromoni e danni su foglie e frutto. Presenza di raghetto rosso. Danni da nottue sulle bacche. Marciame apicale.

Programma di Difesa:

Considerata la fase di raccolta e fine ciclo della coltura non si consigliano trattamenti.

TERRITORIO GARGANO

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo dei frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Fumaggine. Presenza di aleurodide spinoso (*Aleurocanthus spiniferus*). Catture di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*). Ricontrata nelle trappole a feromone la cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*).

Programma di Difesa:

Si consiglia di effettuare opportune potature per eliminare le parti più attaccate da parassiti, avendo cura di garantire l'arieggiamento e l'illuminazione della chioma ed evitare eccessive concimazioni azotate. Nei confronti dell'*aleurodide spinoso* si consiglia di effettuare un trattamento con *olio minerale*, *sali potassici di acidi grassi* o *azadiractina* ammessi nel biologico, mentre nel convenzionale si consiglia l'utilizzo dell'*acetamiprid* o *flupiradifurone* o *cyantraniliprole* (quest'ultimo utilizzabile una sola volta ogni 3 anni). Si consiglia di installare in campo le trappole per il monitoraggio della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*) e di porre particolare attenzione al controllo di questo parassita. In caso di accertata presenza attraverso il monitoraggio attuato con le trappole, intervenire tempestivamente adottando una strategia di difesa basata su sistemi "Attract and Kill" oppure mediante l'impiego di esche proteiche attivate con *spinosad* o con un'altra sostanza attiva autorizzata. Per il controllo della cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), si consiglia di intervenire al superamento della soglia di intervento del 10% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale*, *olio essenziale di arancio dolce* e *sali potassici di acidi grassi* (sostanze ammesse anche in agricoltura biologica), *acetamiprid*, *pyriproxyfen* e altri prodotti autorizzati.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Invaiaitura.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di rogna. Aumento del numero di punture di ovodeposizione da parte della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*). Cascola di olive dovute ai fori di sfarfallamento della tignola delle olive (*Prays Oleae*).

Programma di Difesa:

Nella zona costiera del Gargano si ravvisano un aumento delle catture di adulti nelle trappole a feromone, con contestuale aumento di punture di ovodeposizione nelle olive, specie nelle cultivar suscettibili e negli oliveti irrigati. Date le condizioni meteo, con temperature in diminuzione, si consiglia di tenere sotto controllo la popolazione sia dal punto di vista del numero di catture nelle trappole sia delle punture di ovodeposizione ricordando di intervenire al raggiungimento della soglia del 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve di prima età). Gli interventi da effettuare possono essere:

- preventivi (adulterici), esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di: *deltametrina*, *spinosad*, *cyantraniliprole*, *acetamiprid* o *lambda-cialotrina*, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale;
- curativi (nei confronti delle larve), al raggiungimento della soglia, intervenire nei confronti delle prime fasi di sviluppo della mosca (uova e larva di prima età) utilizzando *acetamiprid* o *flupiradifurone*.

Nei confronti della tignola (*Prays Oleae*) e della conseguente cascola dei frutti non bisogna effettuare alcun trattamento.

In alcuni areali si notano infezioni da (*Camarosporium dalmaticum*) sulle olive, dovute al fungo che vive in simbiosi con il predatore delle larve della mosca (*lasiopoda berlesiana*), anche in questo caso non devono essere effettuati trattamenti.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

**Situazione Fenologica:**

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Esiti di infezioni pregresse blande di peronospora e oidio.

Programma di Difesa:

In alcuni vigneti sono iniziate le operazioni di vendemmia. Nei vigneti invece in cui non è ancora prevista la vendemmia, si raccomanda di prestare attenzione per una eventuale comparsa di muffa grigia e/o marciume del grappolo; in presenza di tali fitopatie intervenire, sempreché si possa rispettare il periodo di carenza del prodotto fitosanitario da utilizzare, effettuando un trattamento mirato ai grappoli, utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

FITOPATOLOGIA

BRINDISI

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti.
Inizio invaiatura impianti in sofferenza da stress idrico.

Situazione Fitosanitaria:

Molti oliveti in asciutto sono fortemente stressati dalla perdurante siccità. Pertanto, ancora si registrano poche catture di mosca (*Bactrocera oleae*), salvo casi isolati in contesti ad alta suscettibilità, su cv sensibili, in irriguo e comunque al disotto delle soglie di intervento. **Attenzione, la situazione potrebbe rapidamente cambiare nel caso in cui dovessero arrivare piogge e abbassamenti termici creando condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove generazioni.** Cascola a causa della *Lasioptera berlesiana*, predatore della mosca che, vivendo in simbiosi con un fungo (*Camarosporium dalmaticum*), infetta le drupe facendole cadere. Purtroppo questo antagonista della mosca, pur nel nobile intento di eliminare le uova, determina un vero e proprio danno. La cascola, comunque, è limitata alle poche situazioni di infestazioni con punture fertili o di solo assaggio. Lo stress idrico e le alte temperature registrate nelle ultime settimane rappresentano comunque condizioni di ostacolo allo sviluppo delle infestazioni. Presenza di rosure di margaronia (*Palpita unionalis*) soprattutto su piante giovani o piante potate.

Programma di Difesa:

L'assenza di piogge continua ad essere di ostacolo allo sviluppo delle infestazioni di mosca. Premesso ciò è consigliabile, comunque, tenere sotto controllo le trappole a feromoni al fine di monitorare la presenza di mosca, in quanto minimi cambiamenti dei parametri meteorologici possono modificare sostanzialmente la situazione. Considerato che non c'è alcuna correlazione tra numero delle catture e reale infestazione in campo, si suggerisce sempre di effettuare osservazioni visive nell'oliveto e opportuni campionamenti per verificare la reale presenza del parassita e del suo eventuale grado di infestazione (punture fertili), soprattutto in presenza di cv suscettibili a drupa grossa ed irrigate come *Leccino Coratina*, *Picholine*, *Lecciana* ecc.. Attualmente, nonostante le temperature sono scese di qualche grado, non si registrano incrementi di catture né aumenti di infestazione attiva. Vista la scarsa disponibilità di *sostanze attive* ed i loro limiti di utilizzo per combattere questo parassita, si consiglia di predisporre per tempo una strategia di controllo integrata intervenendo in modo efficiente ed efficace. Pertanto sarebbe utile, indipendentemente dalla presenza o meno del parassita, di intervenire subito con prodotti repellenti a base di *silicato di magnesio*, *caolino*, *zeolite* ecc. il cui scopo è quello di rendere le drupe inadatte alle deposizioni delle uova. Limitare il trattamento chimico ai casi in cui, nonostante ciò, le infestazioni iniziano ad avvicinarsi alle soglie di intervento (4-5% di punture fertili per le olive olio e la sola presenza delle prime punture invece per olive da tavola). Ricordarsi che non tutte le sostanze attive hanno una grande capacità di penetrare nella polpa tanto da poter eliminare le larve all'interno dell'olivina, specie per quelle che hanno superato la 2^a età. I trattamenti devono essere effettuati con dosaggi corretti. Normalmente servono 10/12 q.li di acqua per ettaro utilizzando pompe a volume normale; in questo caso fare riferimento al dosaggio per ettolitro riportato in etichetta. Se, invece si utilizzano pompe a volume ridotto (atomizzatori a ventole, cannoni ecc.) che utilizzano minori volumi di acqua, il quantitativo di prodotto fitosanitario deve essere sempre riferito al dosaggio per ettaro.

Attenzione ai cambiamenti del tempo i quali possono favorire rapide ed improvvise infestazioni di mosca. Su impianti in allevamento e su innesti monitorare la presenza di margaronia (*Palpita unionalis*) o attraverso l'uso di trappole a feromoni oppure osservando direttamente eventuali sintomi sulla vegetazione apicale. Intervenire tempestivamente con prodotti registrati, preferibilmente nelle ore serali, al riscontro dei primissimi sintomi della presenza del parassita, soprattutto su innesti e impianti giovani in fase di allevamento o su piante potate nel corso di questa annata su cui la vegetazione è sicuramente molto lussureggiante. Proteggere preventivamente gli innesti e le piante in fase di allevamento oltretutto dalla margaronia anche dall'oziorrinco (*Otiorhynchus cribricollis*) applicando al disotto delle chioma, compresi eventuali paletti tutori, fasce in resinato acrilico.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa : \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

PESCO



Situazione Fenologica:

Invaiaitura-maturazione cv tardive.

Situazione Fitosanitaria:

Tignole: *Cidia molesta* e *Anarsia lineatella*. Mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*).

Programma di Difesa:

La coltura è ormai a fine ciclo e pertanto non si consigliano trattamenti. Tuttavia monitorare eventuali presenze di infezioni oidiche ed intervenire con prodotti specifici al fine di contenere l'inoculo del fungo in campo. Sorvegliare i propri appezzamenti al fine di individuare adulti di capnode (*Capnodis tenebrionis*) alla base dei tronchi i quali vanno eliminati e distrutti. Scalzare la base del colletto delle piante sofferenti ed eliminare eventuali larve presenti ed intervenire con trattamenti localizzati con insetticidi specifici. Si ricorda che questo buprestide è particolarmente attivo nelle situazioni di caldo e siccità.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Sono iniziate in molte aziende le operazioni di vendemmia. Si registrano esiti di infezioni pregresse di peronospora e oidio e variazioni cromatiche delle foglie dovute alla presenza di cicalina africana (*Jacobisca lybica*), in minor misura rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma visibili a bordo campo di molte spalliere. In alcuni appezzamenti si notano delle "sofferenze" della vegetazione, ed in alcuni casi anche delle vere e proprie *filloptosi* delle foglie. Il fenomeno è stato osservato da alcune settimane e si sta procedendo ad ulteriori approfondimenti diagnostici per accertarne l'agente causale.

Programma di Difesa:

Data la fase fenologica e le condizioni meteorologiche, non si consiglia alcun trattamento.

CARCIOFO



Situazione Fenologica:

Trapianto, risveglio di carciofaie di secondo anno.

Situazione Fitosanitaria:

Isolate colonie di afidi .

Programma di Difesa:

Nella scelta dei materiali di propagazione (*ovoli*, *zampette*) accertarsi preventivamente della loro sanità e della provenienza da impianti in cui nella scorsa annata non si sono registrati problemi fitosanitari riconducibili a *Verticillium d.*, *Sclerotinie* e ad altri patogeni tellurici di difficile controllo in campo. Stessa raccomandazione vale anche per la scelta degli appezzamenti da mettere a coltura: effettuare una idonea rotazione e avvicendamento colturale onde evitare il selezionarsi di parassiti (*patogeni ed erbe infestanti*) che possono diventare resistenti e difficili da controllare. Nei campi più sviluppati possono essere presenti infestazioni di afidi le quali vanno controllate con interventi tempestivi, possibilmente, anche in forma localizzata.

FITOPATOLOGIA

LECCE

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo dei frutti.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di cotonello (*Planococcus citri*), cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*).
Riscontrate nelle trappole catture di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).
Sporadica presenza di ragnetto rosso (*Tetranychus urticae* - *Panonychus citri*) e minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*).

Programma di Difesa:

Contro il cotonello (*Planococcus citri*) intervenire chimicamente solo al raggiungimento della soglia di intervento del 5% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale bianco*, *acetamiprid* o altri prodotti autorizzati.

Per il controllo della cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), si consiglia di intervenire al superamento della soglia di intervento del 20% di frutti infestati, utilizzando prodotti a base di *olio minerale*, *olio essenziale di arancio dolce* e *sali potassici di acidi grassi* (sostanze ammesse anche in agricoltura biologica), *acetamiprid*, *pyriproxyfen* e altri prodotti autorizzati.

Prestare particolare attenzione alla mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*). In caso di accertata presenza attraverso il monitoraggio con trappole, intervenire tempestivamente adottando una strategia di difesa basata su sistemi "*Attract and Kill*" oppure mediante l'impiego di esche proteiche attivate con *spinosad* o con altro principio attivo autorizzato.

In presenza di ragnetto rosso, intervenire:

- per *Tetranychus urticae*, al superamento della soglia del 10% di foglie infestate da forme mobili e del 2% di frutti infestati;
- per *Panonychus citri*, al superamento del 30% di foglie infestate oppure in presenza di 3 acari per foglia. Per il controllo di questi fitofagi possono essere impiegati prodotti a base di *olio minerale*, *acequinocyl* e altri prodotti autorizzati.

Si consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio della mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta e di verificare sempre le autorizzazioni d'impiego vigenti.

OLIVO



Situazione Fenologica:

Invaiaitura.

Situazione Fitosanitaria:

Nelle trappole di monitoraggio sono state rilevate sporadiche catture di adulti di mosca (*Bactrocera oleae*). Presenza di occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*) e cercosporiosi (*Cercospora cladosporioides*) e margaronia (*Palpita unionalis*).

Programma di Difesa:

Nei casi di accertata presenza dell'infestazione attiva della mosca (*Bactrocera oleae*), si consiglia di intervenire con prodotti a base di *acetamiprid* o *flupyradifurone* (utilizzabile una sola volta durante l'anno sulla coltura), attenendosi al raggiungimento della soglia d'intervento:

- per le olive da mensa, corrisponde alla comparsa delle prime punture;
- per le olive da olio risulta pari al 4-5% di infestazione attiva (sommatoria di uova e larve).

In considerazione della presenza dell'insetto, è possibile intervenire con trattamenti preventivi adalticidi, impiegando esche proteiche attivate con un insetticida autorizzato (*deltametrina*, *lambda-cialotrina*, *acetamiprid*, *cyantranilprole* o *spinosad* ed eventualmente innescate con un feromone oppure, in alternativa, è possibile applicare sistemi di tipo *Attract and Kill* oppure installare trappole per la cattura massale.

Inoltre si possono utilizzare *caolino* o *zeolite*, per creare una barriera protettiva come deterrente per l'ovideposizione.

Nei giovani impianti, per il controllo dell'oziorrinco, raccomandiamo l'applicazione preventiva, al tronco delle piante e ai tutori, delle fasce di fibra acrilica al fine di impedire all'insetto la risalita notturna sulla pianta.

Per il contenimento del rodilegno giallo si possono utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale o impiegare il metodo della confusione sessuale.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa : \(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Presenza di vecchie infezioni di peronospora (*Plasmopara viticola*) e oidio (*Uncinola necator*).

Si riscontrano nelle trappole catture di tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*).

Riscontrata la presenza di cicaline. La sintomatologia prodotta dalle infestazioni di *Jacobiasca lybica*, in particolare, si distingue per la comparsa sulle foglie di ingiallimenti e necrosi del margine nei vigneti a bacca bianca, invece dall'arrossamento che porta al conseguente disseccamento e la caduta delle foglie nei vigneti a bacca nera.

Programma di Difesa:

In fase di raccolta non si consigliano trattamenti.

Nei vigneti in cui non è ancora prevista la vendemmia, viste le piogge verificatesi nei giorni precedenti, si consiglia di effettuare, contro la muffa grigia e/o marciume, un trattamento mirato ai grappoli utilizzando prodotti a base di *bicarbonato di potassio*, *Bacillus amyloliquefaciens*, *eugenolo*, *geraniolo*, *timolo*, *cerevisane*, *fenexamid*, ecc.

Durante le osservazioni in campo, prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di cicaline. Qualora se ne riscontri la presenza, si consiglia di intervenire con prodotti a base di *olio essenziale di arancio dolce*, *sali potassici degli acidi grassi*, *piretrine*, *azadiractina*, *acetamiprid* o altri principi attivi autorizzati, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e del limite massimo di tre trattamenti.

Si raccomanda di garantire una bagnatura uniforme della vegetazione, di alternare i principi attivi al fine di ridurre il rischio di insorgenza di fenomeni di resistenza e di rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta per i prodotti fitosanitari impiegati, **prestando particolare attenzione ai tempi di carenza**.

In presenza di sintomi da mal dell'esca, prima della caduta delle foglie, si consiglia di segnalare le piante per poterle individuare facilmente e intervenire separatamente al momento della potatura.

MELOGRANO

**Situazione Fenologica:**

Inizio maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Riscontrata nelle trappole la presenza di mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*).

Programma di Difesa:

Per un'azione protettiva sui frutti, contro la proliferazione di funghi, batteri ed eventuali scottature, si consiglia di effettuare un trattamento a base di polvere di roccia.

FITOPATOLOGIA

TARANTO

AGRUMI



Situazione Fenologica:

Sviluppo frutti - invaiatura varietà precoci.

Situazione Fitosanitaria:

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*);
cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*);
aleurodide spinoso (*Aleurochantus spiniferus*);
cotonello (*Planococcus citri*);
minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*);
ragnetti rossi (*Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*).

Programma di Difesa:

Mosca mediterranea della frutta (*Ceratitis capitata*): riscontrate catture nelle trappole per il monitoraggio nei campi di osservazione. E' utile programmare la strategia di difesa con sistemi tipo "Attract and Kill" (trappole con esche avvelenate da posizionare in campo) o trattare la vegetazione con esche costituite da sostanze attrattive specifiche attivate con *spinosad* o con insetticidi tradizionali purché ammessi. Prestare molta attenzione alle varietà precocissime (es. Mjiagawa) nella fase fenologica di suscettibilità dei frutti (invaiatura e affinamento della buccia). Se le condizioni climatiche nei prossimi giorni dovessero essere più favorevoli alla mosca (temperature più basse e piovoschi) e si dovesse registrare un forte aumento delle catture, potrebbero essere eseguiti dei trattamenti di contenimento con *piretroidi*, *azadiractina*, *etofenprox*, *acetamiprid* o *cyantraniliprole*.

cocciniglia rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*): nei campi monitorati non si riscontrano nuove catture di adulti. Laddove il parassita è presente e nelle annate precedenti si sono riscontrati attacchi sui frutti, sarà opportuno intervenire con prodotti a base di *olio minerale estivo* + *azadiractina* o con *prodotti citotropici* (*Pyriproxyfen*) o *sistemici* (*acetamiprid*) che esplicano la loro azione contro le forme fisse che si alimentano succhiando linfa. **Si segnala che le autorizzazioni per l'uso di emergenza di *dimpropridaz* e *sulfoxaflor* sono scadute nel mese di agosto.**

Aleurodide spinoso (*Aleurochantus spiniferus*): in qualche campo di osservazione si osserva una ripresa dell'attività dovuta ad una nuova generazione e conseguente emissione di melata. Pertanto, laddove è presente e si osservano i primi focolai, si consiglia di intervenire, in agricoltura biologica, con prodotti come *sali potassici di acidi grassi*, *maltodestrina* e *azadiractina*; mentre, in agricoltura convenzionale, con *acetamiprid*, *cyantraniliprole* o *flupyradifurone*.

Cotonello (*Planococcus citri*): monitorare i frutti osservando il movimento delle neanidi che migreranno dalla rosetta verso l'ombelico. Al superamento della soglia del 5% di frutti infestati, intervenire con prodotti a base *olio minerale estivo* + *azadiractina*.

Minatrice serpentina (*Phyllocnistis citrella*): occorre ricordare che può determinare danni rilevanti su giovani impianti in allevamento. Quindi, è bene seguire l'andamento con maggiore attenzione per intervenire, se necessario, con prodotti specifici in modo che non venga compromesso lo sviluppo vegetativo. Poiché è necessario ripetere periodicamente il trattamento, è importante alternare le sostanze attive ammesse (*Olio minerale*, *azadiractina*, *acetamiprid*, *cyantraniliprole*, *clorantpriliprole*, *emamectina*, *milbectina*) per evitare l'insorgenza di forme di resistenza. In generale, adottando opportune tecniche agronomiche, non eccedendo con le concimazioni azotate e somministrando la giusta quantità di acqua durante l'irrigazione, si contribuisce a contenere il rigoglio vegetativo riducendo gli attacchi di insetti quali afidi, cocciniglie, mosche bianche e la stessa minatrice che si avvantaggiano soprattutto della maggiore disponibilità di azoto solubile.

Ragnetti rossi (*Panonychus citri*, *Tetranychus urticae*): la perdurante condizione di forte caldo secco favorisce questi acari che deprimono l'entomofauna utile. Si consiglia di osservare il proprio campo per individuare i primi attacchi e, al superamento della soglia del 10% di foglie infestate, programmare un intervento scegliendo tra i diversi acaricidi disponibili (*fenpyroximate*, *pyridaben*, *extiazox*, *tebufenpirad*, *milbemectina*, *cyflumetofen*, *acequinocil*).

OLIVO



Situazione Fenologica:

Accrescimento frutti - invaiatura.

Situazione Fitosanitaria:

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*);
oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*).

Programma di Difesa:

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): non riscontrate catture nelle trappole a feromoni, eseguire i campionamenti sulle drupe. Le elevate temperature hanno limitato l'attività del fitofago soprattutto negli oliveti in asciutta, ma eventuali precipitazioni potrebbero favorirne la ripresa. Al momento non si giustificano interventi fitosanitari. Chi ha optato per sistemi "Attract and kill" a lunga durata (3-4 mesi) potrà posizionare i supporti attrattivi alle prime catture delle trappole spia.

Oziorrinco (*Otiorrhynchus cribricollis*): su piante giovani, si consiglia di installare sui tronchi, compresi i paletti tutori, delle fasce di resinato acrilico le quali hanno lo scopo di intrappolare gli adulti del parassita quando questi risalgono dal terreno verso la chioma.

Per tutte le informazioni su *Xylella fastidiosa* si rimanda a quanto previsto dalla [deliberazione della giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1593 Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa ;\(Well et al.\) in Puglia" biennio 2024-2026](#) ed ai comunicati ufficiali dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito emergenzaxylella.it.

VITE DA VINO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*).

Programma di Difesa:

in molti campi sono iniziate le operazioni di raccolta, pertanto non effettuare trattamenti. Sorvegliare i vigneti di varietà a raccolta tardiva per verificare l'insorgenza di eventuali focolai, muffe e marciumi.

Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*) ; si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale.

VITE DA TAVOLA



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*);
tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*);
cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*);
cicalina africana (*Jacobiasca lybica*);
muffa grigia (*Botrytis cinerea*);
mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*).

Programma di Difesa:

In molti campi sono iniziate le operazioni di raccolta, pertanto non effettuare trattamenti. Sorvegliare i vigneti di varietà a raccolta tardiva per verificare l'insorgenza di eventuali focolai, muffe e marciumi. Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*): in generale non si sono riscontrate catture nelle trappole per il monitoraggio nei campi di osservazione e non si prevedono trattamenti.

Tignola rigata (*Cryptoblabes gnidiella*): non si sono riscontrate catture di questo insetto nelle trappole per il monitoraggio nei campi di osservazione.

Cocciniglia farinosa (*Planococcus ficus*): presente in qualche campo di osservazione del territorio e in particolare laddove il vigneto è coperto con teli plastici creando un ambiente molto più umido. In questo periodo, nei vigneti infestati, sono presenti tutti i suoi stadi. Gli individui concentrati soprattutto sotto la corteccia migrano verso le foglie e i grappoli. Contro questo insetto, oltre alla confusione sessuale, è possibile il controllo biologico con insetti come *Cryptolaemus montrouzieri* o *Anagyrus pseudococci*.

Cicalina africana (*Jacobiasca lybica*): presente in qualche campo di osservazione. Le punture di alimentazione di questo insetto provocano una significativa riduzione dell'attività fotosintetica delle foglie le quali si presentano arrossate e, talvolta, anche parzialmente necrotizzate. Pertanto, se presente, si consiglia di effettuare interventi specifici.

Muffa grigia (*Botrytis cinerea*): per le uve a maturazione medio-tardiva eseguire un intervento con prodotti registrati sulla coltura.

Mal dell'esca (*Phaeomoniella chlamydospora*, *Formitiponia mediterranea*, *Phaeoacremonium aleophilum*); si consiglia di segnare le piante malate per eliminarle prima della potatura invernale.

MELOGRANO



Situazione Fenologica:

Maturazione.

Situazione Fitosanitaria:

Nulla da segnalare.

Programma di Difesa:

Nessun trattamento.

INFORMAZIONI SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO

Nel marzo 1985 è stato avviato il primo **Piano Agrometeorologico Regionale** nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

Il Piano, così come avvenuto nelle successive fasi, ha avuto come principale obiettivo la costituzione e la gestione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico-agronomiche finalizzate al mondo agricolo.

Le principali realizzazioni del Servizio Agrometeorologico riguardano:

- la Rete Agrometeorologica Regionale composta da 94 stazioni di rilevamento dati meteorologici e agrometeorologici, completamente automatiche e in tempo reale;
- la Rete dei Campi di osservazioni Agrofenologiche e Fitopatologiche;
- la Banca Dati Agrometeorologica Regionale costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (SIAN) , i dati storici dell'ex UCEA, oggi C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), dell'ex Servizio Idrografico e Mareografico oggi Regione Puglia, Settore Protezione Civile Ufficio Idrografico e Mareografico e dell'Aeronautica Militare a partire dal 1951 fino all'anno corrente, da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazioni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale, e da una componente agrofenologiche e fitopatologica;
- i Prodotti Agro-Climatologici (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro-climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, piani di concimazione, modelli previsionali sviluppo patogeni, pianificazione del territorio, ecc.);
- il Notiziario Agrometeorologico e Fitosanitario settimanale con previsioni fino a 7 giorni;
- il Bollettino Meteorologico giornaliero Regionale con previsioni fino a 7 giorni;

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO REGIONALE

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle previsioni del tempo consultare il sito www.arifpuglia.it (Sezione Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario).

Registrandosi al suddetto sito è possibile usufruire di diversi servizi utili per la pianificazione delle attività delle aziende agricole e consultare i dati di monitoraggio sia di tipo agrometeorologico che agrofienologico, nonché acquisire consigli utili alla difesa fitosanitaria integrata.



REGIONE PUGLIA SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO REGIONALE ARIF PUGLIA

Via delle Magnolie, 6 - 70026 - Modugno (Bari)

DIREZIONE GENERALE
Legale Rappresentante Direttore Generale:
Dott. Agr. Francesco Ferraro

Dirigente della Sezione Fitosanitaria:
Dott. Agr. Michele Tenore

www.arifpuglia.it
PEC: protocollo@pec.arifpuglia.it

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO REGIONALE

SU INFORMAZIONI: Rete Agrometeorologica Regionale - Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - Servizio Informativo Agricolo Nazionale.

Realizzato in proprio

La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni è **vietata a termini di legge**. È consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.