

Reduceri polinomiale

4 ianuarie 2018

Reducerea polinomială

A = algoritm pentru problema PA (pe care o reduc)

B = algoritm pentru problema PB (la care reduc)

F = algoritm **determinist polinomial** de transformare a intrărilor pentru A în intrări pentru B

Dacă există F algoritm determinist cu complexitate polinomială care transformă **orice** instanță i a problemei PA într-o instanță F(i) a problemei PB a.î. $A(i)=1 \iff B(F(i))=1$, atunci spunem că PA se reduce polinomial la PB: $PA \leq_p PB$.

Obs0: diferența dintre reducerea polinomială și reducerea Turing este că aici F trebuie să fie determinist polinomial.

Obs1: faptul ca reducerea nu merge (neapărat) și de la PB la PA se vede în sublinierea cuvintelor "orice" și "o". Când reducem PA la PB luăm o intrare oarecare pentru PA și construim în mod convenabil o intrare pentru PB.

Obs2: demonstrația faptului ca o problemă se reduce polinomial la alta nu e completă dacă nu demonstrați **implicația în ambele sensuri!** Întâi trebuie demonstrat că $A(i)=1 \implies B(F(i))=1$, apoi ca $B(F(i))=1 \implies A(i)=1$.

Consecințe ale stabilirii unei relații de reducere polinomială:

$$A \leq_p B \wedge B \in P \implies A \in P$$

$$A \leq_p B \wedge A \notin P \implies B \notin P$$

Aceste consecințe se folosesc pentru a demonstra apartenența unor probleme la o anumită clasă de probleme, folosind reduceri (de) la probleme a căror (in)tractabilitate este cunoscută.

Clase de probleme

$P = \{ A \mid \exists B \text{ un algoritm determinist polinomial care rezolvă } A \}$

$NP = \{ A \mid \exists B \text{ un algoritm nedeterminist polinomial care rezolvă } A \}$

$NP\text{-hard} = \{ A \mid \forall Q \in NP \bullet Q \leq_p A \}$

$NP\text{-complete} = \{ A \mid A \in NP \wedge A \in NP\text{-hard} \}$

Strategii de a demonstra apartenența la o clasă de probleme

P: se construiește un algoritm determinist polinomial

NP: se construiește un algoritm nedeterminist polinomial SAU se arată ca soluția poate fi verificată în timp polinomial

NP-hard: se găsește o problema cunoscută ca NP-hard și se reduce această problemă la problema curentă (nu invers!)

NP-complete: se arată că e NP și NP-hard

Alte clase de probleme

PSPACE = clasa problemelor care sunt rezolvate de algoritmi deterministi in timp nelimitat si utilizând spațiu polinomial

NPSpace = clasa problemelor care sunt rezolvate de algoritmi NEdeterministi în timp nelimitat și utilizând spațiu polinomial

PSPACE = NPSpace (Savitch, 1970)

Teorema 1. Relația de reducere polinomială \leq_p este tranzitivă.

Teorema 2. O problemă Q2 este NP-hard dacă și numai dacă există o problema NP-completă Q1 astfel încât $Q1 \leq_p Q2$.

Teorema 3. Problemele NP-complete formează o clasă de echivalență în raport cu relația \leq_p (altfel spus, dacă Q1, Q2 sunt NP-complete atunci $Q1 \leq_p Q2$ și $Q2 \leq_p Q1$).

Teorema 4. Dacă există o problemă $Q \in \text{NP-completă}$ și $Q \in P$, atunci $P = \text{NP}$.

Teorema 5. Dacă există o problemă $Q \in \text{NP-hard}$ și $Q \in P$, atunci $P = \text{NP}$.

Demonstrați reducerile polinomiale următoare:

1. 3-Colorare \leq_p 4-Colorare

Problema **k-Colorare** ($k \geq 2$): Dându-se un graf neorientat $G = (V, E)$ și k culori, se pot colora nodurile grafului folosind cele k culori astfel încât niciun nod sa nu aibă un vecin de aceeași culoare?

2. Partitie \leq_p q-Sume

Problema Partiție: Dându-se un număr n și o mulțime de n întregi $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, există $S \subset \{1, \dots, n\}$ astfel încât $\sum_{i \in S} a_i = \sum_{i \notin S} a_i$?


Problema q-Sume (Subset Sum): Dându-se numerele t, q și o mulțime de t întregi $B = \{b_1, \dots, b_t\}$, există $S' \subseteq \{1, \dots, t\}$ astfel încât $\sum_{i \in S'} b_i = q$?

3. Independent Set \leq_p Vertex Cover

Problema Vertex Cover: Dându-se un graf neorientat $G = (V, E)$ și un număr k, există o submulțime S de noduri, $|S| = k$, astfel încât fiecare muchie are cel puțin un capăt în S?

Problema Independent Set: Dându-se un graf neorientat $G' = (V', E')$ și un număr k' , există o submulțime S' de noduri, $|S'| = k'$, astfel încât fiecare muchie are cel mult un capăt în S' ?

Exemplu:



4. Vertex Cover \leq_p Set Cover

Problema Set Cover: Dându-se o mulțime U , o colecție S_1, S_2, \dots, S_m de submulțimi ale lui U și un număr k' , există o colecție de k' astfel de submulțimi care reunite să dea U ?