

Teoria Sistemelor

04.09.2020

Examen

Grigore Lucian - Florin
324CD

Problema 1.

$$H(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 3s + 2}$$

$$\textcircled{1} A(s) = s^2 + 3s + 2 \Rightarrow H = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = |3| = 3 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 > 0$$

$\Rightarrow A(s)$ este polinom Hurwitz \Rightarrow
 \Rightarrow Are toți poli în semiplanul
complex stâng \Rightarrow Sistemul
este stabil.

③. $u(t) = \sin t \cdot 1(t)$

$$U(s) = \mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$y(t) = h(t) * u(t)$$

$$Y(s) = H(s) \cdot U(s) = \frac{s+1}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}(t) = e^{-t} - e^{-2t}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0 \Rightarrow y_{\text{permanent}} = 0$$

Calcul RAPID
 Teorema Valorii Finale (TVF) $\Rightarrow y_{\text{trans}} = e^{-t} - e^{-2t}$
 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0 \Rightarrow y_{\text{perman}} = 0$

④. R.S.O.

$$\Delta = H(\infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+1}{s^2 + 3s + 2} = 1$$

$$\tilde{H}(s) = \frac{-3s-1}{s^2 + 3s + 2} \Rightarrow \begin{matrix} \cancel{\gamma_0} = 2 \\ \gamma_1^* = 3 \end{matrix}$$

$$K_0 = -1$$

$$K_1 = -3$$

$$H(s) = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & -\gamma_0^* & K_0 \\ 1 & -\gamma_1^* & K_1 \\ \hline 0 & 1 & \Delta \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 0 & -2 & -1 \\ 1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} ; C = [0 \quad 1] ; D = 0$$

⑤. (A, B, C, D) observabil? I, (dim R.S.O)

$$R = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \det R = \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = -8 + 18 = 10 \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{rang } R = 3 \Rightarrow (A, B) \text{ controlabil? } \underline{\text{II}}.$$

$$\begin{matrix} \underline{\text{I}}. \\ \underline{\text{II}}. \end{matrix} \left| \Rightarrow (A, B, C, D) \text{ realizare minimă} \right.$$

⑥. I. $\lambda(A+BF) \in \mathbb{C}^- \Rightarrow$ alocare pt. (A, B) ~~controlabil~~

II. $\lambda(A+LC) \in \mathbb{C}^- \Rightarrow$ alocare pt. (A^T, C^T) ~~observabil~~
cazul $m=1$

I. Alegem $\lambda(A+BF) = \{-1, -1\}$

Matricea de controlabilitate este

$$R = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$R^T \cdot g = e_2 \text{ unde } e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} ; g = [g_1, g_2]^T$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -g_1 - 3g_2 = 0 \\ 6g_1 + 8g_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -6g_1 - 18g_2 = 0 \\ 6g_1 + 8g_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{(+)} \Rightarrow 10g_2 = -1 \Rightarrow g_2 = -\frac{1}{10}$$

$$-g_1 - 3g_2 = 0 \Rightarrow g_1 = -3g_2 \Rightarrow g_1 = \frac{3}{10}$$

$$g = \begin{bmatrix} 3/10 \\ -1/10 \end{bmatrix}$$

$$F^T = -g^T \cdot \chi(A) = \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \cdot (A + I_2)^2 =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$$A + BF = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{6}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{8}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{9}{5} \end{bmatrix}$$

$$p_{A+BF}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + 1/5 & -8/5 \\ \frac{2}{5} & \lambda + \frac{9}{5} \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + \frac{3}{25} + \frac{16}{25} =$$

$$= \lambda^2 + 2\lambda + 1 = (\lambda + 1)^2 \Rightarrow \text{Se verifică alocarea făcând}$$

$$-1(A+BF) = \{-1, -1\}$$

II. Alegem, $A+LC$ ai. $-1(A+LC) \in \mathbb{C}^-$
 Alocare pt. (A^T, C^T) .

$$\text{Fie } -1(A^T + C^T \cdot E) = \{-1, -1\}$$

$R = \text{dnb}(A^T, C^T)$ matr. de controlabilitate

$$R = \begin{bmatrix} C^T & A^T \cdot C^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^T \cdot C^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$R^T \cdot g = e_2; \text{ unde } g = [g_1, g_2]^T; e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} g_2 = 0 \\ g_1 - 3g_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow g = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$L^T = -g^T \cdot \mathcal{X}(A^T) = [-1 \ 0] \cdot (A^T + I_2)^2 =$$

$$= [-1 \ 0] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}^2 = [-4 \ -4] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix} = [-1 \ 1]$$

$$L^T = [-1 \ 1]$$

$$L C = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot L_0 \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

~~Wanted to use the Kalman~~

$$L D F = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{bmatrix}$$

$$A + B F = \begin{bmatrix} -1/5 & -8/5 \\ 2/5 & -3/5 \end{bmatrix}$$

$$A + B F + L C + L D F = \begin{bmatrix} -1/5 & -8/5 \\ 2/5 & -3/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3/5 & -6/5 \end{bmatrix}$$

$$K = \left[\begin{array}{cc|c} A + B F + L C + L D F & -1 \\ \hline & 1 \end{array} \right]$$

$$K = \left[\begin{array}{cc|c} 0 & -1 & -1 \\ 3/5 & -6/5 & -1 \\ \hline 1/5 & -2/5 & 1 \end{array} \right]$$

↓

Compensatorul Kalman care stabilizează sistemul.

Problema 2.

$$y(n) = \frac{1}{2} [u(n) - u(n-1)] \quad / \quad \mathcal{Z}\{ \cdot \}$$

$$Y(z) = \frac{1}{2} \left(U(z) - \frac{1}{z} U(z) \right) = \frac{U(z)}{2} \left(1 - \frac{1}{z} \right)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{z} \right)$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} (1 - e^{-j\omega}) =$$

$$= \frac{e^{-j\omega/2}}{2} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}) =$$

$$= j \cdot e^{-j\omega/2} \cdot \frac{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}}{2j} =$$

$$= j \cdot e^{-j\omega/2} \cdot \sin \frac{\omega}{2} = e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot \sin \frac{\omega}{2}$$

$$\text{Amplitudine} = |H(e^{j\omega})| = \sin \frac{\omega}{2} > 0; \quad \omega \in [0, \pi]$$

$$\text{Faza} = \arg(H(e^{j\omega})) = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega}{2} = \frac{\pi - \omega}{2}$$

$$\varphi = \frac{\pi - \omega}{2} \quad \text{fct. lim.} \Rightarrow \text{faza limită}$$

$$y(t) = u(t) \cdot |H(j\omega)| \cdot e^{j \cdot \arg(H(j\omega))}$$

$$y(n) = u(n) \cdot \sin \frac{\omega}{2} \cdot e^{j \left(\frac{\pi - \omega}{2} \right)}$$

$$u(n) = 1 = e^{j \cdot \omega \cdot n}; \quad \omega = 0 \Rightarrow y(n) = 0 \quad \text{pt. } u(n) = 1$$

$$\textcircled{2}. H(s) = \frac{s^2+1}{s^2+3s+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2+3s+2} \cdot (s^2+1)$$

$$H_1(s) = \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \text{ dB/dec}; 20 \lg \frac{1}{2} = 20 \cdot (-0,3) = -6 \text{ dB}$$

$$H_2(s) = \frac{2}{s^2+3s+2} \Rightarrow -40 \text{ dB/dec}; 40 \lg \sqrt{2} = 40 \lg 2^{\frac{1}{2}} = 20 \lg 2 = 20 \cdot 0,3 = 6 \text{ dB}; \omega_2 = \sqrt{2} = 1,41$$

$$H_3(s) = s^2+1 \Rightarrow 40 \text{ dB/dec}; 20 \lg 1 = 0 \text{ dB}; \omega_3 = 1$$



