

## Day 3 : EM algorithm

### \* Change of denotation

#### 1) Expectation

Variable  $x$ 's p.d.f  $p(x)$ , the expectation of  $f(x)$  is

$$: E[f(x)] \longrightarrow E_{p(x)}[f(x)] = \int f(x)p(x)dx$$

#### 2) PDF

$$p(x; \theta) \longrightarrow p_{\theta}(x)$$

### \* KL Divergence

- 두 확률분포의 차이를 줄이는 정도

#### • KL Divergence

for 2 prob distributions  $p(x), q(x)$ , KL divergence is as follows;

##### a) Continuous

$$D_{KL}(p \parallel q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

##### b) Discrete

$$D_{KL}(p \parallel q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)}$$

#### • Properties

- 다들 꼭 알아야 하겠음

-  $p=q$  일때  $D_{KL}(p \parallel q) = 0 \rightarrow \text{minimum value}$

- Symmetric 아니지.  $D_{KL}(p \parallel q) \neq D_{KL}(q \parallel p)$

## \* KL Divergence와 MLE (KL Divergence에서 어떻게 MLE식이 유도되지?)

$p_*(x)$ : 실제 모집단 분포

$D = \{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}\}$ :  $p_*(x)$ 에서 추출한 sample

$p_\theta(x)$ :  $\theta$ 로 잘라놓은, 모집단 특성을 가려 모델링한 분포

목표?  $p_\theta(x)$ 를  $p_*(x)$ 에 최대한 가깝게 만들자

$$\Leftrightarrow \text{minimize } D_{KL}(p_* \| p_\theta) = \int p_*(x) \log \frac{p_*(x)}{p_\theta(x)} dx$$

그러나  $p_*(x)$ 를 통해 알 수 없다. "몬테카를로 방법"을 통해

$D_{KL}(p_* \| p_\theta)$ 를 근사할 것임.

☆

$$\text{MLE} : \log \prod_{n=1}^N p_\theta(x^{(n)}) = \sum_{n=1}^N \log p_\theta(x^{(n)})$$

$$\text{Find } \hat{\theta} \text{ which satisfies, } \hat{\theta} = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{n=1}^N \log p_\theta(x^{(n)})$$

## "Monte Carlo"

- 무작위 수를 이용하여 복잡한 확률분포나 계산값의 근사값을 구하는 방법

· 가산 근사 방법 (with monte carlo)

$$E_{p_*(x)}[f(x)] = \int p_*(x) f(x) dx \text{ 에서 } \dots \textcircled{1}$$

1) 확률분포  $p_*(x)$ 에 따라 샘플  $\{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}\}$ 을 추출

2) 각  $x^{(i)}$ 에 대해  $f(x^{(i)})$  구하고 평균 구하기

①에서 1), 2)를 시행

$$E_{p_*(x)}[f(x)] = \int p_*(x) f(x) dx \\ \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x^{(n)}) \quad (x^{(n)} \sim p_*(x))$$

## " $D_{KL}(p_* \| p_\theta)$ monte carlo 근사 & MLE induction"

$D_{KL}(p_* \| p_\theta)$ 도 계산값 식이 필요 볼 수 있음.

$$D_{KL}(p_* \| p_\theta) = \int p_*(x) \log \frac{p_*(x)}{p_\theta(x)} dx$$

$\log \frac{p_*(x)}{p_\theta(x)}$ 를  $f(x)$ 라 하면  $\dots \rightarrow$  monte carlo 근사

$$\approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log \frac{p_*(x^{(n)})}{p_\theta(x^{(n)})} \quad (x^{(n)} \sim p_*(x))$$

$$\approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\log p_*(x^{(n)}) - \log p_\theta(x^{(n)})) \dots \textcircled{2}$$

②  $\hat{=}$  Minimize

$$\begin{aligned}\arg\min_{\theta} D_{KL}(P_* \parallel P_{\theta}) &\approx \arg\min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (\log P_{\theta}(x^{(n)}) - \log P_{\theta}(x^{(n)})) \\ &= \arg\min_{\theta} -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(x^{(n)}) \\ &= \arg\min_{\theta} -\sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(x^{(n)}) \\ &= \arg\max_{\theta} \sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(x^{(n)})\end{aligned}$$

$$\therefore \arg\min_{\theta} D_{KL}(P_* \parallel P_{\theta}) \approx \arg\max_{\theta} \underbrace{\sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(x^{(n)})}_{L_{MLE}}$$

\* Review :  $p(x)$  for model containing latent variable

$p(x)$ 가 줄는 대신에 MLE 식이  $\sum \log \sum$  log-sum 형태를 가짐  $\rightarrow$  최적화  $\arg\max L(D; \theta)$ 를  
만들면  $\theta$ 를 최적화할 수 없음


So, we use EM algorithm to find  $\theta$  maximizing  $L(D; \theta)$

$$L(D; \theta) = \sum_{n=1}^N \log p(x^{(n)})$$

# Generalization of EM for model with latent variable $Z$

\* EM algorithm for "single" data  $x$ .

E - M  
(expectation) (Maximize)



이렇게  $\log P_\theta(x)$ 가 복잡한 이유는  $P_\theta(x)$ 가  $z$ 를 포함하기 때문.

$\log P_\theta(x) = \log \sum_z P_\theta(x, z)$  에서  $z$ 를 곱해주는 것이 목표!

$$\log P_\theta(x) = \log \frac{P_\theta(x, z)}{P_\theta(z|x)} \quad (\text{공변량 } p(x, y) = p(x|y)p(y)) \Rightarrow \log P_\theta(x) \text{ 변형}$$

$$\log \frac{P_\theta(x, z)}{P_\theta(z|x)} \text{ 에서 } P_\theta(z|x) = \frac{P_\theta(z, x)}{P_\theta(x)} = \frac{P_\theta(z, x)}{\sum_z P_\theta(x, z)} \text{ 로 여전히 } z \text{를 가지고 있음} \dots, \log\text{-sum이 취하고 있음.}$$

Solution 1:  $P_\theta(z|x)$ 의 근사값으로 임의의 쿼리점  $q(z)$ 를 이용.

$$\begin{aligned} \log P_\theta(x) &= \log \frac{P_\theta(x, z)}{P_\theta(z|x)} \times \underbrace{\frac{q(z)}{q(z)}}_1 \\ &= \log \frac{P_\theta(x, z)}{q(z)} \times \frac{q(z)}{P_\theta(z|x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \log \frac{P_\theta(x, z)}{q(z)} + \log \frac{q(z)}{P_\theta(z|x)} \quad \text{② 아래 } P_\theta(z|x) \text{가 남아있음 (문제)} \\ &\quad \text{① } P_\theta(z|x) \text{를 } q(z) \text{로 바꿈. (ok)} \end{aligned}$$

Solution 2: ②번 항은 KL 식으로 바꿔주기

$$\begin{aligned} \log P_{\theta}(x) &= \log P_{\theta}(x) \sum_z q(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum q(z) \log P_0(x) \quad \text{Sol 10000 이걸 4} \\
 &= \sum q(z) \left( \log \frac{P_0(x, z)}{q(z)} + \log \frac{q(z)}{P_0(z|x)} \right) \quad \text{KL2 이걸 1} \\
 &= \sum q(z) \log \frac{P_0(x, z)}{q(z)} + \sum q(z) \log \frac{q(z)}{P_0(z|x)} \\
 &= \sum q(z) \log \frac{P_0(x, z)}{q(z)} + D_{KL}(q(z) \parallel P_0(z|x))
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  ①, ② 가디나도  $\log$ - $\Sigma$  형태가 됨!

$\therefore$  for single data  $x$ ,

$$\log P_{\theta}(x) = \sum_z q(z) \log \frac{P_{\theta}(x, z)}{q(z)} + D_{KL}(q(z) \parallel P_{\theta}(z|x))$$

(latent variable  $z$ 가 있는 모델에 대해  $\log P_{\theta}(x)$ 를  $\log - \sum_i$ 이 아닌 형태로 두 항으로 쪼개기)

\* ELBO

$D_{KL} \geq 0$  임을 이용하면,  
 $\log P_\theta(x) \geq \sum_z q(z) \log \frac{P_\theta(x, z)}{q(z)}$  가 성립함.

①는 항상  $\log p_\theta(x)$ 의 하한임. (증해한)

이때, ①은 ELBO항이라 근함.

$$\text{ELBO}(x; q, \theta) = \sum_z q(z) \log \frac{p_\theta(x, z)}{q(z)}$$

$$\textcircled{1} \text{ ELBO}(x; f, \theta) \leq \log P_{\theta}(x)$$

② Sum-log form: 해석적인 최적화 가능.

$\Rightarrow$  ①, ②에 대해  $ELBO(x; \theta) \approx \text{maximize}$  하거나  $\log P_\theta(x)$ 를 직접. 이걸  $\epsilon$ -M algorithm

## \* ELBO( $x; q, \theta$ ) optimization : E-M

$q, \theta$ 를 차례번에 최적화하는 것이 어려움.  $\Rightarrow$  하나씩씩 갱신.

E:  $\theta$  fix,  $q(z)$  update  
M:  $\theta$  update,  $q(z)$  fix

E: 가끔씩 ELBO를  $\log P_\theta(x)$ 에 맞추기. ( $\theta$  fix,  $q(z)$  update)

$$\log P_\theta(x) = \overset{①}{\text{ELBO}(x; q, \theta)} + \overset{②}{D_{KL}(q(z) \parallel P_\theta(z|x))}$$

①+②는 항상 고정 ②를 0으로 만들기 위해 ELBO( $x; q, \theta$ ) =  $\log P_\theta(x)$ 를 만들기

How?


for  $\theta = \theta_{\text{old}}$  (fix)

$q(z) = P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)$ 를 만들어서  $q$ 를 update.

$$\begin{aligned} \text{ELBO}(x; q = P_{\theta_{\text{old}}}(z|x), \theta) &= \sum_z q(z) \log \frac{P_\theta(x, z)}{q(z)} \\ &= \sum_z P_{\theta_{\text{old}}}(z|x) \log \frac{P_\theta(x, z)}{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \end{aligned}$$

$$= E_{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \left[ \log \frac{P_\theta(x, z)}{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \right]$$

$\hookrightarrow q(z) = P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)$  밑에 가끔씩으로 표현해서 E-step이라 부름.



$$E_{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \left[ \log \frac{P_\theta(x, z)}{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \right] = \log P_\theta(x) \text{ 인 지점. } (\theta_{\text{old}} \text{ 고정, } q \text{ update를 통해})$$

$\hookrightarrow$  Expectation 형식으로 표현된 ELBO

M: Maximize ELBO using  $\theta$ .

- ①  $q$  fix,  $\theta$  update
- ②  $\arg \max_{\theta} \text{ELBO}(x; q, \theta)$

$$\frac{1}{\partial \theta} \text{ELBO}(x; q = P_{\theta_{\text{old}}}(z|x), \theta) = \frac{1}{\partial \theta} E_{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \left[ \log \frac{P_{\theta}(x, z)}{P_{\theta_{\text{old}}}(z|x)} \right] = 0$$

앞의 E-step-3 기반 식에 대해  $\theta$  편미분  $\approx 0$  이 되는 지점 찾아서 Maximize

★ 정리

- E:  $q(z)$  update  $\rightarrow \text{ELBO}(x; q, \theta) = \log P_{\theta}(x)$
- M:  $\theta$  update  $\rightarrow \text{ELBO}$  최대화를 통해 간접적으로  $\log P_{\theta}(x)$  높이기 ( $\log P_{\theta}(x) \geq \text{ELBO}(x; q, \theta)$ )


Property)

$$\log p(x; \theta_{\text{new}}) \geq \log p(x; \theta_{\text{old}})$$

- With EM update, the  $\log$  likelihood  $P_{\theta}(x)$  is monotonously increasing.
- Iteratively conduct EM until the increase of  $\log$ -likelihood is below the threshold. (or the updated amount is below the threshold)

\* ELBO in Graph


① E




$$E_{P_{\theta_{old}}(z|x)} \left[ \log \frac{P_{\theta}(x,z)}{P_{\theta_{old}}(z|x)} \right] = \log P_{\theta}(x) \text{ 인 지점. } (\theta_{old} \text{ 지점, } q \text{ update를 통해})$$
  
↳ Expectation ~~평균~~ ~~이론~~ ELBO

"Iterate E-M!"

② M



③ E



update  $q: ELBO(x; q = P_{\theta_{old}}(x|z), \theta)$



## \* EM Algorithm for "Multiple datas"

$$D = \{x^{(1)}, x^{(2)} \dots x^{(N)}\}$$

$$Q = \{q^{(1)}, q^{(2)} \dots q^{(N)}\} \Rightarrow q^{(n)} \text{ corresponding to each data } x^{(n)}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(D) &= \sum_{n=1}^N \log \sum_{z^{(n)}} p_{\theta}(x^{(n)}, z^{(n)}) \stackrel{\text{latent variable } z \text{ corresponding to } n^{\text{th}} \text{ data } x^{(n)}}{\geq} \sum_{n=1}^N \text{ELBO}(x^{(n)}; q^{(n)}, \theta) \\ &= \sum_{n=1}^N \sum_{z^{(n)}} q^{(n)}(z^{(n)}) \log \frac{p_{\theta}(x^{(n)}, z^{(n)})}{q^{(n)}(z^{(n)})} \quad (q^{(n)}(z^{(n)}) : z^{(n)} \text{ latent variable's distribution}) \end{aligned}$$

Single data  $x$  이 대안 E-M에서 E 단계의 확률  $q(z)$ 는  $q(z) = p_{\theta}(z|x)$  (KL 항 0이므로  $\rightarrow \text{ELBO} = \log p_{\theta}(x)$ )



Multiple이라면  $q^{(n)}(z^{(n)}) = p_{\theta}(z^{(n)}|x^{(n)}) \Rightarrow N$ 개의 equation 나옴.

테이터  $N$ 개에 대한 E-M 알고 판단? mean log-likelihood를 증가함.

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log p_{\theta}(x^{(n)}; \theta)$$

\* 정리


1) E: fix  $\theta$ , update each  $q^{(n)}(z^{(n)}) = p_{\theta}(z^{(n)}|x^{(n)})$

2) M: fix  $\{q^{(1)}(z^{(1)}), \dots, q^{(N)}(z^{(N)})\}$ , update  $\theta : \arg \max_{\theta} \sum_{n=1}^N \text{ELBO}(x^{(n)}; q^{(n)}, \theta)$

1), 2) iterate until the mean log-likelihood increase is below the threshold

# EM for Gaussian Mixture Model (GMM)

## \* GMM review



$\log P_{\theta}(x)$  for GMM

$$p(x; \theta) = \sum_{j=1}^k p(x, z=j; \theta) \quad (\text{marginalization})$$

$$= \sum_{j=1}^k p(z=j; \theta) p(x|z=j; \theta)$$

$$= \sum_{j=1}^k \phi_j N(x; u_j, \Sigma_j)$$

# \* EM

$D = \{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}\}$  sampled from GMM: sample

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(x^{(n)}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log \sum_{j=1}^K \phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j) : \text{mean log-likelihood, a criteria for termination of EM}$$

• E:  $\theta$  fix,  $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$  update. (ELBO approximation to  $\log P_{\theta}(x^{(n)})$ )

$KL=0 \iff \text{true}$

$$q^{(n)}(z^{(n)}=k) = p_{\theta}(z^{(n)}=k | x^{(n)}) \quad (q^{(n)}(z^{(n)}) = p_{\theta}(z^{(n)} | x^{(n)}) \text{ on } z^{(n)}=k)$$

$$= \frac{P_{\theta}(x^{(n)}, z^{(n)}=k)}{P_{\theta}(x^{(n)})}$$

marginalize  
 $\sum_j P_{\theta}(x^{(n)}, z^{(n)}=j)$

$$= \frac{\phi_k N(x^{(n)}; \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_j \phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j)}$$

abbreviation:  $q^{(n)}(z^{(n)}=k) \rightarrow q^{(n)}(k)$

$\therefore$  for all  $n, k$  (for all possible  $n$  datas and all possible latent variables)

renew  $q^{(n)}(z^{(n)}=k)$  to ...

$$q^{(n)}(z^{(n)}=k) (= q^{(n)}(k)) = \frac{\phi_k N(x^{(n)}; \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_j \phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j)}$$

•  $M : Q = \{q^{(1)}(z^{(1)}), q^{(2)}(z^{(2)}) \dots q^{(N)}(z^{(N)})\}$  fix,  $\theta = \{\phi, \mu, \Sigma\}$  update. (ELBO maximize)

ELBO for  $D = \{x^{(1)}, x^{(2)} \dots x^{(N)}\}$

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=1}^N \text{ELBO}(x^{(n)}; q^{(n)}, \theta) \\
 &= \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(z^{(n)}=j) \log \frac{p_{\theta}(x^{(n)}, z^{(n)}=j)}{q^{(n)}(z^{(n)}=j)} \\
 &= \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K \overset{q^{(n)}(j)}{q^{(n)}(j)} \log \frac{\phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j)}{q^{(n)}(j)} \\
 &= \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log \phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j) - \underbrace{\sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log q^{(n)}(j)}_{\text{not containing } \theta = \{\phi, \mu, \Sigma\} : \text{ignore}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{The objective function is } J(\phi, \mu, \Sigma) &= \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log \phi_j N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j) \\
 &= \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) (\log \phi_j + \log N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j))
 \end{aligned}$$

Purpose: find  $\theta$  which satisfies  $\arg\max_{\theta} J(\theta)$ , where  $\theta = \{\phi, \mu, \Sigma\}$

How? : find  $\frac{\partial J}{\partial \mu} = 0$ ,  $\frac{\partial J}{\partial \Sigma} = 0$ ,  $\frac{\partial J}{\partial \phi} = 0$  and update  $\mu, \Sigma, \phi$  stepwisely.

Where,

$$\mu = \{\mu_1, \mu_2 \dots \mu_k\}, \Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2 \dots \Sigma_k\}, \phi = \{\phi_1, \phi_2 \dots, \phi_k\}$$

$$1) \frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mathbf{u}} \quad (\mathbf{u} = \{u_1, u_2, \dots, u_K\})$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial u_k} = \frac{\partial}{\partial u_k} \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) (\log \phi_j + \log N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j))$$

$$= \frac{\partial}{\partial u_k} \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j)$$

$$= \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \frac{\partial}{\partial u_k} \log N(x^{(n)}; u_k, \Sigma_k)$$

대변량 정보량에 따른 변화에 대한 미분.

$$* \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \log N(\mathbf{x}; \mathbf{u}, \Sigma) = \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{u})$$

$$= \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \Sigma_k^{-1} (x^{(n)} - u_k)$$

$$\therefore \frac{\partial \mathcal{J}}{\partial u_k} = \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \Sigma_k^{-1} (x^{(n)} - u_k)$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial u_k} = 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \Sigma_k^{-1} (x^{(n)} - u_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_k \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \Sigma_k^{-1} (x^{(n)} - u_k) = 0 \times \Sigma_k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \Sigma_k \Sigma_k^{-1} (x^{(n)} - u_k) = 0 \quad (q^{(n)}(k) \text{ is a scalar})$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) (x^{(n)} - u_k) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) u_k = \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) x^{(n)}$$

$$\Leftrightarrow u_k \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) = \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) x^{(n)}$$

$$\Leftrightarrow u_k = \frac{\sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) x^{(n)}}{\sum_{n=1}^N q^{(n)}(k)}$$

$$\therefore u_k \text{의 미분} \quad u_k = \frac{\sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) x^{(n)}}{\sum_{n=1}^N q^{(n)}(k)} \Rightarrow \text{이름 } u_1, u_2, \dots, u_K \text{에 대한 미분.}$$

$$2) \frac{\partial F}{\partial \Sigma} \quad (\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_k\})$$

[ abbreviate mid - process ]

$$\frac{\partial F}{\partial \Sigma_k} = 0 \Leftrightarrow \Sigma_k = \frac{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k) (x^{(n)} - u_k) (x^{(n)} - u_k)^T}{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k)} \quad \dots \textcircled{1} \quad \left( \text{이때 } u_k \text{는 } \frac{\partial L}{\partial u_k} = 0 \text{ 이 때 구한 } u_k \right)$$

$\textcircled{1}$  의 과정을  $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_k$  에 대해 진행.

# \* Lagrange Multiplier Method

제약조건이 존재할 때 최적화 문제 : Lagrange Multiplier Method

$f(x, y)$  optimization under constraint  $g(x, y) = 0$

main idea) objective function  $f$ 과 constraint function  $g$ 의 값이 같을 때 최적해 존재

$\therefore \nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$  일때  $f(x, y)$ 의 극값 존재

Let  $L(x, y, \lambda) : f(x, y) - \lambda g(x, y)$

↗ lagrange multiplier

(tip) 제약조건이 여러개?  $\lambda$ 도 여러개  $\{\lambda_1, g_1(x, y)\}$

$\{\lambda_2, g_2(x, y)\}$

↙ lagrangian

• 최적해 찾는 방법

① lagrangian 함수 정의

② 목적함수  $f$ 와  $\lambda$ 에 대해 편미분  $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ 이 되는 식들에 대해 연립방정식 풀이.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

ex) Minimize  $f(x, y) = x^2 + y^2$ , where constraint  $x + y = 1$ .

① Lagrange function

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) \\ = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 1)$$

↗  $g(x, y) = 0$  이므로!

② 편미분

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

$$2x - \lambda = 0 \dots ①$$

$$2y - \lambda = 0 \dots ②$$

$$-(x + y - 1) = 0 \dots ③$$

$$2x = \lambda, 2y = \lambda, x + y = 1$$

$$x = y \quad (①, ②)$$

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}, \lambda = 1 \quad ③$$

$\therefore f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 일때 최적해가 존재!

$$3) \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \phi} \quad (\phi = \{\phi_1, \phi_2 \dots \phi_k\})$$

$$\mathcal{J}(\phi, u, \mathcal{Z}) = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) (\log \phi_j + \log N(x^{(n)}; \mu_j, \Sigma_j)) \quad \text{이제 } \phi \text{에 관련된 항은 아래와 같다.}$$

$$\sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log \phi_j \quad (\phi \text{에 대해 미분할 때 관련항} \dots \textcircled{A})$$

But,  $\phi$ 에 대한  $\mathcal{J}(\phi, u, \mathcal{Z})$  적혀있는 constraint가 없음.

$$\text{constraint} : \sum_{j=1}^K \phi_j = 1$$

$$\textcircled{1} \text{ objective function } f(\phi) = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log \phi_j$$

$$\textcircled{2} \text{ constraint function } g(\phi) = \sum_{j=1}^K \phi_j - 1$$

$$\mathcal{L} : f(\phi) - \lambda g(\phi)$$

$$\mathcal{L} = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K q^{(n)}(j) \log \phi_j + \beta \left( \sum_{j=1}^K \phi_j - 1 \right)$$

$$\begin{aligned} 1) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_k} &= \sum_{n=1}^N q^{(n)}(k) \frac{\partial}{\partial \phi_k} \log \phi_k + \beta \quad \left( \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_1} = 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_2} = 0 \right. \\ &\quad \left. \dots \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_k} = 0 \text{에 대해} \dots \right) \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{q^{(n)}(k)}{\phi_k} + \beta \end{aligned}$$

$$2) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = \sum_{j=1}^K \phi_j - 1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^K \phi_j = 1$$

$$\therefore \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_k} = 0 \Leftrightarrow \phi_k = \frac{\sum_{n=1}^N q^{(n)}(k)}{-\beta} \dots \textcircled{1}$$

$$\Rightarrow \text{총 } k+1 \text{개의 방정식} : \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_1} = 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_2} = 0 \dots \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_k} = 0, \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \beta} = 0$$



·  $\phi_k = 2$ 에 대입

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_K$ 에

대입  $\frac{\partial L}{\partial \phi_j} = 0$ 을 풀 수

$$\sum_{j=1}^K \phi_k = 1$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=1}^K \frac{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(j)}{-\beta} = 1$$

$$\Leftrightarrow -\beta = \sum_{j=1}^K \sum_{n=1}^N f^{(n)}(j)$$

$$\Leftrightarrow -\beta = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^K f^{(n)}(j)$$

↪ 1

$$\Leftrightarrow -\beta = N$$

$-\beta = N$ 을 ①에 대입하면 ②를 찾아주는  $\phi_k$ 를 구할 수 있음.

$$\therefore \phi_k = \frac{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k)}{N}$$

## \* EM in GMM summary

① E

$$\text{for } n, k, \quad f^{(n)}(k) = \frac{\phi_k N(x^{(n)}; u_k, \sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \phi_j N(x^{(n)}; u_j, \sigma_j)}$$

③ Iterate ①, ② step until mean-log-likelihood increase amount is below threshold!

② M

for each  $k$ ,

$$\phi_k = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f^{(n)}(k)$$

$$u_k = \frac{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k) x^{(n)}}{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k)}$$

$$\Sigma_k = \frac{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k) (x^{(n)} - u_k)(x^{(n)} - u_k)^T}{\sum_{n=1}^N f^{(n)}(k)}$$

$$\text{Mean log-likelihood} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \log \sum_{j=1}^K \phi_j N(x^{(n)}; u_j, \sigma_j)$$