

CLASE 02

Más sobre esperanza condicional

Fijado (Ω, \mathcal{F}, P) .

Lema: Sean X integrable, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ sub. σ -ál. y ξ limitada ($\exists M > 0$ tq $|\xi| \leq_{a.s.} M$)

\mathcal{G} -medible. then $E[X\xi | \mathcal{G}] \stackrel{a.s.}{=} \xi E[X | \mathcal{G}]$.

Proof:

Comenzamos con ξ simple y procedemos de manera usual.

EJER: Para $X: \Omega \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ medible positiva, también podemos definir $E[X | \mathcal{G}]$ como la clase (identificadas por $\stackrel{a.s.}{=}$) de v.a. en $\bar{\mathbb{R}}$, positivas.

Lema (Jensen): Sea X integrable, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ sub. σ -ál. y $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow [0; +\infty]$ convexa. Then, $\varphi(E[X | \mathcal{G}]) \leq E[\varphi(X) | \mathcal{G}]$ a.s. .

Proof:

Defina $\Delta_\varphi := \{T_{a,b} : T_{a,b}(x) \leq \varphi(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$,
donde $T_{a,b} := a(\cdot) + b$; $a, b \in \mathbb{Q}$.

Como ψ es convexa, Δ_ψ es no vacío.

Más aún, $\psi(x) = \sup_{T \in \Delta_\psi} T(x)$.

Luego, para cada $T \in \Delta_\psi$: $T(x) \leq \psi(x)$.

$$\Rightarrow \underbrace{E[T(x) | \mathcal{G}]}_{\substack{\text{a.s.} \\ T(E[x | \mathcal{G})]}} \leq E[\psi(x) | \mathcal{G}] =: W$$

$$\underbrace{T(E[x | \mathcal{G}])}_Z \stackrel{\text{a.s.}}{\leq} W, \text{ por ser } T \text{ op. lineal.}$$

Es decir, existe medible Ω_T con proba. 1 en el cual $W(\omega) \geq T(Z(\omega))$, $\forall \omega \in \Omega_T$.

Así, tenemos una cantidad enumerable de medibles Ω_T , $\forall T \in \Delta_\psi$, con proba. 1.

Considere $\omega \in \bigcap_{T \in \Delta_\psi} \Omega_T =: \Omega^*$, $P(\Omega^*) = 1$.

$$\Rightarrow W(\omega) \geq T(Z(\omega)), \forall T \in \Delta_\psi.$$

$$\Rightarrow W(\omega) \geq \left(\sup_{T \in \Delta_\psi} T \right)(Z(\omega)) = \psi(Z(\omega)) \quad \checkmark$$

Martingalas (introducción)

Def: Dada (Ω, \mathcal{F}, P) y $M_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,
 $n = 1, 2, 3, \dots$ (puede variar), y

$\{G_1 \subseteq G_2 \subseteq \dots \subseteq F\}$, sub. σ -álgebras.
→ **filtración**

Es decir, (M_n, G_n) , $n=1,2,3,\dots$, es una **martingala** si:

1) M_n es G_n -medible ((M_n) está adaptada a (G_n)), $\forall n$.

2) M_n es integrable, $\forall n$.

3) $\forall n, m$ tq $1 \leq n < m$, se tiene

$$M_n = E[M_m | G_n].$$

Obs: Para verificar 3), basta se cumpla $M_n = E[M_{n+1} | G_n] \forall n$. En efecto,

$$\begin{aligned} E[M_m | G_n] &= E[\underbrace{\dots E\{\underbrace{E[M_m | G_{m-1}] | G_{m-2}}_{M_{m-1}} \dots}_{M_{m-2}} | G_n] \\ &= M_n. \end{aligned}$$

Además, recordemos que $M_n = E[M_m | G_n]$ equivale a:

$$\forall A \in G_n : E[M_n \cdot 1_A] = E[M_m \cdot 1_A], \text{ o sea,}$$

$$E[(M_m - M_n) \cdot 1_A] = 0, \forall A \in G_n.$$

Esto podemos denotarlo como $M_m - M_n \perp G_n$.

Ejemplos: Si (Ω, \mathcal{F}, P) , $\xi_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $n=1, 2, \dots$ son independientes, integrables y de media cero, entonces:

- $S_n := \sum_{i=1}^n \xi_i$, $n=1, 2, \dots$
- $G_n := \sigma(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$

(S_n, G_n) es una martingala. En efecto, para $A \in G_n$:

$$E[(S_m - S_n) \cdot 1_A] = E\left[\sum_{j=n+1}^m \xi_j \cdot 1_A\right]$$

independiente de G_n

$$= E\left[\sum_{j=n+1}^m \xi_j\right] E[1_A] = 0 \cdot E[1_A], \text{ pues cada } \xi_j \text{ tiene media cero.}$$

Si por ejemplo $\xi_j \begin{cases} \nearrow +1 \\ \searrow -1 \end{cases}$, con prob $1/2$,
" " " "

entonces $S_n := \sum_{j=1}^n \xi_j$, $n \geq 1$, es una martingala.

Además, $P\{S_n \text{ converge a un real}\} = 0$.

De hecho, $P\{\limsup S_n = +\infty\} = 1 = P\{\liminf S_n = -\infty\}$

so $P\{\limsup S_n = +\infty, \liminf S_n = -\infty\} = 1$.

EJER: Si ξ_1, ξ_2, \dots indep. integrables, de $E[\xi_j] = 1, \forall j$; entonces:

- $M_n := \xi_1 \cdot (\dots) \cdot \xi_n$
 - $G_n := \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$
- $\Rightarrow (M_n, G_n)$ es una martingala.

Ejemplo: Fijemos una medida de probabilidad μ en $\{0, 1, 2, \dots\}$. **Branching process, o, Proceso de Galton-Watson.**

Fijemos una familia de variables $\{\xi_{jk} : j = 1, 2, \dots; k = 1, 2, \dots\}$ definidas sobre (Ω, \mathcal{F}, P) , independientes, con $\xi_{jk} \sim \mu, \forall j, k$. Ahora, definimos el proceso:

- $Z_0 = 1$
- $Z_1 = \xi_{1,1}$
- $Z_2 = \sum_{k=1}^{Z_1} \xi_{2k} \quad (0, Z_2 = 0 \text{ cuando } Z_1 = 0)$
- $Z_3 = \sum_{k=1}^{Z_2} \xi_{3k} \quad (0, Z_3 = 0 \text{ cuando } Z_2 = 0)$

μ se denomina **offspring distribution**.

Vemos que $\{Z_1 = 0\} \subseteq \{Z_2 = 0\} \subseteq \{Z_3 = 0\} \subseteq \dots$.

Así, $\{Z_n = 0\} \uparrow$ la extinción.

Problema: $P(\text{extinción}) = ?$

Defina $m = \sum_{i=0}^{\infty} i \mu(i)$.

ESER:

- $m < 1 \Rightarrow P(\text{extinción}) = 1$.
- $m > 1 \Rightarrow P(\text{extinción}) < 1$.
- $m = 1 \Rightarrow (Z_n)$ es martingala.

