

本部高等数学 A (一) 期末考试试卷二

一、选择题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、试确定当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列哪一个无穷小量是关于 x 的 3 阶无穷小 ()。

- (A) $\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}$ (B) $\sqrt{a+x^3} - \sqrt{a}$ ($a > 0$ 是常数)
(C) $x^3 + 0.0001x^2$ (D) $\sqrt[3]{\tan x}$

答案: B。考点: 无穷小的阶。

解答: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = -1$, 故 A 是 x 的 $\frac{1}{2}$ 阶无穷小; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+x^3} - \sqrt{a}}{x^3}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x^3) - a}{x^3(\sqrt{a+x^3} + \sqrt{a})} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$, 故 B 是 x 的 3 阶无穷小; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 0.0001x^2}{x^2} = 0.0001$,
故 C 是 x 的 2 阶无穷小; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\tan x}}{x^{\frac{1}{3}}} = 1$, 故 D 是 x 的 $\frac{1}{3}$ 阶无穷小。

注: (1) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{x^k} = C$ ($C \neq 0, k > 0$), 则称当 $x \rightarrow 0$ 时, α 为 x 的 k 阶无穷小。

(2) 两个无穷小的和、差的阶取其最小者, 两个无穷小的乘积的阶取二者阶的和。

2、 $d\left(\arctan \frac{1}{x}\right) =$ ()。

- (A) $-\frac{1}{1+x^2} dx$ (B) $\frac{1}{1+x^2} dx$ (C) $\frac{x}{1+x^2} dx$ (D) $-\frac{x^2}{1+x^2} dx$

答案: A。考点: 微分的计算。

解答: $d\left(\arctan \frac{1}{x}\right) = \left(\arctan \frac{1}{x}\right)' dx = \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx = -\frac{1}{1+x^2} dx$ 。

3、设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则 $x = a$ 为 ()。

- (A) $f(x)$ 的极大值点 (B) $f(x)$ 的极小值点
(C) 不是 $f(x)$ 的驻点 (D) $f(x)$ 的驻点但不是极值点

答案: A。考点: 极值的定义, 函数取得极值的条件。

解答: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1 < 0$, 则由极限的局部保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in \overset{\circ}{U}(a, \delta)$ 时,

有 $\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} < 0$, $f(x)-f(a) < 0$ 。即当 $x \in \overset{O}{U}(a, \delta)$ 时, $f(x) < f(a)$ 。由极值的定义

可知 $x = a$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点。又 $-1 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{x-a}$, 故分子

的极限存在且等于 0, 即 $f'(a) = 0$, $x = a$ 是 $f(x)$ 的一个驻点。

4、设 $f(x) = x^3 + x$, 则定积分 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 的值等于 ()。

- (A) 0 (B) 8 (C) $\int_0^2 f(x) dx$ (D) $2 \int_0^2 f(x) dx$

答案: A。考点: 定积分的对称性。

解答: $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上连续且为奇函数, 则 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上的积分等于 0。

5、微分方程 $2y'' + 5y' = \cos 2x$ 的一个特解应具有形式 ()。

- (A) $A \cos 2x + B \sin 2x$ (B) $Ax + B \cos 2x + C \sin 2x$
(C) $A + B \cos 2x$ (D) $Ax^2 + B \cos 2x + C \sin 2x$

答案: A。考点: 二阶常系数非齐次线性微分方程的待定系数法。

解答: 该方程右端可写为 $f(x) = e^{0x}(1 \cdot \cos 2x + 0 \cdot \sin 2x)$, 且对应齐次方程的特征方程为

$2r^2 + 5r = 0$, $\lambda = 0$, $\omega = 2$, $\lambda \pm i\omega$ 不是特征方程的根, 故可设该非齐次方程的特解为

$y^* = x^0 \cdot e^{0x}(a \cdot \cos 2x + b \cdot \sin 2x) = a \cos 2x + b \sin 2x$, 其中 a 、 b 为常数。

二、填空题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1、微分方程 $\frac{1}{x} y'' = \frac{1}{1+x^2}$ 的通解是_____。

答案: $y = \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) - x + \arctan x + C_1 x + C_2$ 。考点: 可降阶的高阶方程。

解答: $y'' = \frac{x}{1+x^2}$, 两边同时积分, $y' = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1$, 两边再次同时积分, 可得

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) dx + C_1 x \stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \int x d \ln(1+x^2) + C_1 x \\ &= \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \int \frac{x}{1+x^2} \cdot 2x dx + C_1 x = \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) - \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx + C_1 x \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}x \ln(1+x^2) - (x - \arctan x) + C_1x + C_2 = \frac{1}{2}x \ln(1+x^2) - x + \arctan x + C_1x + C_2$$

2、设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^x f(t)dt = x(1 + \cos x)$, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $1 - \frac{\pi}{2}$ 。考点: 变限积分的导数公式。

解答: $\int_0^x f(t)dt = x(1 + \cos x)$, 两边同时求导, $f(x) = (1 + \cos x) - x \sin x$, 则

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(1 + \cos \frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{2}。$$

3、设 $y = \cos(2x-1) + \arctan x$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $-2 \sin(2x-1) + \frac{1}{1+x^2}$ 。考点: 导数的运算法则。

解答: $\frac{dy}{dx} = y' = -\sin(2x-1) \cdot 2 + \frac{1}{1+x^2} = -2 \sin(2x-1) + \frac{1}{1+x^2}$ 。

4、设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\frac{e^y}{1-xe^y}$ 或 $\frac{e^y}{2-y}$ 。考点: 隐函数求导法。

解答: 在方程 $y = 1 + xe^y$ 的两边同时对 x 求导, 注意 y 是 x 的函数, 于是

$$y' = e^y + xe^y \cdot y', \quad y' = \frac{e^y}{1-xe^y} = \frac{e^y}{1-(y-1)} = \frac{e^y}{2-y}。$$

5、 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2^x + 3^x}{5} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 0。考点: 极限的运算法则

解答: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 括号里趋向 $\frac{2}{5}$, 指数趋向 $+\infty$, 由指数函数图像可知该极限为 0。

三、计算题 (本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

1、求不定积分: $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$ 。

考点: 不定积分的分部积分法。

解答: $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx = \int e^{2x}[(\tan^2 x + 1) + 2 \tan x] dx = \int e^{2x}[\sec^2 x + 2 \tan x] dx$
 $= \int e^{2x} \cdot \sec^2 x dx + 2 \int e^{2x} \tan x dx = \int e^{2x} d \tan x + 2 \int e^{2x} \tan x dx$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{\text{分部积分}}{=} \left(e^{2x} \tan x - \int \tan x d e^{2x} \right) + 2 \int e^{2x} \tan x dx \\
& = \left(e^{2x} \tan x - \int \tan x \cdot 2e^{2x} dx \right) + 2 \int e^{2x} \tan x dx + C = e^{2x} \tan x + C.
\end{aligned}$$

2、求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{x}{1+\ln x}}$ 。

考点：洛必达法则，极限的四则运算。

$$\begin{aligned}
& \text{解答：当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时， } \ln x \rightarrow -\infty, \quad \frac{1}{1+\ln x} \rightarrow 0. \quad \text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \\
& = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0, \quad \text{则}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{x}{1+\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{x}{1+\ln x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x \ln x)}{1+\ln x}} = e^{0/0} = 1.$$

3、已知 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

考点：高阶导数。

$$\text{解答： } y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}, \quad \text{于是}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = y'' = \left[(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \right]' = -\frac{1}{2} (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

4、求函数 $y = 2e^x + e^{-x}$ 的极值。

考点：函数的极值。

$$\text{解答：该函数的定义域为 } (-\infty, +\infty), \quad \text{且 } y' = 2e^x - e^{-x} = \frac{2e^{2x} - 1}{e^x}. \quad \text{令 } y' = 0, \quad \text{得驻点}$$

$$x = -\frac{1}{2} \ln 2. \quad \text{当 } x < -\frac{1}{2} \ln 2 \text{ 时, } y' < 0; \quad \text{当 } x > -\frac{1}{2} \ln 2 \text{ 时, } y' > 0. \quad x = -\frac{1}{2} \ln 2 \text{ 是函数}$$

$$\text{的极小值点, 极小值为 } y\left(-\frac{1}{2} \ln 2\right) = 2e^{-\frac{1}{2} \ln 2} + e^{\frac{1}{2} \ln 2} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

5、计算定积分： $\int_1^e \sin \ln x dx$ 。

考点：定积分的分部积分法。

$$\text{解答： } \int_1^e \sin(\ln x) dx \stackrel{\text{令 } \ln x = t}{=} \int_0^1 \sin t \cdot e^t dt = \int_0^1 \sin t d e^t = e^t \sin t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t d \sin t$$

$$\begin{aligned}
&= e \sin 1 - \int_0^1 \cos t \cdot e^t dt = e \sin 1 - \int_0^1 \cos t d e^t = e \sin 1 - e^t \cos t \Big|_0^1 + \int_0^1 e^t d \cos t \\
&= e \sin 1 - e \cos 1 + 1 - \int_0^1 e^t \sin t dt, \\
\therefore \int_0^1 e^t \sin t dt &= \frac{1}{2}(e \sin 1 - e \cos 1 + 1).
\end{aligned}$$

四、证明题（本题 10 分，共计 1 小题）

设 $a > b > 0$ ，证明： $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$ 。

考点：拉格朗日中值定理。

证明：令 $f(x) = \ln x$ ，易知 $f(x)$ 满足（1） $[b, a]$ 上连续；（2） (b, a) 内可导，由拉格朗日

中值定理，存在 $b < \xi < a$ ，使得 $\frac{\ln a - \ln b}{a - b} = \frac{1}{\xi}$ ，又 $\frac{1}{a} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{b}$ ，故

$$\frac{1}{a} < \frac{\ln a - \ln b}{a - b} < \frac{1}{b}, \text{ 即 } \frac{a-b}{a} < \ln a - \ln b < \frac{a-b}{b}, \text{ 即 } \frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}.$$