

课程名称（含档次）：高等数学 A（二）（本部期末）课程代号：0701000215专业：本部电气、物电等层次（本、专）：本科考试方式：闭卷

一、选择题（本大题总分 20 分，共计 5 小题，每题 4 分）

1. 方程  $x^2 = z$  在空间表示（ ）。A. 两点      B. 母线平行  $x$  轴的柱面      C. 母线平行  $y$  轴的柱面      D. 旋转曲面

答案：C。考点：常见空间二次曲面。

解答：由柱面方程可知，方程  $x^2 = z$  表示是一个以  $zox$  面上的抛物线  $x^2 = z$  为准线、母线平行  $y$  轴的抛物柱面。2. 若  $f(x, x^2) = x^2 e^{-x}$ ， $f'_x(x, x^2) = -x^2 e^{-x}$ ，则  $f'_y(x, x^2) =$ （ ）。A.  $2xe^{-x}$       B.  $(-x^2 + 2x)e^{-x}$       C.  $e^{-x}$       D.  $(2x-1)e^{-x}$ 

答案：C。考点：多元函数的全微分。

解答：由全微分计算公式（全微分等于偏微分叠加），有  $df(x, y) = f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$ 。令  $y = x^2$ ，由多元函数一阶全微分的形式不变性，有

$$df(x, x^2) = f'_x(x, x^2)dx + f'_y(x, x^2)dx^2 = f'_x(x, x^2)dx + 2xf'_y(x, x^2)dx。$$

将已知条件代入，可得

$$(2xe^{-x} - x^2 e^{-x})dx = d(x^2 e^{-x}) = -x^2 e^{-x}dx + 2xf'_y(x, x^2)dx，$$

故  $f'_y(x, x^2) = e^{-x}$ 。3. 曲线弧  $\widehat{AB}$  上的曲线积分和  $\widehat{BA}$  上的曲线积分有关系（ ）。

A.  $\int_{AB} f(x, y)ds = -\int_{BA} f(x, y)ds$       B.  $\int_{AB} f(x, y)ds = \int_{BA} f(x, y)ds$

C.  $\int_{AB} f(x, y)ds + \int_{BA} f(x, y)ds = 0$       D.  $\int_{AB} f(x, y)ds = -\int_{BA} f(-x, -y)ds = 0$

答案：B。考点：第一类曲线积分的性质。

解答：因为被积函数大于等于 0 时，第一类曲线积分在物理上表示是一曲线型构件的质量，

故该型曲线积分与曲线弧的方向无关，即  $\int_{AB} f(x, y)ds = \int_{BA} f(x, y)ds$ 。

4. 若区域  $D$  为  $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ , 则  $\iint_D x e^{\cos(xy)} \sin(xy) dx dy =$  ( )。

- A.  $e$                       B.  $e^{-1}$                       C.  $0$                       D.  $\pi$

答案: C。考点: 二重积分的对称性。

解答: 因为积分区域  $D$  关于  $x$  轴对称, 被积函数  $x e^{\cos(xy)} \sin(xy)$  关于  $y$  是奇函数, 故

$$\iint_D x e^{\cos(xy)} \sin(xy) dx dy = 0。$$

5. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left| 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right|$  (常数  $\alpha > 0$ ) ( )。

- A. 发散                      B. 条件收敛                      C. 绝对收敛                      D. 敛散性与  $\alpha$  有关

答案: C。考点: 绝对收敛与条件收敛。

解答:  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left| 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n}$ , 其绝对值级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n}$ 。又

$$2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n} \leq 2 \cdot \left( \frac{\alpha}{2n} \right)^2 = \frac{\alpha^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2},$$

易知  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2}$  是收敛的 ( $p=2$  的  $p$  级数每项乘以一个正数)。由正项级数的比较审敛法,

绝对值级数  $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n}$  收敛, 故原级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left| 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \right|$  绝对收敛。

二、填空题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  与  $x + z = a$  (其中  $0 < a < R$ ) 的交线在  $xoy$  平面上的投影曲线的方程是\_\_\_\_\_。

答案:  $\begin{cases} x^2 + y^2 + (a-x)^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 。考点: 空间曲线在坐标面上的投影。

解答: 联立方程  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + z = a \end{cases}$  消去  $z$ , 得投影柱面  $x^2 + y^2 + (a-x)^2 = R^2$ , 故该曲

线在  $xoy$  平面上的投影曲线的方程为  $\begin{cases} x^2 + y^2 + (a-x)^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 。

2. 设  $f(t, s)$  一阶连续可导,  $u = f(x + y + z, xyz)$ , 则  $du =$ \_\_\_\_\_。

答案：  $(f_1 + yzf_2)dx + (f_1 + xzf_2)dy + (f_1 + xyf_2)dz$ 。 考点： 多元函数的全微分。

解答： 由多元函数的全微分计算公式及一阶全微分形式的不变性， 有

$$\begin{aligned} du &= df(x + y + z, xyz) = f_1 \cdot d(x + y + z) + f_2 \cdot d(xyz) \\ &= f_1 \cdot (dx + dy + dz) + f_2 \cdot (yzdx + xzdy + xydz) \\ &= (f_1 + yzf_2)dx + (f_1 + xzf_2)dy + (f_1 + xyf_2)dz。 \end{aligned}$$

3. 设 函 数  $f(x, y)$  在 点  $(a, b)$  的 偏 导 数 存 在 ， 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x, b) - f(a-x, b)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：  $2f_x(a, b)$ 。 考点： 多元函数偏导数定义。

解答： 由偏导数定义， 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x, b) - f(a-x, b)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x, b) - f(a, b)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a-x, b) - f(a, b)}{-x} \\ &= f_x(a, b) + f_x(a, b) = 2f_x(a, b)。 \end{aligned}$$

4. 已知  $L$  为自原点沿顺时针方向到点  $A(2, 2)$  的圆弧  $y = \sqrt{4x - x^2}$ ， 则

$$\int_L xydy = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：  $\frac{4}{3}$ 。 考点： 对坐标的曲线积分的计算（方程代入、起点到终点积分）。

解答：  $y = \sqrt{4x - x^2}$ ，  $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ， 故  $L$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 2 + 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}$ ， 原点  $(0, 0)$

对应  $t = \pi$ ， 终点  $A(2, 2)$  对应  $t = \frac{\pi}{2}$ ， 则

$$\begin{aligned} \int_L xydy &= \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} (2 + 2\cos t) \cdot 2\sin t d(2\sin t) = 8 \left( \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt + \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos^2 t dt \right) \\ &= 8 \left( \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt \sin t - \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \cos t \right) = 8 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}。 \end{aligned}$$

5. 设  $\Omega$  是由  $z = x^2 + y^2$  及  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  所围的有界闭区域， 则

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} dv = \underline{\hspace{2cm}}。$$

答案：  $2\pi(e-2)$ 。 考点： 三重积分在柱面坐标系下的计算。

解答： 由已知条件，易得  $\Omega$  在  $xoy$  面上的投影是一半径为 1 的圆（联立方程消  $z$ ）。当直线

平行  $z$  轴由下往上穿  $\Omega$  的内部时，穿入的是旋转抛物面  $z = x^2 + y^2$ （对应  $z = \rho^2$ ），穿出

的是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ （对应  $z = \rho$ ），于是

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 d\rho \int_{\rho^2}^{\rho} \frac{e^{\rho}}{\rho^2} \cdot \rho dz = 2\pi \int_0^1 \frac{e^{\rho}}{\rho} (\rho - \rho^2) d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 e^{\rho} (1 - \rho) d\rho = 2\pi \int_0^1 (1 - \rho) de^{\rho} = 2\pi \cdot (2 - \rho) e^{\rho} \Big|_0^1 = 2\pi(e-2)。 \end{aligned}$$

三、计算题（本大题总分 50 分，共计 5 小题，每题 10 分）

1. 函数  $z = z(x, y)$  由方程  $2x + y + z = xyz$  所确定，求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}}$ 。

考点：多元隐函数求导法。

解答：易知  $x = 1$ ， $y = 2$  时  $z = 4$ 。在方程  $2x + y + z = xyz$  的两边同时对  $x$  求偏导（注意  $z$  是  $x$ 、 $y$  的函数），有

$$2 + \frac{\partial z}{\partial x} = y \left( z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right), \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2 - yz}{xy - 1}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = -6。$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left( \frac{2 - yz}{xy - 1} \right)'_x = \frac{-y \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (xy - 1) - (2 - yz) \cdot y}{(xy - 1)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = 24。$$

2. 求函数  $z = 3x^2 + y^2 + 2xy - 10x - 2y + 7$  的极值。

考点：多元函数的极值。

解答：  $\begin{cases} z_x = 6x + 2y - 10 = 0 \\ z_y = 2y + 2x - 2 = 0 \end{cases}$ ，得驻点  $(2, -1)$ 。又  $A = z_{xx} = 6$ ， $B = z_{xy} = 2$ ， $C = z_{yy} = 2$ ，

$\Delta = AC - B^2 > 0$  且  $A > 0$ ，故  $(2, -1)$  是该函数的极小值点，极小值  $z(2, -1) = -2$ 。

3. 设  $C$  是椭圆周  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ , 方向为逆时针, 计算  $\oint_C y^2 dx - x^2 dy$  的值。

考点: 格林公式, 二重积分的对称性。

解答:  $P = y^2$ ,  $Q = -x^2$ , 由格林公式, 有

$$\oint_C y^2 dx - x^2 dy = \iint_D (-2x - 2y) dx dy = -2 \iint_D x dx dy - 2 \iint_D y dx dy = 0,$$

其中  $D: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} \leq 1$  关于  $y$  轴和  $x$  轴都是对称的,  $\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy = 0$ 。

4. 设  $\Omega$  是半径为  $R$  的球体:  $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ , 试求积分  $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dv$ 。

考点: 三重积分在球面坐标系下的计算, 三重积分的对称性。

解答: 因为  $\Omega$  关于三个坐标面均是对称的, 则

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dv &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv + 2 \iiint_{\Omega} yz dv + 2 \iiint_{\Omega} xz dv + 2 \iiint_{\Omega} xy dv \\ &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv + 0 + 0 + 0 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4}{5} \pi R^5. \end{aligned}$$

5. 试将函数  $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$  展成  $x$  的幂级数。

考点: 函数展开成幂级数。

$$\begin{aligned} \text{解答: } y &= \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} \\ &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, \end{aligned}$$

其中收敛半径  $R = \min\{1, 2\} = 1$ , 故收敛域为  $(-1, 1)$ 。

四、证明题 (本题 10 分, 共计 1 小题)

已知函数  $y = y(x)$  满足微分方程  $y' = x + y$ , 且  $y(0) = 1$ , 证明:  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right]$

绝对收敛。

考点：正项级数敛散性的判定。

解答：因为微分方程  $y' = x + y$  是一阶非齐次线性微分方程，其中  $p(x) = -1$ ， $q(x) = x$ ，

由通解公式，有  $y(x) = e^{\int dx} \left( \int x e^{-\int dx} dx + C \right) = e^x \left( \int x e^{-x} dx + C \right) = C e^x - 1 - x$ 。由  $y(0) = 1$ ，

可得  $C = 2$ ，所以  $y\left(\frac{1}{n}\right) = 2e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}$ 。

利用不等式“ $u > 0$  时， $e^u > 1 + u$ ”可知  $y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} = 2\left(e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}\right) > 0$ ，即

$\sum_{n=1}^{\infty} \left[ y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right]$  是正项级数。将其与  $p = 2$  的  $p$  级数作比较，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\left(e^{\frac{1}{n}} - 1 - \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n^2}} \stackrel{\frac{1}{n}=x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1 - x)}{x^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1)}{2x} = 1 \text{。 (有限的正数)}$$

由比较审敛法的极限形式可知两级数同收敛。又  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ y\left(\frac{1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{n} \right]$  是正项级数，其绝对值级数即本身，故该级数绝对收敛。