

试卷编号_____ 拟题教研室(或教师)签名_____ 教研室主任签名_____

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次)_____《高等代数》(一)_____ 课程代码 0701000006

专 业 数学, 信计, 统计 层次(本,专) 本 科 考试方式(开,闭卷) 闭 卷

一、填空题(总分20分,每小题4分)

1. 设 $f(x) = x^4 - 3x^3 + 4x + 1$, $g(x) = x + 1$, 则 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 的余式_____.
2. 若 $\alpha_1 = (2, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 1, a, a)$, $\alpha_3 = (3, 2, 1, a)$, $\alpha_4 = (4, 3, 2, 1)$ 线性相关且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____.
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____.
4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.
5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $AX = b$ 有唯一解的充分必要条件是_____.

二、计算题(第1-4题, 每题10分;第5小题15分,总分55分)

1. 将多项式 $f(x) = x^4 + 1$ 分别在有理数域、实数域和复数域内分解成不可约多项式的乘积.

$$2. \text{ 计算 } n \text{ 阶行列式 } D_n = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}.$$

$$3. \text{ 解矩阵方程 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 A, B 为 3 阶矩阵, A^* 为 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 满足 $|A| = 2, |B| = 3, |A + B^{-1}| = 1$, 求

- (1) $|(\frac{1}{3}A)^{-1} - 2A^*|$; (2) $|A^{-1} + B|$.

$$5. \text{ 设 } A, B \text{ 为 3 阶矩阵, } E \text{ 为 3 阶单位矩阵, 若 } |A| > 0 \text{ 且 } A \text{ 的伴随矩阵 } A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, ABA^{-1} =$$

$-2BA^{-1} + 3E$, 求 A, B .

三、证明题(总分25分,第1小题10分, 第二小题15分)

1. 设 $n > 1$ 为正整数, a_0, a_1, \dots, a_{n-1} 为有理数, 证明若 $a_0 + a_1 \sqrt[n]{2} + a_2 \sqrt[n]{2^2} + \dots + a_{n-1} \sqrt[n]{2^{n-1}} = 0$, 则 $a_0 = a_1 = \dots = a_{n-1} = 0$.

设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A + B = AB, r(A)$ 为 A 的秩, 证明

- (1) $AB = BA$, (2) $r(A) = r(B)$.