

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Pratique du secourisme pour la prévention des accidents cardio-vasculaires

Module II : L'Éducation à la Santé — Le secourisme

Cette fiche évalue l'acquisition des gestes de premiers secours face aux urgences vitales (arrêt cardiaque, étouffement, perte de connaissance).

EXERCICE 1 Arrêt cardiaque : reconnaissance et algorithme

1. Parmi les signes suivants, lesquels caractérisent un arrêt cardiaque chez l'adulte ? (Cochez les bonnes réponses)

La victime ne répond pas, ne bouge pas.

La victime ne respire pas ou présente une respiration agonique (bruyante, irrégulière, inefficace).

La victime se plaint d'une douleur thoracique irradiante.

Absence de pouls carotidien (pour les secouristes formés).

2. Complétez les maillons de la « chaîne de survie » dans l'ordre chronologique :

(a) Alerte précoce (15 / 112) → _____

(b) _____ → Défibrillation précoce (DAE)

(c) _____ → Prise en charge médicale avancée.

3. Lors d'une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) sur un adulte, indiquez le rythme et le ratio corrects :

- Fréquence des compressions : _____ par minute.
- Profondeur des compressions : _____.
- Ratio Compressions / Insufflations : _____.

EXERCICE 2 Étouffement total : Adulte et Femme enceinte

1. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

(a) Une victime qui tousse fortement et parle présente un étouffement total.

(b) Chez la femme enceinte (ou obèse), on pratique les compressions abdominales (Heimlich) de la même manière que sur un adulte standard.

- _____
- (c) Si la victime devient inconsciente, on la allonge et on débute immédiatement la RCP (compressions thoraciques). _____
2. Citez les deux manœuvres successives à réaliser sur un adulte conscient victime d'étouffement total, dans l'ordre :
- (a) _____
- (b) _____

EXERCICE 3 Étouffement total : Nourrisson (moins d'un an)

1. Complétez le protocole d'action face à un nourrisson conscient s'étouffant totalement (obstruction complète des voies aériennes) :
- (a) Appeler les secours (15/112) ou faire appeler.
- (b) Administrer _____ tapes dorsales (région inter-omoplate) avec le talon de la main, nourrisson penché en avant, tête plus bas que le tronc.
- (c) Si échec : retourner le nourrisson sur le dos (tête basse) et pratiquer _____ compressions thoraciques (2 doigts, ligne inter mammaire).
- (d) Alternier les deux manœuvres jusqu'à expulsion du corps étranger ou perte de connaissance.
2. Pourquoi ne pratique-t-on pas de compression abdominale (Heimlich) sur le nourrisson ? _____

EXERCICE 4 Perte de connaissance et Position Latérale de Sécurité (PLS)

1. Une victime est « inconsciente mais elle respire ». Cochez l'unique attitude correcte :
- La laisser sur le dos, tête en arrière, et surveiller.
- La mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS) et appeler les secours (15/112).
- Commencer immédiatement un massage cardiaque.
- Lui donner de l'eau ou du sucre.
2. Ordonnez les étapes clés de la mise en PLS (adulte) en numérotant de 1 à 5 :
- ___ Ouvrir la bouche (pouce/index) pour écoulement des liquides.
- ___ Ramener le bras lointain contre la joue de la victime pour soutenir la tête.

___ Vérifier la respiration (regarder, écouter, sentir) pendant 10 sec max.

___ Basculer la victime vers soi en tirant sur la cuisse pliée (genou à 90°).

___ Placer le bras proche à angle droit, paume vers le haut.

3. Quelle surveillance continue doit-on assurer en attendant les secours?

EXERCICE 5 Alerte aux secours et Conduite générale

1. Complétez le message type à transmettre au 15 (SAMU) ou 112 (numéro européen) en utilisant l'acronyme ASSE :

A : _____ (Où?)

S : _____ (Quoi?)

S : _____ (Combien? État?)

E : _____ (Ne pas raccrocher avant l'opérateur).

2. Cochez les comportements relevant de l'empathie et de l'assistance envers la victime :

Expliquer calmement ce que l'on va faire avant de le faire.

Laisser la victime seule pour aller chercher du matériel loin.

Rassurer la victime, maintenir le contact visuel et verbal.

Critiquer l'entourage qui n'est pas intervenu.

Protéger la victime du froid, de la vue du public, des intempéries.

EXERCICE 6 Synthèse : Cas pratiques courts

1. Cas 1 : Un collègue s'effondre brutalement au travail. Il ne répond pas, ne respire pas. Vous êtes seul. Décrivez en 3 actions prioritaires et séquentielles votre conduite à tenir :

(a) _____

(b) _____

(c) _____

2. Cas 2 : Un enfant de 3 ans (traité comme un adulte pour les manœuvres) mange une cacahuète. Il ne peut plus parler, ne tousse plus, devient cyano-tique. Il est conscient. Quelle manœuvre devez-vous effectuer en premier?

-
3. Cas 3 : Vous trouvez une personne allongée au sol, yeux fermés. Elle respire normalement (ventilation thoracique visible, régulière). Quelle est la première action à réaliser avant d'appeler les secours?
-