

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re CTI

Lutte contre les comportements préjudiciables à la santé reproductive

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue vos connaissances sur les risques pour la santé reproductive et les moyens de prévention.

EXERCICE 1 Rappels physiologiques et définition des risques

1. Citez les deux gamètes humains et précisez leur lieu de formation respectif.
2. Définissez le terme « fécondation » et indiquez son site habituel dans l'appareil génital féminin.
3. Complétez le tableau suivant en associant chaque comportement à risque à sa définition brève.

Comportement à risque	Définition
Rapports sexuels non protégés	
Grossesse précoce	
Avortement clandestin	

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez votre réponse en une phrase.

1. La pilule contraceptive d'urgence protège contre les infections sexuellement transmissibles (IST). ☐ V ☐ F
2. L'abstinence est la seule méthode contraceptive efficace à 100% pour éviter une grossesse et les IST. ☐ V ☐ F
3. Un avortement pratiqué dans des conditions médicales sûres par du personnel qualifié est un avortement clandestin. ☐ V ☐ F
4. Le préservatif masculin est une méthode de contraception à double protection (grossesse + IST). ☐ V ☐ F

EXERCICE 3 QCM : Conséquences sanitaires et sociales

Une seule réponse correcte par question. Cochez la case correspondante.

1. Parmi les conséquences sanitaires directes d'un avortement clandestin, on trouve le plus fréquemment : ☐ A. L'infertilité définitive immédiate. ☐ B. L'hémorragie sévère et l'infection (septicémie). ☐ C. Le cancer de l'utérus. ☐ D. Le diabète gestationnel.
2. Une grossesse précoce (avant 18 ans) expose particulièrement la jeune fille au risque de : ☐ A. Fistule obstétricale et éclampsie. ☐ B. Ménopause précoce. ☐ C. Trisomie 21 systématique. ☐ D. Ostéoporose.
3. La transmission du VIH/SIDA lors d'un rapport sexuel non protégé est favorisée par : ☐ A. La prise de contraceptifs oraux. ☐ B. La présence d'autres IST ulcéreuses. ☐ C. L'utilisation de lubrifiant à base d'eau. ☐ D. La douche vaginale après le rapport.

EXERCICE 4 Moyens de contraception : classification

Classez les moyens de contraception suivants dans le tableau ci-dessous selon leur mode d'action principal : Préservatif masculin, Pilule œstro-progestative, Stérilet (DIU) au cuivre, Implant sous-cutané, Méthode du calendrier (Ogino-Knaus), Ligature des trompes.

Barrière mécanique	Action hormonale	Autres (Chirurgicale / Naturelle)

EXERCICE 5 Analyse de situation : Proposition d'alternatives

Marie, 16 ans, élève en classe de Première, a des rapports sexuels occasionnels sans protection avec son petit ami. Elle craint une grossesse mais n'ose pas en parler à ses parents ni aller au centre de santé.

1. Identifiez deux comportements à risque présents dans cette situation.
2. Citez deux conséquences sanitaires potentielles pour Marie si elle tombe enceinte à cet âge.
3. Proposez trois alternatives responsables concrètes que Marie pourrait mettre en œuvre dès maintenant pour protéger sa santé reproductive.

EXERCICE 6 Calcul simple : Efficacité contraceptive

L'indice de Pearl mesure le nombre de grossesses survenues pour 100 femmes utilisant une méthode contraceptive pendant un an.

1. Une méthode contraceptive a un indice de Pearl de 0,3. Combien de grossesses non désirées sont attendues pour 1000 femmes utilisant cette méthode pendant un an ?
2. Si le préservatif masculin a un indice de Pearl d'utilisation courante de 13, quel pourcentage de femmes risque une grossesse non désirée en un an avec cette méthode en utilisation courante ?