

SVTEEB • TLE C

MODULE II : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ

LEÇON N06

LES MÉCANISMES DE
L'IMMUNITÉ ET SES
DYSFONCTIONNEMENTS

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore l'origine des cellules immunitaires, les mécanismes des réponses immunitaires non spécifiques et spécifiques (cellulaire et humorale) ainsi que la mémoire immunitaire, fondement de la vaccination. Elle analyse ensuite les dysfonctionnements du système immunitaire (maladies auto-immunes, VIH/Sida) et développe des compétences de prévention et de solidarité face au Sida.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les lieux de formation et de maturation des cellules immunitaires.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les structures de reconnaissance du soi et du non-soi (CMH, récepteurs des lymphocytes).
- À la fin de cette leçon, je sais rappeler les mécanismes de la réponse immunitaire non spécifique (barrières, phagocytose, inflammation).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'expériences mettant en évidence la réponse à médiation cellulaire (greffes, destruction des cellules cibles).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'expériences mettant en évidence la réponse à médiation humorale (production d'anticorps, sérothérapie).
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des courbes de cinétique des anticorps pour expliquer la mémoire immunitaire et le principe de la vaccination.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Origine et maturation des cellules immunitaires
2. La reconnaissance du soi et du non-soi
3. La réponse immunitaire non spécifique (rappels)
4. La réponse immunitaire spécifique : médiation cellulaire et humorale
5. La mémoire immunitaire et la vaccination
6. Les dysfonctionnements : maladies auto-immunes
7. Le VIH/Sida : mécanismes, prévention et solidarité
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les lieux de formation et de maturation des cellules immunitaires.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les structures de reconnaissance du soi et du non-soi (CMH, récepteurs des lymphocytes).
- À la fin de cette leçon, je sais rappeler les mécanismes de la réponse immunitaire non spécifique (barrières, phagocytose, inflammation).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'expériences mettant en évidence la réponse à médiation cellulaire (greffes, destruction des cellules cibles).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats d'expériences mettant en évidence la réponse à médiation humorale (production d'anticorps, sérothérapie).
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter des courbes de cinétique des anticorps pour expliquer la mémoire immunitaire et le principe de la vaccination.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les mécanismes des maladies auto-immunes à partir d'exemples (vitiligo, diabète juvénile, myasthénie).
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le mode d'action du VIH sur les lymphocytes T4 et les conséquences de l'immunodéficience.
- À la fin de cette leçon, je sais produire des outils de sensibilisation à la prévention du VIH/Sida et adopter des comportements solidaires envers les personnes vivant avec le VIH.

PRÉREQUIS

- Les cellules de l'organisme : structure générale, notion de membrane plasmique et de marqueurs membranaires (Seconde/Première).
- Les groupes sanguins et la notion d'antigène/anticorps (Première).
- La réaction immunitaire non spécifique : phagocytose et réaction inflammatoire (Première).
- Les protéines : structure et spécificité d'action (enzymes, anticorps) (Première).
- La notion de virus et de cycle de multiplication virale (Première).

1 ORIGINE ET MATURATION DES CELLULES IMMUNITAIRES


Au service des urgences de l'hôpital de district de Bafoussam, deux patients arrivent presque simultanément. Le premier, un adolescent de 14 ans, est en détresse métabolique aiguë (cétosidose diabétique) : son pancréas ne produit plus d'insuline, ses îlots de Langerhans ayant été détruits par ses propres lymphocytes. Le second, un jeune père de famille séropositif depuis trois ans, non observant de son traitement antirétroviral, succombe à une pneumonie à *Pneumocystis jirovecii*, un champignon microscopique que tout système immunitaire sain maintient en silence. Comment le même arsenal de défense peut-il, chez l'un, se retourner contre l'organisme (maladie auto-immune), et chez l'autre, s'effondrer face à des agents opportunistes (immunodéficience) ? Pourquoi la vaccination antivaricelle (jadis obligatoire) ou anti-amarile (encore recommandée au Cameroun) confère-t-elle une protection à vie, alors qu'une simple plaie infectée guérit sans laisser de mémoire spécifique ? Pour répondre, il faut remonter à la source : d'où viennent nos soldats de l'immunité, où s'entraînent-ils, et comment sont-ils déployés ?

1.1 Les cellules immunitaires : des leucocytes aux fonctions spécialisées

DÉFINITION Leucocyte et lignées cellulaires

Un **leucocyte** (ou globule blanc) est une cellule nucléée du sang et de la lymphe, acteur de la défense de l'organisme. On distingue trois grandes lignées aux morphologies et fonctions distinctes :

- Les **polynucléaires** (neutrophiles, éosinophiles, basophiles) : cytoplasme granuleux, noyau multilobé. Premiers intervenants de l'inflammation (phagocytose pour les neutrophiles, dégranulation pour les basophiles/éosinophiles).
- Les **monocytes** (grands noyaux réniformes) qui, dans les tissus, se différencient en **macrophages** : phagocytose massive, présentation d'antigènes, sécrétion de cytokines.
- Les **lymphocytes** (noyau rond occupant quasi tout le volume, cytoplasme mince) : cellules de l'immunité spécifique. Deux sous-types majeurs : les **lymphocytes B** (LB) et les **lymphocytes T** (LT).



1.2 L'origine commune : la moelle osseuse rouge, lieu de formation de tous les leucocytes

PROPRIÉTÉ Origine hématopoïétique

Toutes les cellules immunitaires (polynucléaires, monocytes/macrophages, lymphocytes B et T) dérivent d'une **cellule souche hématopoïétique** (CSH, phénotype CD34⁺) située dans la **moelle osseuse rouge** (os plats : sternum, iliaques, côtes, vertèbres; épiphyses des os longs). Cette origine commune est un savoir admis, solidement établi par l'expérience d'irradiation-greffe.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du rôle de la moelle osseuse : irradiation-greffe chez la souris

Problématique : La moelle osseuse est-elle le lieu de formation des cellules immunitaires? Matériel : Souris isogéniques (même patrimoine génétique), source de rayonnements ionisants (dose létale : 6 Gy à 9 Gy), moelle osseuse de donneur sain. Protocole :

1. Groupe Témoin (T) : Souris non irradiée, non greffée.
2. Groupe Irradié (I) : Souris irradiée (destruction de la moelle), non greffée.
3. Groupe Greffé (G) : Souris irradiée + injection intraveineuse de cellules de moelle osseuse de donneur sain ($1e6$ à $1e7$ cellules).

Observations (à J+14) :

Paramètre	Témoin (T)	Irradié (I)	Greffé (G)
Survie	100%	0% (mort J+7 à J+12)	90%
Numération leucocytaire	Normale ($5e3 \mu L^{-1}$ – $1e4 \mu L^{-1}$)	Aplasie profonde ($< 500 \mu L^{-1}$)	Restituée à la normale
Réponse immunitaire (test antigène)	Positive	Absente	Positive

Interprétation : L'irradiation détruit la moelle → aplasie médullaire → disparition des leucocytes → mort par infection (absence de défense). La greffe de moelle restaure la production de leucocytes et la compétence immunitaire. Conclusion : La moelle osseuse est le site de formation de toutes les cellules immunitaires. C'est le principe de la greffe de moelle osseuse (allogreffe) utilisée en thérapeutique.

MÉTHODE

Interpréter une expérience d'irradiation-greffe de moelle

Pour conclure sur le lieu de formation des cellules immunitaires à partir d'un tel protocole :

1. Identifier la variable indépendante : l'irradiation (destruction moelle) et la greffe (apport cellules moelle).
2. Comparer les groupes : Témoin vs Irradié (effet de la destruction) ; Irradié vs Greffé (effet de la restauration).
3. Analyser les paramètres mesurés : survie, numération leucocytaire (formule sanguine), capacité de réponse immunitaire (ex. production d'anticorps après injection d'antigène).
4. Conclure : Si la destruction de la moelle abolit l'immunité et que sa restauration par greffe la rétablit, la moelle est le lieu de formation des cellules effectrices de l'immunité.

LESAVAIS-TU ?

La greffe de moelle osseuse au Cameroun

La greffe de moelle osseuse (ou de cellules souches hématopoïétiques) est une thérapie curative pour certaines leucémies aiguës, lymphomes, aplasies médullaires sé-

vères ou drépanocytose majeure. Au Cameroun, bien que techniquement lourde (nécessite unité d'hématologie, conditionnement myéloablatif, isolement stérile, donneur HLA-compatible), elle commence à être réalisée dans des centres de référence (ex. Hôpital Général de Yaoundé, Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya). Le donneur est souvent un frère ou une sœur HLA-identique (probabilité 25% par fratrie). Ce savoir de Terminale C/TI est donc directement à la base d'une thérapeutique de pointe accessible dans notre pays.

1.3 La maturation différentielle : moelle pour les LB, thymus pour les LT

Si la **formation** (prolifération, engagement lignager) a lieu dans la moelle pour tous, la **maturation** (acquisition des récepteurs fonctionnels, sélection du répertoire non-auto-réactif) sépare les deux lignées lymphoïdes.

DÉFINITION Organes lymphoïdes primaires et secondaires

- Organes lymphoïdes primaires (centraux) : Sites de formation et/ou maturation des lymphocytes à partir de précurseurs. Chez l'Homme : moelle osseuse rouge (formation de tous + maturation des LB) et thymus (maturation des LT).
- Organes lymphoïdes secondaires (périphériques) : Sites de rencontre entre lymphocytes matures naïfs et antigènes, et de déclenchement de la réponse adaptative. Ganglions lymphatiques, rate, amygdales, plaques de Peyer (iléon), appendice.

EXPÉRIENCE Rôle du thymus dans la maturation des LT : thymectomie néonatale chez la souris

Problématique : Quel est le rôle du thymus dans l'immunité ? Protocole (Miller, 1961) : Thymectomie chirurgicale chez la souris nouveau-née (J+1 à J+3) vs souris sham-opérée (témoin). Analyse à l'âge adulte. Résultats :


- Atrophie des zones lymphoïdes périphériques (ganglions, rate : zones T dépourvues de lymphocytes).
- Déficit sévère de la réponse à médiation cellulaire (rejet de greffe allogénique, hypersensibilité retardée type tubercule).
- Déficit en production d'anticorps vis-à-vis des antigènes thymodépendants (protéines), mais conservation de la réponse aux antigènes thymoindépendants (polysaccharides bactériens).
- Sensibilité accrue aux infections virales, fongiques, intracellulaires.

Interprétation : L'ablation précoce du thymus empêche la maturation des pré-LT en LT fonctionnels ($CD4^+$ et $CD8^+$). Les LT auxiliaires ($CD4^+$) étant nécessaires pour aider les LB

à produire des anticorps de classe IgG (commutation de classe), leur absence explique le déficit humoral partiel. Conclusion : Le thymus est l'organe indispensable à la maturation des lymphocytes T. Sans thymus, pas de LT matures → pas d'immunité cellulaire → aide auxiliaire absente pour les LB → immunité humorale altérée.

ATTENTION Piège classique : Formation ≠ Maturation

- Formation (hématopoïèse) : Moelle osseuse rouge POUR TOUS (polynucléaires, monocytes, LB, LT).
- Maturation (acquisition compétences fonctionnelles) :
 - LB : Moelle osseuse (chez l'Homme et la souris ; bourse de Fabricius chez l'oiseau, d'où le "B").
 - LT : Thymus (d'où le "T").
- Ne jamais écrire : « Les LT se forment dans le thymus. » Ils s'y maturent seulement. Les pré-LT migrent de la moelle vers le thymus via le sang.



Organes primaires : Moelle (formation tous, maturation LB), Thymus

Organes secondaires : Ganglions, Rate, Amygdales, Plaques de Peyer

Flèches vertes : Migration des lymphocytes matures (naïfs) vers les organes secondaires

Localisation des organes lymphoïdes chez l'Homme. En rouge : moelle osseuse (os plats et épiphyses) et thymus (médiastin antérieur, involue après la puberté). En bleu : organes lymphoïdes secondaires (ganglions, rate). Les flèches vertes schématisent la migration des lymphocytes matures (naïfs) via la circulation sanguine et lymphatique vers les organes secondaires où ils rencontreront l'antigène.

1.4 Bilan récapitulatif et exercice résolu

Type cellulaire	Lieu de formation	Lieu de maturation	Rôle principal (effecteur)
Polynucléaire neutrophile	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge	Phagocytose bactérienne (1 ^{ère} ligne, non spécifique)
Monocyte → Macrophage	Moelle osseuse rouge	Moelle (monocyte) → Tissus (macrophage)	Phagocytose massive, présentation d'antigène (APC), cytokines
Lymphocyte B (LB)	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge (Homme)	Différenciation en plasmocytes → sécrétion d'anticorps (immunité humorale)
Lymphocyte T CD4 ⁺ (LT auxiliaire)	Moelle osseuse rouge	Thymus	Orchestration : aide LB (IgG), activation macrophages, activation LT8 (cytokines : IL-2, IFN-γ)
Lymphocyte T CD8 ⁺ (LT cytotoxique)	Moelle osseuse rouge	Thymus	Lyse directe cellules cibles infectées ou tumorales (perforine, granzymes, FasL)

EXERCICE RÉSOLU 1**Analyse d'un cas clinique : Syndrome de DiGeorge**

Énoncé : Un nourrisson de 3 mois présente une hypocalcémie tétanique, une cardiopathie congénitale (tronc artériel commun) et des infections à répétition (candidose buccale, pneumonies virales). Le bilan immunologique montre : taux d'IgG, IgA, IgM normaux ou légèrement bas ; nombre de LB normaux ; nombre de LT CD3⁺ très bas (< 500/μL) ; absence de réponse à la tuberculine (IDR) ; absence d'image thymique à la radiographie.

1. Identifier l'organe atteint à l'origine de ce tableau.
2. Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant l'atteinte de cet organe aux anomalies immunologiques observées.

3. Préciser pourquoi le taux d'immunoglobulines n'est pas effondré.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. L'association cardiopathie + hypocalcémie (hypoparathyroïdie) + absence de thymus à la radiographie oriente vers le syndrome de DiGeorge (délétion 22q11.2). L'organe principalement atteint sur le plan immunologique est le thymus (aplasie/hypoplasie thymique).
2. Le thymus est le site de maturation des LT. Son absence empêche la différenciation des pré-LT (venus de la moelle) en LT matures CD4⁺ et CD8⁺.
 - → Pénurie de LT circulants (lymphopénie T sévère).
 - → Pas d'immunité cellulaire : pas de rejet de greffe, pas de DHR (tuberculine négative), pas de lyse cellulaire par LT8, pas d'activation des macrophages → infections intracellulaires (virus, champignons Candida).
 - → Pas d'aide auxiliaire (LT CD4⁺) pour les LB.
3. Les LB se forment et mûrissent dans la moelle osseuse, qui est intacte. Ils peuvent donc répondre aux antigènes thymoindépendants (polysaccharides bactériens capsulaires) et produire des IgM, et dans une moindre mesure IgG/IgA sans aide T. D'où un taux d'Ig globalement conservé, mais une incapacité à produire des anticorps de haute affinité, de classe IgG, et à générer une mémoire vaccinale efficace contre les antigènes protéiques (virus, toxines).

Conclusion : Ce cas illustre parfaitement la dissociation formation/maturation : moelle intacte → LB OK ; thymus absent → LT absents → immunité cellulaire effondrée + immunité humorale partielle (dépendante du thymus).

EXERCICE 1 Entraînement : QCM Bac

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est exacte concernant l'origine et la maturation des lymphocytes chez l'Homme adulte ?

1. Les lymphocytes B et T se forment et mûrissent dans le thymus.
2. Les lymphocytes B se forment dans la moelle osseuse et mûrissent dans le thymus ; les lymphocytes T se forment et mûrissent dans la moelle osseuse.
3. Les lymphocytes B et T se forment dans la moelle osseuse ; les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse et les lymphocytes T mûrissent dans le thymus.
4. Les lymphocytes B se forment dans la rate et mûrissent dans les ganglions ; les lymphocytes T se forment dans le thymus et mûrissent dans la moelle osseuse.

Réponse attendue : 3. Justification : Formation commune en moelle (CSH). Maturation

différentielle : Moelle pour LB (Homme), Thymus pour LT. La rate et les ganglions sont des organes secondaires (site de rencontre Ag/Lymphocyte naïf).

CORRIGÉ Exercice n°1

La réponse 3 est la seule correcte. Rappel : La moelle osseuse rouge est l'organe hématopoïétique principal chez l'adulte (formation de toutes les lignées). La maturation des LB y a lieu (chez les mammifères). Les pré-LT migrent par le sang vers le thymus pour y subir leur maturation (sélection positive/négative). Les organes secondaires (rate, ganglions) n'interviennent qu'après maturation, pour l'activation clonale.

2 LA RECONNAISSANCE DU SOI ET DU NON-SOI

Dans la section précédente, nous avons vu que les lymphocytes naissent dans la moelle osseuse, puis acquièrent leur maturité dans le thymus (lymphocytes T) ou dans la moelle osseuse elle-même (lymphocytes B), avant de coloniser les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions, amygdales, plaques de Peyer). Mais une question fondamentale reste en suspens : une fois matures et en circulation dans l'organisme, comment ces cellules savent-elles quoi attaquer et quoi respecter ? Pourquoi ton système immunitaire détruit-il le virus de la grippe ou le *Plasmodium falciparum* agent du paludisme, mais épargne-t-il tes propres cellules ? Et pourquoi, à l'inverse, rejette-t-il violemment un rein greffé provenant d'un donneur incompatible ? Toute la réponse tient en une capacité remarquable : la **reconnaissance du soi et du non-soi**. C'est l'objet de cette section.

2.1 Les marqueurs du soi : le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH)

Une carte d'identité moléculaire à la surface de chaque cellule

Observe un instant ta main : elle est constituée de milliards de cellules. Chacune d'elles porte à sa surface, insérées dans la membrane plasmique, des molécules particulières qui jouent le rôle de « carte d'identité » de l'individu. Ces molécules appartiennent à un ensemble appelé **Complexe Majeur d'Histocompatibilité**, abrégé **CMH**.

DÉFINITION Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH ou HLA)

Le **CMH** est un ensemble de glycoprotéines membranaires présentes à la surface des cellules d'un individu et qui caractérisent cet individu. Chez l'Homme, on le nomme système **HLA** (Human Leucocyte Antigen), car il a été découvert sur les leucocytes. Les gènes codant le CMH sont situés sur le chromosome 6. On distingue deux classes principales :

- le **CMH de classe I**, présent à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme

(donc absents des érythrocytes) ;

- le **CMH de classe II**, présent uniquement à la surface des cellules présentatrices d'antigènes professionnelles (CPA) : macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B.

PROPRIÉTÉ Unicité du CMH — propriété admise

Le CMH est unique pour chaque individu : deux personnes prises au hasard n'ont quasiment jamais le même ensemble de molécules HLA, en raison de l'extrême polymorphisme des gènes du CMH (plusieurs dizaines, voire centaines d'allèles possibles pour chaque gène : HLA-A, HLA-B, HLA-C pour la classe I ; HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR pour la classe II). La seule exception concerne les jumeaux monozygotes (vrais jumeaux), issus du même zygote, qui possèdent un patrimoine génétique identique et donc le même CMH. Cette unicité du CMH conditionne le rejet des greffes : tout tissu étranger portant un CMH différent est reconnu comme non-soi et attaqué.

2.2 Mise en évidence expérimentale : les greffes de peau chez la souris

Comment a-t-on démontré que le système immunitaire distingue le soi du non-soi ? Par des expériences classiques de greffes de peau réalisées chez la souris par Peter Medawar (prix Nobel 1960), que tu dois savoir interpréter pour le Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Greffes de peau chez la souris : protocole et résultats (d'après Medawar)

Matériel : deux lignées de souris génétiquement différentes (lignée A et lignée B), du matériel de chirurgie stérile.

Protocole et observations :

- Expérience 1 (autogreffe) : on prélève un fragment de peau sur le dos d'une souris A et on le greffe sur le flanc de la même souris A. Résultat : la greffe est acceptée, la peau cicatrise normalement, vascularisation et repousse des poils sont observées.
- Expérience 2 (allogreffe) : on prélève un fragment de peau d'une souris A et on le greffe sur une souris B (individu différent, de lignée différente). Résultat : la greffe est rejetée en 10 jours à 14 jours : la peau greffée noircit, nécrose et tombe (réaction de rejet aigu).
- Expérience 3 (greffe entre jumeaux) : on greffe la peau d'une souris sur sa sœur jumelle monozygote. Résultat : la greffe est acceptée.
- Expérience 4 (seconde allogreffe) : on réalise une seconde greffe de peau de la souris A sur la souris B qui a déjà rejeté une première greffe de A. Résultat : le rejet est plus rapide (environ 6 jours), signe d'une mémoire immunitaire.

Interprétation : la souris accepte son propre tissu (soi) et celui de son jumeau génétique-

ment identique (même CMH), mais rejette le tissu d'un individu génétiquement différent (non-soi, CMH différent). Le rejet accéléré lors de la seconde greffe prouve l'implication de la mémoire immunitaire. Conclusion : le système immunitaire distingue le **soi** du **non-soi** ; cette discrimination repose sur les marqueurs membranaires (CMH) propres à chaque individu.

Type de greffe	Donneur	Receveur	Issue
Autogreffe	Souris A	Souris A (elle-même)	Acceptation : cicatrisation normale, vascularisation
Allogreffe (1 ^{re})	Souris A	Souris B (lignée différente)	Rejet en 10–14 j : nécrose, dépilation
Greffe entre jumeaux	Souris A ₁	Souris A ₂ (jumelle monozygote)	Acceptation
Allogreffe (2 ^e)	Souris A	Souris B (déjà greffée)	Rejet accéléré (~6 j) : mémoire immunitaire

Tableau-schéma des résultats des greffes de peau chez la souris (expériences de Medawar). L'autogreffe et la greffe entre jumeaux monozygotes (même CMH) sont acceptées ; l'allogreffe (CMH différent) est rejetée. Le rejet est plus rapide lors d'une seconde greffe du même donneur, prouvant l'existence d'une mémoire immunitaire.

MÉTHODE Conclure à partir de résultats de greffes — démarche type Bac

Face à un tableau ou un document décrivant des greffes, adopte la démarche suivante :

1. Comparer les situations : identifier le donneur et le receveur dans chaque cas (même individu ? même lignée ? individus différents ? jumeaux ?).
2. Dégager la variable qui change d'une expérience à l'autre : ici, l'identité génétique (et donc le CMH) entre donneur et receveur, ou le rang de la greffe (1^{re} ou 2^e).
3. Formuler une interprétation : le rejet n'a lieu que lorsque le CMH du donneur diffère de celui du receveur ; la rapidité du rejet lors de la seconde greffe témoigne d'une mémoire.
4. Conclure en répondant au problème posé : le système immunitaire reconnaît le soi (toléré) et rejette le non-soi (éliminé) ; le CMH est la molécule-support de cette reconnaissance ; le rejet est une réponse immunitaire spécifique à mémoire.

LESAVAIS-TU ? Peter Medawar et la naissance de l'immunologie des greffes

Le biologiste britannique Peter Medawar (1915–1987), travaillant pendant la Seconde Guerre mondiale sur les brûlures des pilotes de la RAF, a montré que le rejet de greffe est un phénomène immunologique et non chirurgical. Ses expériences sur la souris (1940–1950) ont établi les bases de la compatibilité tissulaire (HLA) et de la tolérance immunologique. Il reçoit le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1960 avec Macfarlane Burnet. Au Cameroun, ses découvertes permettent aujourd'hui les greffes rénales au Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé ou à l'Hôpital Laquintinie de Douala, grâce au typage HLA et aux immunosuppresseurs.

2.3 Le soi et le non-soi : définitions**DÉFINITION Soi et non-soi**

- Le **soi** est l'ensemble des molécules (protéines, glycoprotéines, glucides...) normalement présentes dans l'organisme d'un individu et qui sont tolérées par son système immunitaire. Le CMH de l'individu est le marqueur fondamental du soi.
- Le **non-soi** est l'ensemble des molécules étrangères à l'individu, capables de déclencher une réponse immunitaire. Ces molécules étrangères sont appelées **antigènes**.

DÉFINITION Antigène et épitope

Un **antigène** est une molécule (le plus souvent une protéine ou un glucide de haut poids moléculaire, >10000 Da) étrangère à l'organisme, capable d'être reconnue par le système immunitaire et de déclencher une réponse immunitaire. Un antigène n'est pas reconnu dans sa totalité : la petite région précise de l'antigène (quelques acides aminés ou sucres) effectivement reconnue par un récepteur de lymphocyte ou par un anticorps s'appelle un **épitope** (ou déterminant antigénique). Un même antigène peut porter plusieurs épitopes différents, reconnus par des clones lymphocytaires différents.

ATTENTION Piège classique : antigène ≠ épitope

Un anticorps (ou un récepteur lymphocytaire) ne reconnaît pas un antigène entier, mais un épitope précis de cet antigène, comme une clé ne reconnaît qu'une seule serrure. Conséquence : une seule bactérie, portant de nombreux antigènes de surface à épitopes variés, peut activer simultanément plusieurs clones de lymphocytes B et T différents. Ne rédige jamais « l'anticorps reconnaît l'antigène » sans préciser qu'il se fixe sur un épitope

déterminé. De même, un antigène peut être immunogène (déclenche une réponse) sans être l'agent pathogène entier.

2.4 Les structures de reconnaissance : BCR, TCR et CMH

Pour reconnaître le non-soi, les lymphocytes possèdent à leur surface des **récepteurs spécifiques**, dont chaque lymphocyte porte un seul type (un seul « modèle »), généré aléatoirement lors de sa maturation par recombinaison V(D)J :

- les **lymphocytes B** portent des récepteurs **BCR** (B Cell Receptor), qui sont en réalité des anticorps membranaires (IgM et IgD) capables de reconnaître directement un épitope **conformationnel** (dépendant de la structure 3D) d'un antigène **libre** (soluble dans le sang, la lymphe, ou à la surface d'un pathogène) ;
- les **lymphocytes T** portent des récepteurs **TCR** (T Cell Receptor), qui ne reconnaissent un épitope que s'il est **présenté** par une molécule de CMH à la surface d'une cellule : le CMH de classe I présente des peptides (épitopes **linéaires**, 8–10 acides aminés) aux lymphocytes T CD8⁺ (cytotoxiques) ; le CMH de classe II présente des peptides (13–18 acides aminés) aux lymphocytes T CD4⁺ (auxiliaires).

Ainsi, le CMH n'est pas seulement une carte d'identité : c'est aussi un **présentoir** qui expose les épitopes peptidiques aux lymphocytes T. La reconnaissance du non-soi résulte donc d'un double dialogue : le récepteur du lymphocyte (BCR ou TCR) d'un côté, l'épitope (libre ou associé au CMH) de l'autre.




Schéma des structures de reconnaissance à la surface des cellules. Le CMH de classe I (bleu) est présent sur toutes les cellules nucléées et présente des peptides intracellulaires aux LT CD8. Le CMH de classe II (vert) est présent sur les CPA et présente des peptides extracellulaires/internalisés aux LT CD4. Le BCR (orange, lymphocyte B) reconnaît directement un épitope conformationnel d'un antigène libre. Le TCR (violet, lymphocyte T) ne reconnaît un épitope linéaire que présenté par une molécule de CMH (restriction au CMH).

2.5 La tolérance du soi : comment l'organisme évite de s'attaquer lui-même

Si les lymphocytes génèrent leurs récepteurs au hasard lors de leur maturation (recombinaison V(D)J), une fraction non négligeable de ces récepteurs reconnaît forcément... nos propres molécules (auto-antigènes)! Que deviennent ces lymphocytes potentiellement dangereux?

PROPRIÉTÉ Tolérance centrale du soi — savoir admis

Lors de leur maturation (dans le thymus pour les LT, dans la moelle osseuse pour les LB), les lymphocytes sont soumis à une **sélection négative** (ou éducation centrale) : tout lymphocyte dont le récepteur reconnaît avec une forte affinité une molécule du soi (auto-antigène présenté par le CMH) est éliminé par mort cellulaire programmée (apoptose). Seuls survivent et migrent vers les organes lymphoïdes secondaires les lymphocytes qui ne réagissent pas (ou faiblement) contre le soi. C'est le fondement de la **tolérance centrale du soi** : l'organisme ne déclenche normalement aucune réponse immunitaire contre ses propres constituants.

ATTENTION Vocabulaire précis : « Sélection clonale » vs « Sélection négative »

Le terme sélection clonale désigne classiquement l'amplification d'un clone lymphocytaire après rencontre de son antigène spécifique (réponse immune). Pour l'élimination des auto-réactifs pendant la maturation, on parle de sélection négative (ou tolérance centrale). Ne confonds pas les deux étapes.

Cette sélection explique aussi pourquoi chaque individu possède, au repos, une immense bibliothèque de lymphocytes aux récepteurs tous différents (répertoire immunitaire $\sim 10^7$ à 10^8 spécificités distinctes), prêts à reconnaître presque n'importe quel antigène étranger : c'est la base de la réponse immunitaire spécifique que nous étudierons dans les sections suivantes. Lorsque cette tolérance est rompue (défaillance de la sélection négative, mimétisme moléculaire, exposition d'antigènes cachés...), des lymphocytes activés attaquent le soi : c'est le mécanisme des **maladies auto-immunes** (vitiligo, diabète de type 1 ou juvénile, myasthénie), que nous aborderons dans la section 6.

2.6 Application médicale : compatibilité tissulaire et greffes d'organes

EXEMPLE Pourquoi cherche-t-on un donneur compatible, souvent un frère ou une sœur, pour une greffe de rein ?

Au Centre Hospitalier Universitaire d'Essos à Yaoundé comme dans tout service de néphrologie, un patient atteint d'insuffisance rénale terminale peut être sauvé par une greffe de rein. Mais le rein greffé porte le CMH du donneur : si ce CMH diffère trop de celui du receveur, les lymphocytes T CD8⁺ et CD4⁺ du receveur reconnaissent le greffon comme non-soi (reconnaissance directe du CMH étranger ou indirecte via peptides du

donneur) et le détruisent : c'est le **rejet de greffe** (aigu ou chronique). Or un frère ou une sœur a une probabilité de 25 % d'avoir hérité du même haplotype HLA (même combinaison d'allèles sur le chromosome 6) que le patient, puisque les enfants d'un même couple partagent leurs chromosomes 6 parentaux. On recherche donc en priorité un donneur dans la fratrie, après un typage HLA (analyse moléculaire des allèles HLA-A, -B, -DR sur les leucocytes). Lorsque la compatibilité est imparfaite (donneur cadavérique ou apparenté non identique), le patient reçoit à vie des **immunosuppresseurs** (ciclosporine, tacrolimus, mycophénolate...), médicaments qui inhibent l'activation des lymphocytes T (blocage de l'IL-2, inhibition de la calcineurine) pour limiter le rejet — au prix, hélas, d'une plus grande vulnérabilité aux infections opportunistes et de néphrotoxicité.

EXERCICE RÉSOLU 2 Interpréter des résultats de greffes

Énoncé. On réalise chez des souris les greffes de peau suivantes : (1) peau d'une souris X greffée sur elle-même ; (2) peau d'une souris X greffée sur une souris Y de lignée différente ; (3) peau d'une souris X greffée sur une souris Y préalablement traitée par un immunosuppresseur (ex. ciclosporine). Résultats : (1) acceptation définitive ; (2) rejet en 12 jours ; (3) acceptation prolongée tant que le traitement se poursuit. Que peut-on conclure ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Comparaison des situations : Dans les cas (1) et (2), le receveur est immunocompétent ; seule l'identité génétique entre donneur et receveur varie (même individu vs individu allogénique). Dans les cas (2) et (3), le couple donneur/receveur est identique (allogreffe), mais l'activité immunitaire du receveur diffère (normal vs immunosupprimé).
2. Interprétation :
 - L'acceptation de l'autogreffe (1) montre que le système immunitaire tolère les cellules portant le même CMH (soi).
 - Le rejet de l'allogreffe (2) montre que des cellules portant un CMH différent (non-soi) sont reconnues et détruites par le système immunitaire du receveur.
 - L'acceptation prolongée sous immunosuppresseur (3) démontre que le rejet observé en (2) est bien une réponse immunitaire active (dépendante des lymphocytes T) : lorsque ceux-ci sont inhibés pharmacologiquement, le greffon étranger n'est plus détruit.
3. Conclusion : Le système immunitaire distingue le soi du non-soi grâce aux marqueurs du CMH ; le rejet de greffe est une réaction immunitaire à médiation cellulaire (lymphocytes T) dirigée contre le CMH étranger, que les immunosuppresseurs permettent de limiter tant qu'ils sont administrés.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Chaque cellule nucléée porte à sa surface des marqueurs du **CMH** (HLA chez l'Homme) : classe I sur toutes les cellules nucléées, classe II sur les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles (macrophages, cellules dendritiques, lymphocytes B).
- Le CMH est unique pour chaque individu (polymorphisme extrême, chromosome 6) : il conditionne l'acceptation ou le rejet des greffes (sauf jumeaux monozygotes).
- Le **soi** (molécules propres, tolérées) est distingué du **non-soi** (antigènes étrangers) grâce aux récepteurs spécifiques des lymphocytes : **BCR** (lymphocytes B, reconnaissance directe d'épitopes conformationnels sur antigène libre) et **TCR** (lymphocytes T, reconnaissance d'épitopes linéaires uniquement présentés par le CMH : classe I → LT CD8, classe II → LT CD4).
- Un anticorps ou un récepteur reconnaît un **épitope** précis, jamais l'antigène entier.
- La **tolérance centrale du soi** est acquise lors de la maturation des lymphocytes (thymus/moelle osseuse) par sélection négative (apoptose des clones auto-réactifs forts).
- Conséquence médicale majeure : typage HLA et immunosuppresseurs pour les greffes d'organes ; rupture de la tolérance → maladies auto-immunes.

Maintenant que nous savons qui reconnaît (lymphocytes B et T), quoi est reconnu (épitopes sur antigènes, présentés ou non par le CMH) et comment le soi est toléré (sélection négative), il reste à comprendre comment l'organisme riposte concrètement lors d'une première rencontre avec un pathogène. Nous commencerons, dans la section suivante, par les réactions immédiates et stéréotypées de l'immunité non spécifique (innée), avant d'étudier les réponses spécifiques adaptatives à médiation cellulaire et humorale.

3 LA RÉPONSE IMMUNITAIRE NON SPÉCIFIQUE (RAPPELS)

Dans la section précédente, nous avons vu comment l'organisme **reconnaît** le non-soi grâce aux récepteurs de type **TLR** (Toll-Like Receptors) sur les cellules sentinelles (macrophages, cellules dendritiques, mastocytes) qui détectent les **MAP** (motifs moléculaires associés aux pathogènes). Cette reconnaissance déclenche immédiatement une riposte rapide, stéréotypée et sans mémoire : c'est la **réponse immunitaire non spécifique** (ou innée). Elle constitue la première ligne de défense efficace dans les premières heures (0 h à 96 h) suivant une agression, avant que la réponse spécifique ne se mette en place. Au Cameroun, comme partout sous les tropiques, où la pression infectieuse (paludisme, infections respiratoires, diarrhées, plaies souillées) est forte, cette immunité innée est le rempart quotidien de nos populations.

3.1 Les barrières naturelles : la première ligne de défense

Avant même qu'un agent pathogène ne pénètre les tissus, il doit franchir des barrières physiques, chimiques et biologiques constitutives.

DÉFINITION Réponse immunitaire non spécifique (innée)

Ensemble des mécanismes de défense présents dès la naissance, qui s'activent immédiatement face à tout agresseur (bactérie, virus, champignon, corps étranger) sans reconnaissance antigénique spécifique et sans mémoire. Elle repose sur des barrières anatomiques, des cellules effectrices (phagocytes, NK) et des médiateurs solubles (complément, cytokines, lysozyme).

1. Barrières physiques et mécaniques. La **peau** (épiderme kératinisé, sec, pH acide $\approx 5,5$) et les **muqueuses** (épithélium jointif, cils vibratiles des voies respiratoires, péristaltisme intestinal, flux urinaire) empêchent l'adhésion et la pénétration des microbes. L'intégrité de ces barrières est cruciale : une brûlure étendue, une plaie profonde ou une sonde urinaire constituent des portes d'entrée majeures pour les infections nosocomiales dans nos hôpitaux (CHU de Yaoundé, Douala, Garoua).

2. Barrières chimiques. Les sécrétions contiennent des substances antimicrobiennes :

- **Lysozyme** (larmes, salive, mucus) : hydrolyse la paroi bactérienne (peptidoglycane) → lyse des Gram+.
- **Suc gastrique** (pH 1,5 à 2,0) : détruit la majorité des bactéries ingérées (sauf *Helicobacter pylori* adapté).
- **Acides gras** à chaîne courte (peau, sébum) : pH acide, effet bactériostatique.
- **Défensines** et **cathélicidines** : peptides antimicrobiens produits par épithéliums et neutrophiles (perturbent membranes microbiennes).

3. Barrière biologique : la flore commensale (microbiote). La peau, le tube digestif, le vagin sont colonisés par une flore résidente (e14 bactéries dans le côlon) qui empêche l'implantation de pathogènes par **compétition nutritionnelle**, **exclusion de niche** et **production de bactériocines**. Une antibiothérapie large spectre mal conduite (fréquente en automédication à Yaoundé ou Douala) détruit cette flore et favorise les surinfections (*Candida albicans*, *Clostridioides difficile*).

EXEMPLE Contexte camerounais : la diarrhée de l'enfant

Un enfant de 18 mois admis au Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya pour diarrhée aqueuse aiguë. L'examen coproscopique montre une flore fécale appauvrie en bactéries lactiques (bifidobactéries) après un traitement antibiotique empirique non justifié. La barrière biologique est effondrée : une souche de *Salmonella Typhimurium*, habituellement tenue en échec par le microbiote, prolifère et envahit la muqueuse. La réhydratation orale (SRO) et l'apport de probiotiques (yaourt local, sachets de Saccharo-

myces boulardii) visent à restaurer cette barrière.

3.2 La phagocytose : le « nettoyage » cellulaire

Lorsque les barrières sont franchies, les **phagocytes professionnels** — **polynucléaires neutrophiles (PNN)** (premiers arrivés, vie courte 1 d à 2 d) et **macrophages** (issus des monocytes, résidents tissulaires, vie longue, grande capacité digestive) — engloutissent et détruisent l'agresseur.

DÉFINITION Phagocytose




Processus cellulaire actif par lequel un phagocyte (PNN, macrophage) adhère à une particule (bactérie, débris cellulaire), l'intériorise dans une vésicule (**phagosome**), la fusionne avec des lysosomes pour former un **phagolysosome** où des enzymes hydrolytiques et des espèces réactives de l'oxygène (ERO) digèrent la particule, puis rejette les résidus indigestes par exocytose.

EXPÉRIENCE Mise en évidence des étapes de la phagocytose (modèle de Metchnikoff / observation moderne)

Observation : Au microscope optique (objectif $\times 40$ ou $\times 100$), on met en contact des macrophages péritonéaux de souris (ou lignée RAW 264.7) avec des levures *Saccharomyces cerevisiae* (ou billes de latex opsonisées) marquées au vert, et un colorant lysosomal rouge (LysoTracker). Protocole : Temps 0 : mélange. Incubation à 37 °C. Observation en microscopie vidéo (time-lapse) toutes les 30 s pendant 30 min. Résultats attendus (schématisés ci-dessous) :

1. Adhérence (0 min à 2 min) : Contact membrane-leurre via récepteurs (scavengers, mannose, Fc γ R si opsonisation). Étalement de pseudopodes.
2. Endocytose / Formation du phagosome (2 min à 10 min) : Fermeture des pseudopodes → vésicule intracellulaire (phagosome vert) distincte du cytoplasme.
3. Maturation / Digestion (10 min à 30 min) : Fusion phagosome-lysosomes (apparition signal rouge superposé au vert = phagolysosome jaune/orange). Acidification (pH 4,5 à 5,0), activation hydrolases, **éclat respiratoire** (production $O_2^{\cdot -}$, H_2O_2 , HOCl via NADPH oxydase / MPO). Le signal vert (levure) s'estompe (digestion).
4. Exocytose / Rejet (> 30 min) : Rejet des résidus indigestes (hème, paroi bactérienne modifiée) hors de la cellule.

Interprétation : La phagocytose est un processus séquentiel, énergétiquement coûteux (ATP pour cytosquelette, éclat respiratoire), aboutissant à la destruction intracellulaire de l'agresseur.



Les quatre étapes séquentielles de la phagocytose par un macrophage : (1) adhérence de la bactérie aux récepteurs membranaires et émission de pseudopodes ; (2) endocytose et formation du phagosome ; (3) fusion avec les lysosomes → phagolysosome, acidification, éclat respiratoire et digestion ; (4) exocytose des résidus indigestes.

MÉTHODE Reconnaître les étapes de la phagocytose sur un document microscopique

1. Identifier la cellule : grand noyau souvent lobé (PNN) ou réniforme/excentré (macrophage), cytoplasme abondant.
2. Repérer les vésicules : cercles clairs (phagosomes) ou colorés (phagolysosomes si coloration lysosomale).
3. Ordonner chronologiquement : bactérie extracellulaire collée → bactérie dans vésicule claire → vésicule foncée/colorée (digestion) → vésicule résiduelle rejetée.
4. Noter l'opsonisation : si présence d'anticorps/complément (non visible en microscopie ordinaire, mais inféré si phagocytose très efficace).

ATTENTION Pièges fréquents

- Confondre phagocytose (particules solides > 0,5 μm : bactéries, levures, débris) et pinocytose (fluide, macromolécules, vésicules < 0,1 μm).
- Oublier que la phagocytose est active (consomme ATP, réarrangement actinomyosine) et non une simple diffusion.
- Croire que tous les leucocytes phagocytent : les lymphocytes B et T NE phagocytent PAS (sauf rares sous-populations innées-like).
- Négliger l'opsonisation (recouvrement par IgG, C3b) qui augmente l'efficacité 100 à 1000 fois via récepteurs Fc γ R et CR1.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse d'une courbe cinétique de phagocytose

Énoncé : On incubé des macrophages avec des billes de latex opsonisées. On compte le % de macrophages ayant au moins une bille à différents temps. Résultats :

Temps (min)	0	5	15	30	60	120
% Macrophages phagocytants	0	15	55	85	95	95

1. Tracer la courbe. 2. Interpréter la forme. 3. Calculer la vitesse initiale (0–15 min).

SOLUTION

Solution : 1. Courbe sigmoïde (en S) : phase de latence (0–5 min), phase exponentielle (5–30 min), plateau de saturation (60 min). 2. Latence : temps de reconnaissance, adhérence, émission pseudopodes. Exponentielle : phagocytose active, toutes les cellules recrutées. Plateau : saturation des capacités phagocytaires (nombre limité de phagosomes/cellule) ou épuisement des billes accessibles. 3. Vitesse initiale $\approx \frac{55-0}{15-0} = 3,67\%/min$ (ou en valeur absolue si nombre total cellules connu).

3.3 La réaction inflammatoire : l'appel des renforts

La phagocytose locale peut être débordée. La **réaction inflammatoire** est la réponse vasculaire et cellulaire qui recrute massivement les effecteurs du sang vers le foyer infectieux.

DÉFINITION Réaction inflammatoire

Réponse stéréotypée, non spécifique, déclenchée par une agression (infection, traumatisme, brûlure), associant quatre signes cardinaux (rubor, calor, tumor, dolor) dus à la vasodilatation, l'hyperperméabilité vasculaire et l'infiltration leucocytaire, orchestrée par des médiateurs chimiques (histamine, prostaglandines, cytokines, complément).

Mécanismes moléculaires et cellulaires (démarche d'investigation).

EXPÉRIENCE Mise en évidence du rôle de l'histamine et de la diapédèse (modèle de la poche cutanée / fenêtre de Miles)

Observation : Injection intradermique d'histamine (10 µg) vs sérum physiologique (témoin) sur l'avant-bras d'un volontaire sain. Résultats (à 5 min à 10 min) :

- Site histamine : **Papule** (gonflement blanc central = œdème par extravasation plasma), **Érythème** (zone rouge périphérique = vasodilatation artériolaire), **Chaleur** locale, **Douleur** / prurit.
- Témoin : Aucune réaction.

Interprétation : L'histamine (libérée par **mastocytes** et **basophiles** tissulaires suite à activation TLR, complément C5a, traumatisme) agit sur récepteurs H1 des cellules endothéliales → contraction des jonctions intercellulaires → hyperperméabilité (sortie plasma → œdème/tumor) et sur muscle lisse vasculaire → vasodilatation (rubor, calor). La douleur (dolor) est due à la compression des terminaisons nerveuses par l'œdème et à l'action directe de médiateurs (bradykinine, prostaglandines PGE_2).




Schéma comparatif : à gauche, capillaire au repos (endothélium jointif, flux rapide, mastocyte granulé); à droite, foyer inflammatoire : vasodilatation (calor, rubor), hyperperméabilité (œdème/tumor), dégranulation mastocytaire (histamine), adhérence et diapédèse des polynucléaires neutrophiles (PNN) et monocytes vers le tissu (chimioattractisme).

MÉTHODE
Relier les signes cliniques de l'inflammation aux mécanismes physiopathologiques

Sur un document (photo clinique, schéma, tableau de signes) :

1. Lister les 4 signes cardinaux : Rougeur (Rubor), Chaleur (Calor), Gonflement (Tumor), Douleur (Dolor). (Optionnel : Functio laesa = perte de fonction).
2. Associer chaque signe à sa cause vasculaire/cellulaire :
 - Rubor + Calor ← Vasodilatation artériolaire (afflux sanguin).
 - Tumor ← Hyperperméabilité veineuse → extravasation plasma (œdème) + infiltration leucocytaire.
 - Dolor ← Compression nerfs par œdème + médiateurs algogènes (bradykinine, PGE_2).
3. Identifier les cellules et médiateurs clés : Mastocytes (histamine), Endothélium (jonctions), PNN (premiers infiltrés, 2 h à 6 h), Monocytes/Macrophages (plus tard, 24 h à 48 h), Chimioattractants (gradient).

ATTENTION L'inflammation et la fièvre sont des alliés, pas des ennemis !

- Ne pas confondre symptôme et maladie. La fièvre ($> 38,5^{\circ}\text{C}$) inhibe la réplication virale/bactérienne, stimule la prolifération lymphocytaire et l'activité des PNN. La traiter systématiquement (paracétamol) peut retarder la guérison (études sur grippe, varicelle).
- L'inflammation aiguë est bénéfique : elle isole le foyer (fibrine), apporte effecteurs (PNN, Ac, complément) et nettoie (macrophages). La bloquer (corticoïdes, AINS puissants) trop tôt ou sans indication précise risque de transformer une infection banale en septicémie.
- Seul un médecin évalue le rapport bénéfice/risque (ex. : méningite purulente $\rightarrow$ dexaméthasone adjonctive OBLIGATOIRE avant antibiotiques pour limiter l'œdème cérébral ; arthrite septique $\rightarrow$ drainage chirurgical + ATB, pas seulement AINS).

LESAVAIS-TU ? Le pus : un cimetière de héros

Le pus (matière jaune-verdâtre, épaisse) qui s'écoule d'un abcès ou d'un bouton infecté (furuncle) est composé à 90–95 % de polynucléaires neutrophiles MORTS (noyaux lysés, ADN extracellulaire $\rightarrow$ viscosité), de débris bactériens, de tissu nécrosé et de liquide interstitiel. La couleur verte de certaines infections à *Pseudomonas aeruginosa* vient de la **pyocyanine** (pigment bactérien). Ne jamais « percer » soi-même un abcès : risquer de disséminer l'infection en profondeur (phlegmon, septicémie). Au dispensaire, le médecin pratique une incision-drainage stérile + prélèvement pour antibiogramme.

3.4 Caractéristiques, limites et articulation avec la réponse spécifique

PROPRIÉTÉ Caractères définitoires de l'immunité non spécifique

- Rapidité : Secondes à heures (barrières, phagocytose, inflammation) vs jours (spécifique).
- Universalité / Non-spécificité : Même réponse quel que soit l'agent (Gram+, Gram-, virus, champignon, éclat de bois). Pas de récepteurs clonaux réarrangés.
- Absence de mémoire : Pas de réponse plus rapide/forte lors d'une 2^e rencontre. Pas de lymphocytes mémoire innés (sauf phénomène récent d'trained immunity / mémoire innée via reprogrammation épigénétique des monocytes, hors programme Bac).
- Héritaire : Génome non modifié, identiques chez tous les individus d'une espèce.

À RETENIR Limites de l'immunité innée et relais vers l'adaptative

1. Dépassement quantitatif : Nombre de pathogènes > capacité phagocytaire (ex. : septicémie à ≥ 8 UFC/mL).
2. Évasion microbienne : Capsules anti-phagocytaires (*Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella*), toxines lysant les PNN (*Staph. aureus* : leucocidine), survie intracellulaire (*Mycobacterium tuberculosis*, *Salmonella*, *Listeria*).
3. Relais obligatoire : Les macrophages (et cellules dendritiques) qui ont phagocyté migrent vers le ganglion drainant via lymphatiques. Ils deviennent Cellules Présentatrices d'Antigène Professionnelles (CPAP) : ils présentent des peptides antigéniques sur **CMH de classe II** aux **lymphocytes T CD4⁺ naïfs** → déclenchement réponse spécifique (voir Section 4).

EXEMPLE Articulation innée / adaptative : le cas de la tuberculose

Au Centre Jamot de Yaoundé (référence TB), un patient présente une tuberculose pulmonaire. *Mycobacterium tuberculosis* (bacille acido-alcool résistant, BAAR) résiste à la digestion dans le macrophage (inhibition fusion phagosome-lysosome, paroi cireuse mycoliques). L'immunité innée contient mais n'élimine pas : formation de **granulome** (macrophages épithélioïdes, géants multinucléés, couronne lymphocytaire). Seule la réponse spécifique (Th1 → IFN- γ → activation macrophage « tueur » + cytolytique CD8) peut stériliser le foyer. Le test tuberculinique (IDR) et l'IGRA (dosage IFN- γ sanguin) mesurent cette mémoire spécifique, pas l'innée.

EXERCICE 2 Entraînement Bac : Analyse d'un document sur l'inflammation

Document : Coupe histologique d'un ganglion lymphatique drainant un abcès cutané à *Staphylococcus aureus* (coloration H&E). On observe : 1/ Zone corticale : follicles lymphoïdes réactifs (centres germinatifs). 2/ Zone paracorticale : forte hyperplasie, nombreux lymphoblastes, mitoses. 3/ Sinus médullaires : distendus, remplis de polynucléaires neutrophiles (PNN) et de macrophages chargées de débris. 4/ Vaisseaux à haute endothélias (HEV) : endothélium cuboïde, adhérence de lymphocytes.

Questions : 1. Identifier les signes histologiques de la réaction inflammatoire aiguë dans les sinus. 2. Expliquer la présence massive de PNN dans les sinus médullaires (origine, chemin, molécules d'adhérence). 3. Relier l'hyperplasie paracorticale et les centres germinatifs à la réponse immunitaire spécifique naissante. 4. Quel est le rôle des HEV dans ce contexte ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Signes inflammatoires aigus : Infiltrat massif de PNN (noyaux lobés, cytoplasme clair) dans les sinus → marqueur de l'inflammation aiguë bactérienne (diapédèse, chimioattractisme IL-8, C5a, LTB4). Œdème (sinus distendus). Macrophages phagocytaires (cytoplasme abondant, débris). 2. Origine & chemin : PNN ← Moelle osseuse (hématopoïèse d'urgence stimulée par G-CSF) → Sang (marge → roulement sur endothélium activé via selectines E/P → activation intégrines β_2 (LFA-1/Mac-1) sur ICAM-1/2 endothélial → arrêt ferme → diapédèse → chimioattractisme vers ganglion via lymphatiques afférents ou voie sanguine). 3. Hyperplasie paracorticale / centres germinatifs : Zone T (paracortex) : prolifération clonale lymphocytes T CD4⁺ activés par DCs présentatrices (migrées du foyer). Centres germinatifs (zone B) : prolifération clonale lymphocytes B, hypermutation somatique, commutation de classe → production IgG anti-staphylocoque (toxines, protéines de surface). 4. HEV (High Endothelial Venules) : Porte d'entrée spécifique des lymphocytes naïfs (CD62L / L-selectine ↔ adhésines PNA sur HEV) → CCR7 ↔ CCL19/21 → entrée dans ganglion pour rencontre antigène. Preuve du recrutement actif de la réponse adaptative.

4 LA RÉPONSE IMMUNITAIRE SPÉCIFIQUE : MÉDIATION CELLULAIRE ET HUMORALE

Après avoir vu comment l'immunité non spécifique constitue une première ligne de défense rapide mais peu discriminante, nous abordons maintenant la réponse immunitaire **spécifique** (ou adaptative). Elle se caractérise par sa capacité à reconnaître précisément un antigène donné, à amplifier une réponse ciblée et à conserver une **mémoire** permettant une réaction plus rapide et plus intense lors d'une seconde rencontre. Cette réponse se déploie selon **deux voies effectrices** qui collaborent : la médiation cellulaire et la médiation humorale.

4.1 Deux voies de réponse spécifique

DÉFINITION Réponse à médiation cellulaire

Réponse immunitaire spécifique dont les effecteurs sont des **lymphocytes T cyto-toxiques (LT8)** qui détruisent directement les cellules de l'organisme présentant un antigène étranger associé à leur molécule de **CMH de classe I** (cellules infectées par un virus, cellules cancéreuses, greffon allogénique).

DÉFINITION Réponse à médiation humorale

Réponse immunitaire spécifique dont les effecteurs sont des **anticorps** (immunoglobulines) sécrétés par les **plasmocytes**, issus de la différenciation des **lymphocytes B (LB)** activés. Les anticorps agissent dans les liquides extracellulaires (sang, lymph, liqueurs biologiques) contre les antigènes libres ou portés par des agents pathogènes extracellulaires (bactéries, toxines, virus avant pénétration cellulaire).

DÉFINITION Plasmocyte

Cellule effectrice de la réponse humorale, issue de la différenciation terminale d'un lymphocyte B activé. C'est une usine à anticorps : son cytoplasme est riche en réticulum endoplasmique rugueux et en appareil de Golgi, lui permettant de synthétiser et de sécréter jusqu'à 10000 molécules d'anticorps par seconde.

DÉFINITION Anticorps (immunoglobuline)

Glycoprotéine en Y, composée de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères, dont la région variable (extrémités des bras du Y) assure la reconnaissance spécifique d'un **épitope** antigénique, et la région constante (pied du Y) détermine la classe (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) et les fonctions effectrices (fixation du complément, liaison aux récepteurs Fc des phagocytes, passage placentaire).

4.2 Mise en évidence expérimentale de la médiation cellulaire : le rejet de greffe

L'expérience classique qui a démontré le rôle des **cellules** (et non des anticorps) dans le rejet de greffe est due à **Mitchison (1954)** et confirmée par de nombreux travaux ultérieurs.

EXPÉRIENCE Transfert du rejet de greffe : cellules vs sérum

Protocole :

1. Des souris de souche A reçoivent une greffe de peau de souche B (allogreffe). Elles rejettent la greffe en 10 d à 12 d (rejet de premier contact).
2. On prélève des lymphocytes (ganglions, rate) et du sérum (sang décoagulé, sans cellules) chez ces souris « rejetées » (immunisées).
3. On transfère séparément :
 - des lymphocytes de souris rejetées → souris naïves (non immunisées) de souche A (récepteurs) qui reçoivent une greffe de souche B ;

- du sérum de souris rejetées → autres souris naïves de souche A recevant une greffe de souche B.

4. On surveille le sort des greffes chez les récepteurs.

Observations :

- Les souris ayant reçu des lymphocytes rejettent la greffe en 5 d à 6 d (rejet accéléré, signe de mémoire).
- Les souris ayant reçu du sérum rejettent la greffe en 10 d à 12 d (délai normal de premier contact, pas d'accélération).

Interprétation : Seuls les lymphocytes (cellules) transfèrent la capacité de rejet accéléré. Le sérum, qui contient les anticorps, ne transfère pas cette immunité. La réponse de rejet de greffe est donc une réponse à médiation cellulaire.


Expérience de transfert adoptif démontrant que l'immunité de rejet de greffe est transférée par les cellules (lymphocytes T) et non par le sérum (anticorps).

ATTENTION Piège fréquent

Ne pas confondre « réponse cellulaire » (effecteurs = cellules T cytotoxiques) et « immunité cellulaire » (terme ancien parfois utilisé pour désigner toute réponse impliquant des cellules). Au Bac, on parle de réponse à médiation cellulaire pour la voie LT8, et de réponse à médiation humorale pour la voie anticorps/LB/plasmocytes.

4.3 Mécanisme de la médiation cellulaire : destruction des cellules cibles

La réponse à médiation cellulaire vise à éliminer les **cellules altérées du soi** (infectées, tumorales, greffées). Elle repose sur la reconnaissance d'un complexe **antigène peptidique + CMH de classe I** par le récepteur du lymphocyte T cytotoxique (LT8).



Mécanisme de la réponse à médiation cellulaire : reconnaissance de la cellule infectée (CMH I + peptide viral) par le LT8, activation avec aide des LT4 (IL-2), expansion clonale, destruction de la cellule cible par perforines et granzymes (apoptose).

PROPRIÉTÉ Sélection et expansion clonale (théorie de Burnet, 1957 — savoir admis)

La spécificité de la réponse immunitaire repose sur la **sélection clonale** : parmi le répertoire préexistant de lymphocytes aux récepteurs divers (générés par recombinaison V(D)J), seuls ceux dont le récepteur reconnaît l'antigène sont sélectionnés, activés, et subissent une multiplication clonale massive (mitoses successives) pour produire une population de cellules effectrices (LT8, plasmocytes) et de cellules mémoire, toutes porteuses du même récepteur spécifique.

À RETENIR Étapes clés de la médiation cellulaire

1. **Reconnaissance** : Le TCR du LT8 (co-récepteur CD8) lie un peptide antigénique présenté par le CMH de classe I à la surface d'une cellule cible (cellule infectée, cellule tumorale, greffon).
2. **Activation (avec aide des LT4)** : La reconnaissance seule est insuffisante. Le LT4 spécifique du même antigène (présenté par le CMH II d'une cellule présentatrice d'antigène) sécrète de l'IL-2 (interleukine-2) qui stimule la prolifération du LT8.
3. **Expansion clonale** : Le LT8 activé se divise rapidement → armée de LT8 effecteurs (cytotoxiques) + LT8 mémoire.
4. **Effet effecteur** : Le LT8 effecteur forme une synapse immunologique avec la cellule cible et libère des perforines (forment des pores dans la membrane) et des granzymes (sérine-protéases qui déclenchent la cascade des caspases) → apoptose de la cellule cible.

4.4 Mise en évidence expérimentale de la médiation humorale : la sérothérapie

L'histoire de la médecine fournit la preuve classique du rôle des **anticorps** (facteurs solubles du sérum) dans la protection contre les toxines et bactéries extracellulaires.

EXPÉRIENCE**Sérothérapie anti-diphtérique et anti-tétanique (von Behring & Kitasato, 1890 ; prix Nobel 1901)**

Contexte : La diphtérie et le tétanos sont dus à des toxines bactériennes solubles qui diffusent dans l'organisme. Protocole :

1. Immunisation d'animaux (chevaux, moutons) par injections répétées de toxines atténuées (anatoxines) → production d'anticorps anti-toxines.
2. Prélèvement du sérum de ces animaux immunisés (sérum antivenimeux, antidiphtérique, antitétanique).
3. Injection de ce sérum à des animaux (ou humains) non immunisés, puis exposition à la toxine mortelle.

Observation : Les animaux receveurs du sérum sont protégés (neutralisation de la toxine). La protection est immédiate mais temporaire (quelques semaines, durée de vie des anticorps IgG ≈ 21 d à 28 d). Interprétation : Le sérum (donc les anticorps) transfère la protection. C'est une immunité passive (anticorps préformés, pas de mémoire induite chez le receveur). La réponse humorale est à médiation anticorps.


La sérothérapie historique démontre que les anticorps (contenus dans le sérum) confèrent une protection contre les toxines extracellulaires.

EXEMPLE**Sérothérapie antivenimeuse au Cameroun**

Au Cameroun, les morsures de serpents venimeux (*Echis ocellatus*, *Naja nigricollis*, *Bitis gabonica*) constituent une urgence médicale fréquente en zone rurale (régions du Nord, de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord). Le traitement de référence est l'injection intraveineuse de sérum antivenimeux polyvalent (ex. Inoserp ou FAV-Afrique), produit par immunisation de chevaux avec des venins de plusieurs espèces. Ce sérum contient des anticorps (principalement IgG) qui neutralisent les toxines du venin (neurotoxines, hémorragiques, nécrosantes). C'est une application directe de la médiation humorale : transfert d'anticorps préformés pour une protection immédiate. Attention : ce sérum peut provoquer des réactions allergiques (choc anaphylactique, maladie du sérum) → administration en milieu hospitalier sous surveillance.

4.5 Mécanisme de la médiation humorale : des LB aux plasmocytes

La réponse humorale cible les **antigènes libres** ou les **pathogènes extracellulaires**. Elle nécessite l'activation des lymphocytes B (LB).



Mécanisme de la réponse à médiation humorale : activation du LB par l'antigène avec aide des LT4 (double reconnaissance), expansion clonale, différenciation en plasmocytes, sécrétion d'anticorps et leurs modes d'action.

À RETENIR

Étapes clés de la médiation humorale

1. **Reconnaissance et capture** : Le BCR (récepteur du LB, IgM/IgD membranaires) lie l'antigène natif (conformationnelle). Le complexe BCR-Ag est internalisé par endocytose.
2. **Présentation et aide des LT4** : Le LB traite l'antigène et présente des peptides sur son CMH de classe II. Un LT4 spécifique du même antigène (activé par une CPA professionnelle) reconnaît ce complexe via son TCR + CD4. Cette double reconnaissance (LT4 voit Ag + CMH II sur le LB) déclenche l'activation du LT4 qui exprime CD40L et sécrète des cytokines (IL-4, IL-5, IL-6, IL-21) → signaux co-stimulateurs indispensables pour le LB (réponse T-dépendante).
3. **Activation, expansion clonale et différenciation** : Le LB activé prolifère (expansion clonale) et se différencie en :
 - Plasmocytes (cellules effectrices de courte durée, 3 d à 5 d, usines à anticorps) ;
 - Lymphocytes B mémoire (longue durée, réponse secondaire rapide).
4. **Action des anticorps** : Sécrétés dans le sang et la lymphe, ils agissent par plusieurs mécanismes (voir ci-dessous).

4.6 Modes d'action des anticorps

Les anticorps ne tuent pas directement ; ils **marquent** l'antigène pour faciliter son élimination par d'autres composants du système immunitaire.

PROPRIÉTÉ Quatre modes d'action principaux des anticorps

1. **Neutralisation** : L'anticorps masque le site actif d'une toxine ou le domaine de fixation d'un virus sur son récepteur cellulaire → empêche l'action pathogène. Exemple : anticorps anti-toxine tétanique, anticorps neutralisants anti-VIH (recherchés pour les vaccins).
2. **Agglutination / Précipitation** : Les anticorps (notamment IgM pentamères, IgG) lient plusieurs antigènes entre eux (agglutinines) ou précipitent des antigènes solubles (précipitines) → forment des complexes immuns volumineux, facilement phagocytés.
3. **Opsonisation** : La région constante (Fc) de l'IgG se lie aux récepteurs Fcγ des phagocytes (macrophages, neutrophiles) → facilite la phagocytose de la bactérie opsonisée. C'est un mécanisme majeur contre les bactéries encapsulées (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*).
4. **Activation de la voie classique du complément** : La fixation de C1q sur les régions Fc d'IgG ou d'IgM agrégées déclenche la cascade du complément → formation du Complexe d'Attaque Membranaire (MAC, C5b-9) → lyse de la bactérie (surtout Gram-négatif) ou de la cellule cible. Le C3b déposé agit aussi comme opsonine.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

- Les anticorps n'entrent PAS dans les cellules. Ils agissent exclusivement dans les milieux extracellulaires (sang, lymphe, liquide interstitiel, muqueuses pour IgA). Ils ne peuvent pas atteindre un virus déjà à l'intérieur d'une cellule infectée → c'est le rôle des LT8 (médiation cellulaire).
- Ne pas confondre opsonisation (Ac + récepteur Fc sur phagocyte) et activation du complément (cascade enzymatique → lyse + C3b opsonine). Les deux facilitent la phagocytose mais par des récepteurs différents (FcγR vs CR1 pour C3b).
- L'IgM est le premier anticorps produit (réponse primaire), pentamère, très efficace pour activer le complément et agglutiner, mais de faible affinité. L'IgG domine la réponse secondaire (affinité mature, passe le placenta, opsonisation forte).

4.7 Coopération cellulaire : le rôle central des LT4 (CD4⁺)

C'est le point d'articulation clé entre les deux voies et la clé de compréhension de la pathogénie du VIH/Sida.




Schéma de la coopération cellulaire : le LT4 (CD4⁺), activé par une CPA, apporte l'aide nécessaire (CD40L, IL-2, IL-4, etc.) à la fois au LB (voie humorale) et au LT8 (voie cellulaire). La destruction des LT4 par le VIH paralyse les deux bras de l'immunité spécifique.

PROPRIÉTÉ Rôle pivot des LT4 (Th = T helper)

Les lymphocytes T auxiliaires (LT4, CD4⁺) sont les chefs d'orchestre de l'immunité adaptative. Après leur activation par une CPA (signaux 1, 2, cytokines polarisantes), ils :

- expriment **CD40L (CD154)** qui lie **CD40** sur le LB et la CPA (licensing) ;
- sécrètent des cytokines différenciées selon le profil Th1/Th2/Th17/Tfh :
 - **IL-2** : facteur de croissance autocrine pour LT4 et paracrine pour LT8 (prolifération) ;
 - **IL-4, IL-5, IL-6, IL-21** (profil Th2/Tfh) : activation, commutation de classe (IgG, IgE, IgA), différenciation en plasmocytes (voie humorale) ;
 - **IFN-γ** (profil Th1) : activation macrophagique, commutation vers IgG opsonisantes, soutien LT8.

Conséquence majeure : La déplétion des LT4 par le VIH entraîne une immunodéficience combinée : défaut de réponse humorale (pas d'aide aux LB) ET défaut de réponse cellulaire (pas d'IL-2 pour LT8).

4.8 Tableau comparatif : médiation cellulaire vs médiation humorale

Critère	Médiation cellulaire (LT8)	Médiation humorale (LB → Plasmocytes / Ac)
Effecteur principal	Lymphocyte T cytotoxique (LT8, CD8 ⁺)	Plasmocyte (usine) → Anticorps (IgG, IgM, IgA, IgE)
Cible	Cellules altérées du soi : infectées (virus, bactéries intracellulaires), tumorales, greffon allogénique	Antigènes libres / Pathogènes extracellulaires : bactéries, toxines, virus libres, parasites extracellulaires
Reconnaissance	TCR + CD8 lie peptide + CMH I (sur toute cellule nucléée)	BCR (IgM/IgD membranaire) lie antigène natif (conformationnel) ; puis présentation peptide + CMH II au LT4
Activation	Nécessite aide des LT4 (IL-2) après double reconnaissance (CPA + LT4)	Nécessite aide des LT4 (CD40L, IL-4, IL-5, IL-6, IL-21) après double reconnaissance (LB présente au LT4)
Mécanisme effecteur	Contact direct : synapse immunologique → perforines + granzymes → apoptose de la cellule cible	À distance (liquides) : neutralisation, agglutination, opsonisation (phagocytose), activation complément (lyse)
Transfert adoptif	Transférable par les cellules (lymphocytes) — expérience de Mitchison	Transférable par le sérum (anticorps) — sérothérapie von Behring
Immunité passive	Non transférable durablement (cellules rejetées si allogéniques)	Transférable : sérum immune, colostrum (IgA), IgG placentaires
Exemple pathologique	Rejet de greffe, contrôle infections virales, surveillance tumorale	Protection anti-toxines (tétanos, diphtérie), bactéries encapsulées, neutralisation virale

MÉTHODE Attribuer une immunité à la médiation cellulaire ou humorale

Pour déterminer si une immunité est à médiation cellulaire ou humorale, on réalise des transferts adoptifs chez un animal naïve (syngénique ou immunosupprimé) :

1. Prélever séparément les lymphocytes (purifiés sur gradient Ficoll ou tri magnétique CD3⁺) et le sérum d'un animal immunisé.
2. Transférer uniquement les lymphocytes → groupe 1 ; uniquement le sérum → groupe 2 ; les deux → groupe 3 ; témoin (sérum/lymphocytes naïfs) → groupe 4.
3. Mettre au contact de l'antigène / pathogène / greffon.
4. Interpréter :
 - Protection par les lymphocytes seulement → médiation cellulaire.

- Protection par le sérum seulement → médiation humorale.
- Protection par les deux → coopération des deux voies (cas fréquent).

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une expérience de transfert adoptif

Énoncé : On immunise des souris de souche BALB/c contre un virus intracellulaire. Après 14 jours, on prélève rate (lymphocytes) et sérum. On transfère :

- Groupe A : lymphocytes de souris immunisées → souris naïves BALB/c.
- Groupe B : sérum de souris immunisées → souris naïves BALB/c.
- Groupe C : lymphocytes + sérum → souris naïves BALB/c.
- Groupe Témoin : lymphocytes + sérum de souris naïves.

Tous les groupes sont ensuite infectés par le virus. On mesure la charge virale dans la rate à J+5. Résultats : Charge virale ($\log_{10}$ PFU/g) : Témoin = 7,2 ; Groupe A = 3,1 ; Groupe B = 6,9 ; Groupe C = 2,8. Questions :

1. Quelle voie de l'immunité spécifique est principalement responsable de la protection contre ce virus ? Justifier.
2. Pourquoi le sérum seul (Groupe B) ne protège-t-il pas efficacement ?
3. Quel type de lymphocytes est transféré dans le Groupe A pour conférer la protection ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Médiation cellulaire. Le Groupe A (lymphocytes seuls) réduit la charge virale de 4,1 log (soit ≈ 12500 fois moins de virus) par rapport au témoin, alors que le Groupe B (sérum seul) ne réduit que de 0,3 log (non significatif). Le transfert de la protection par les cellules et non par le sérum signe une immunité à médiation cellulaire.
2. Le virus est intracellulaire. Les anticorps (contenus dans le sérum) n'ont pas accès au virus à l'intérieur des cellules infectées. Ils ne peuvent neutraliser que les virions libres extracellulaires, ce qui est insuffisant pour contrôler une infection établie. Seuls les LT8 peuvent reconnaître et tuer les cellules infectées (complexe peptide viral + CMH I).
3. Les lymphocytes T cytotoxiques (LT8, CD8⁺) spécifiques du virus. Ce sont les effecteurs de la médiation cellulaire. Le transfert inclut aussi des LT4 mémoire qui fourniront l'IL-2 nécessaire à l'expansion des LT8 chez le receveur.

LESAVAIS-TU ? Le VIH cible le chef d'orchestre

Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) infecte préférentiellement les cellules exprimant le récepteur CD4 : les LT4, mais aussi les macrophages et les cellules dendritiques. En détruisant massivement les LT4 (par lyse virale, apoptose, mort par syncytia, élimination par LT8 anti-VIH), le VIH prive l'organisme de l'aide indispensable aux deux bras de l'immunité spécifique :

- Pas d'IL-2 → pas d'expansion clonale des LT8 → infections virales opportunistes, cancers (lymphomes, sarcome de Kaposi).
- Pas de CD40L / IL-4 / IL-21 → pas d'activation des LB, pas de commutation de classe, pas de plasmocytes → hypogammaglobulinémie paradoxale (malgré hypergammaglobulinémie polyclonale non spécifique), défaut de réponse aux nouveaux antigènes (vaccins inefficaces), infections bactériennes récidivantes.

C'est pourquoi le Sida (stade terminal) se définit par une immunodéficience combinée sévère (cellulaire + humorale). La thérapie antirétrovirale (ARV) vise à bloquer la réplication virale pour permettre la reconstitution des LT4 (réparation immunitaire).

EXERCICE 3 Entraînement Bac — Médiation cellulaire vs humorale

Un patient présente une infection à *Mycobacterium tuberculosis* (bacille de Koch, bactérie intracellulaire facultative, se multiplie dans les macrophages). On isole des lymphocytes de ce patient et on les met en culture avec des macrophages infectés par le BCG (vaccin atténué). On observe une activation des lymphocytes et une destruction des macrophages infectés.

1. Quelle voie de l'immunité spécifique est mise en jeu ici ? Justifier par la nature de l'agent pathogène et le mécanisme effecteur observé.
2. Préciser les molécules de restriction (CMH) et les co-récepteurs impliqués dans la reconnaissance.
3. Expliquer pourquoi l'injection de sérum d'un patient guéri ne protégerait pas un sujet naïf contre la tuberculose.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Médiation cellulaire. *M. tuberculosis* est une bactérie intracellulaire (vit dans les macrophages). La destruction observée des macrophages infectés par les lymphocytes du patient est le signe direct de l'action des LT8 cytotoxiques qui tuent la cellule hôte infectée.
2. Reconnaissance : TCR du LT8 + CD8 lie le peptide antigénique (origine bactérienne)

présenté par le CMH de classe I à la surface du macrophage infecté. Le macrophage agit ici comme cellule cible (et comme CPA pour l'activation initiale via CMH II vers LT4).

3. Les anticorps (sérum) agissent dans le milieu extracellulaire. Ils ne peuvent pas pénétrer dans le macrophage pour atteindre la bactérie, ni tuer la cellule infectée. La protection contre les bactéries intracellulaires repose sur l'activation des macrophages (par IFN- γ des LT4 Th1) et la destruction des cellules infectées par les LT8. La sérothérapie est inefficace contre la tuberculose.

5 LA MÉMOIRE IMMUNITAIRE ET LA VACCINATION

Après avoir analysé les mécanismes effecteurs de la réponse immunitaire spécifique — médiation cellulaire par les lymphocytes T cytotoxiques (LTc) et médiation humorale par les anticorps produits par les plasmocytes — nous comprenons comment l'organisme élimine un agent pathogène lors d'une primo-infection. Mais une question fondamentale demeure : pourquoi une seconde rencontre avec le même agent est-elle le plus souvent silencieuse, sans symptômes cliniques ? C'est le mystère de la **mémoire immunitaire**, que la vaccination exploite brillamment pour protéger les populations, y compris au Cameroun où le Programme Élargi de Vaccination (PEV) sauve chaque année des milliers de vies.

5.1 L'observation fondatrice : une protection plus rapide et plus forte

Observation clinique. Un enfant qui a contracté la rougeole guérit généralement et ne développera plus jamais la maladie, même s'il est à nouveau exposé au virus des années plus tard. De même, dans les zones d'endémie palustre du Sud-Cameroun, les adultes présentent une **immunité prémunitieuse** : ils portent des plasmodies (*Plasmodium falciparum*) à bas bruit, sans fièvre ni symptômes graves, alors que l'enfant non immunisé fait un paludisme grave. Cette protection relative, non stérilisante, repose sur une mémoire immunitaire entretenue par des réinfections fréquentes.

EXPÉRIENCE

Mise en évidence de la mémoire immunitaire (expérience classique sur modèle animal)


Matériel : Lapins, antigène (ex. albumine sérique bovine - BSA), adjuvant (alum), seringues, kits dosage anticorps anti-BSA (technique ELISA). Protocole :

1. Primo-injection (J0) : Injection sous-cutanée d'antigène + adjuvant chez un groupe de lapins.
2. Suivi primaire : Prélèvements sanguins réguliers (J7, J14, J21, J30, J60) pour doser les anticorps anti-BSA (IgM puis IgG).
3. Second injection (J60) : Injection de la même dose d'antigène (sans adjuvant néces-

saire) aux mêmes lapins.

4. Suivi secondaire : Prélèvements aux J62, J65, J70, J80, J100.
5. Témoin : Groupe de lapins naïfs recevant une seule injection au J60 (contrôle de la réponse primaire chez un sujet non pré-immunisé).

Observations : La courbe de titration des anticorps (Figure 1) montre deux phases distinctes. Interprétation : La première injection déclenche une **réponse primaire** lente, de faible amplitude, dominée par les IgM puis les IgG de faible affinité. La deuxième injection, plusieurs semaines plus tard, déclenche une **réponse secondaire** (ou réponse d'anamnèse) plus rapide, plus intense (taux d'IgG 10 à 100 fois supérieurs), d'affinité plus élevée et plus durable. L'organisme a « gardé le souvenir » du premier antigène. Conclusion : L'exposition à un antigène induit la formation de cellules à longue durée de vie (lymphocytes mémoires) capables de répondre plus efficacement lors d'une réexposition.



Cinétique de la production d'anticorps lors d'une primo-infection (réponse primaire) et d'une réinfection ou rappel vaccinal (réponse secondaire). La réponse secondaire est plus précoce, plus intense, d'affinité plus forte et plus persistante. UA = Unités Arbitraires.

MÉTHODE**Exploiter une courbe de cinétique des anticorps (classique au Bac)**

Objectif : Comparer la réponse primaire et la réponse secondaire pour caractériser la mémoire immunitaire. Étapes :

1. Identifier les phases : Repérer sur l'axe des abscisses le moment des injections (flèches verticales). Délimiter la réponse primaire (après 1^{re} injection) et la réponse secondaire (après 2^e injection).
2. Mesurer la latence : Temps entre l'injection et le début de la montée significative du taux d'anticorps (seuil de détection).
 - Réponse primaire : latence longue (généralement 7 à 14 jours chez le lapin, 10–14 jours chez l'homme).
 - Réponse secondaire : latence courte (1 à 3 jours).
3. Comparer l'intensité (taux maximal) : Lire l'ordonnée du pic.
 - Réponse primaire : taux maximal faible à modéré (souvent < 100–200 UA/mL ici).
 - Réponse secondaire : taux maximal élevé (souvent 10 à 100 fois supérieur, > 800 UA/mL ici).
4. Comparer la durée / persistance : Observer la pente de la décroissance (phase de catabolisme des anticorps).
 - Réponse primaire : décroissance rapide (demi-vie courte des IgM $\approx$ 5 j, puis IgG sans rappel $\approx$ 21–28 j).
 - Réponse secondaire : décroissance lente, maintien d'un taux protecteur pendant des mois/années (plasmocytes de vie longue en moelle osseuse + réactivation mémoires).
5. Comparer la qualité (isotype/affinité) : La réponse primaire est dominée par les IgM puis IgG de faible affinité ; la réponse secondaire est dominée précocement par des IgG de haute affinité (maturation d'affinité).
6. Conclure : La réponse secondaire est plus précoce, plus intense, plus durable, de meilleure qualité → existence d'une mémoire immunitaire.

Attention : Ne pas confondre « latence » (pas d'anticorps détectables) et « phase de latence clinique » (maladie silencieuse). Préciser l'unité du temps (jours/semaines) et du taux (mg/L, UI/mL, ou UA).

EXERCICE RÉSOLU 5**Analyse d'une courbe de vaccination antitétanique**

Énoncé : Un patient reçoit une primo-vaccination antitétanique (J0) puis un rappel à J30. La figure ci-contre (similaire à la Figure 1) montre l'évolution du taux d'anticorps antitétaniques. On considère qu'un taux $\geq 0,1$ UI/mL est protecteur.

1. Préciser la nature de l'immunité acquise (active/passive, naturelle/artificielle).
2. Déterminer la latence, le pic et la durée de protection pour chaque réponse.
3. Expliquer la différence de cinétique au niveau cellulaire.

Solution détaillée :

1. Immunité active artificielle : Le patient reçoit des antigènes (anatoxine tétanique) qui stimulent ses propres lymphocytes B et T. Ce n'est pas un transfert d'anticorps (sérothérapie = immunité passive).
2. Réponse primaire (J0–J30) : Latence ≈ 10 –14 j. Pic $\approx 0,5$ –1 UI/mL vers J21 (principalement IgM puis IgG). Taux retombe sous le seuil protecteur (0,1 UI/mL) vers J50–J60 sans rappel. Protection temporaire et incomplète.
3. Réponse secondaire (après J30) : Latence ≈ 2 –3 j. Pic ≈ 10 –50 UI/mL vers J37–J40 (IgG haute affinité). Taux reste $> 0,1$ UI/mL pendant plusieurs années (souvent > 10 ans). Protection durable.
4. Explication cellulaire : Lors de la primo-vaccination, les lymphocytes B naïfs spécifiques de l'anatoxine s'activent (avec aide des LTh), prolifèrent (expansion clonale) et se différencient en plasmocytes (usines à anticorps, vie courte pour la majorité, vie longue pour une minorité en moelle osseuse) et en lymphocytes B mémoires (vie longue, ne sécrètent pas d'anticorps au repos, BCR d'affinité mature). Lors du rappel, les lymphocytes B mémoires, plus nombreux, à seuil d'activation plus bas et à affinité mature, se différencient massivement et rapidement en plasmocytes à haute productivité, sans passer par la phase de sélection clonale lente des centres germinatifs.

5.2 Base cellulaire de la mémoire immunitaire : les lymphocytes mémoires

DÉFINITION Mémoire immunitaire

Capacité du système immunitaire adaptatif de conserver, après une primo-rencontre avec un antigène, une **population de lymphocytes mémoires** (B et T) spécifiques de cet antigène, permettant une réponse secondaire plus rapide, plus intense, de meilleure qualité (affinité) et plus durable lors d'une réexposition.

DÉFINITION Lymphocyte mémoire (B ou T)

Lymphocyte issu de la différenciation d'un lymphocyte naïf activé lors de la réponse primaire (dans les centres germinatifs pour les B). Il ne sécrète pas d'effecteurs (anticorps, cytokines cytotoxiques) au repos. Il se caractérise par :


- Une longue durée de vie (années, voire toute la vie pour les B mémoires et plasmocytes moelle osseuse ; décennies pour les T mémoires).
- Un seuil d'activation abaissé : il répond à de plus faibles concentrations d'antigène et nécessite moins de signaux de costimulation (CD28/B7).

- Une réactivité accrue : prolifération et différenciation plus rapides en cellules effectrices (plasmocytes pour B, LTc/LTh pour T).
- Pour les B mémoires : des récepteurs (BCR) d'affinité mature (résultat de l'hypermutation somatique + sélection d'affinité dans les centres germinatifs) et commutation de classe (IgG, IgA, IgE).
- Pour les T mémoires : distinction entre T mémoires centraux (T_{CM}) (homing ganglions, fort potentiel prolifératif) et T mémoires effecteurs (T_{EM}) (homing tissus périphériques, fonction effectrice immédiate).

Mécanisme établi : Lors de la réponse primaire dans les organes lymphoïdes secondaires (ganglions, rate, amygdales, plaques de Peyer), l'activation clonale des lymphocytes B et T naïfs (reconnaissance antigène + costimulation + cytokines) donne deux lignées parallèles :

- **Lignée effectrice de courte durée (majoritaire)** : Plasmocytes (sécrétion massive d'anticorps, meurent par apoptose en quelques jours/semaines, sauf minorité moelle osseuse) et Lymphocytes T effecteurs (cytotoxiques ou auxiliaires, meurent par apoptose après élimination du pathogène = contraction).
- **Lignée mémoire de longue durée (minoritaire mais cruciale)** : Lymphocytes B mémoires (recirculent sang/lymphes, résident en zone marginale rate/ganglion) et Lymphocytes T mémoires (T_{CM} organes lymphoïdes, T_{EM} tissus).

C'est la persistance de cette **deuxième lignée** qui constitue le substrat cellulaire de la mémoire.



5.3 La vaccination : simuler une primo-infection sans risque

DÉFINITION Vaccination

Administration délibérée d'un **vaccin** (préparation antigénique) chez un sujet sain pour induire une **immunité active artificielle** : stimulation d'une réponse primaire (production d'anticorps et génération de lymphocytes mémoires) sans provoquer la maladie, afin de protéger contre une infection future.

Principe : Le vaccin mime l'antigène du pathogène. Il déclenche la réponse primaire (latence, pic modéré, génération mémoires) et laisse en place le pool de lymphocytes mémoires. Lors de l'infection naturelle, la réponse secondaire neutralise l'agent avant qu'il ne cause des dégâts cliniques.

Type de vaccin	Composition / Principe	Exemples (Calendrier Cameroun PEV 2024)	Avantages / Inconvénients
Vaccin vivant atténué	Micro-organisme vivant dont la virulence a été abolie (passages en culture, mutations) mais garde pouvoir réplcatif limité.	BCG (tuberculose - naissance), Rougeole-Rubéole (9 & 15 mois), Fièvre jaune (9 mois), Rotavirus (6 & 10 sem), Polio oral (VPO - campagnes) .	+ Immunité forte (humorale + cellulaire CD8), durable, souvent 1-2 doses. Mimé infection naturelle. - Contre-indiqué immunodéprimés (VIH avancé), grossesse; risque rare de réversion virulente (VPO); chaîne du froid stricte.
Vaccin inactivé (tué)	Micro-organisme entier tué (chaleur, formol, β -propiolactone). Ne se réplique pas.	Polio injectable (VPI) (6, 10, 14 sem), Coqueluche (acellulaire - dans Penta) , Hépatite A , Rage .	+ Sûr (immunodéprimés, grossesse), stable. - Immunité plus faible (surtout humorale Th2, peu CD8), nécessite rappels + adjuvant obligatoire (Alum).
Vaccin sous-unitaire / anatoxine	Fraction purifiée (protéine, polysaccharide) ou toxine inactivée (anatoxine = toxine détoxiquée gardant immunogénicité).	Tétanos (anatoxine), Diphtérie (anatoxine), Hépatite B (protéine S recombinante - levure), HPV (VLP - particules pseudo-virales), Méningocoque (polysaccharide conjugué).	+ Très sûr, pas de composant vivant, production standardisée. - Faiblement immunogène → adjuvant + rappels indispensables. Conjugaison (polysaccharide + protéine porteuse tétanique/diphtérique) essentielle pour réponse T-dépendante, commutation de classe et mémoire chez nourrisson (45 / 116 ans).
Vaccin à ARNm / vecteur viral	Acide nucléique codant l'anti-	COVID-19 (Pfizer/BioNTech.	+ Développement rapide.


Le calendrier vaccinal au Cameroun (PEV 2024) : Il protège contre 12 maladies cibles : Tuberculose (BCG à la naissance), Polio (VPI aux 6, 10, 14 sem + VPO campagnes), Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Hépatite B-Hib (Pentavalent aux 6, 10, 14 sem), Pneumocoque (PCV13 même calendrier), Rotavirus (2 doses 6 & 10 sem), Rougeole-Rubéole (9 et 15 mois), Fièvre jaune (9 mois), HPV (filles 9-14 ans, 2 doses à 6 mois d'intervalle), COVID-19 (adultes). **Les rappels (DTCoq à 18 mois, 6 ans, 12 ans, puis tous les 10-20 ans ; Fièvre jaune tous les 10 ans ; Tétanos femmes enceintes VAT 1 à 5) sont cruciaux** pour réactiver la mémoire, maintenir le taux d'anticorps protecteur et élargir le répertoire clonale.

ATTENTION Pièges fréquents sur la vaccination (Bac)

- Confondre vaccination et sérothérapie : La vaccination induit une immunité active (le sujet produit ses anticorps + mémoire). La sérothérapie apporte une immunité passive (anticorps tout faits, pas de mémoire). Voir section suivante.
- Oublier l'adjuvant : Pour les vaccins inactivés/sous-unitaires/anatoxines, l'adjuvant (sels d'aluminium, émulsions MF59, AS01) est indispensable pour activer l'immunité innée (recrutement/activation cellules dendritiques → costimulation CD80/86, cytokines IL-12) et permettre la réponse adaptative T-dépendante. Sans adjuvant → tolérance ou réponse nulle/faible.
- Croire qu'un vaccin vivant atténué « donne la maladie » : Il peut donner une forme atténuée, asymptomatique ou pauci-symptomatique (ex. fièvre modérée post-Rougeole/BCG, adénopathie BCGite), mais pas la maladie grave sauvage. Contre-indiqué chez l'immunodéprimé sévère (risque de dissémination vaccinale).
- Négliger les rappels : La mémoire immunitaire n'est pas éternelle sans stimulation antigénique (naturelle ou vaccinale). Le taux d'anticorps chute (catabolisme). Le rappel (boost) réactive les mémoires → nouveau pic + expansion du pool mémoires + maturation d'affinité supplémentaire. Exemple : L'immunité anti-tétanique chute sous seuil protecteur (0,1 UI/mL) ≈ 10 ans sans rappel.
- Confondre « efficacité vaccinale » (infection) et « efficacité clinique » (maladie grave) : Un vaccin peut ne pas empêcher l'infection/portage (ex. COVID-19 variant Omicron, Coqueluche acellulaire) mais empêcher la maladie grave/hospitalisation. La protection stérilisante (empêche toute infection) est rare (ex. vaccin rougeole, VPI).

5.4 Vaccination et sérothérapie : deux stratégies, deux natures d'immunité

Il est capital de distinguer ces deux approches thérapeutiques/prophylactiques, souvent confondues par les élèves.



Comparatif schématique : Vaccination (immunité active, mémoire, délai, durée) vs Sérothérapie (immunité passive, pas de mémoire, immédiat, bref).

DÉFINITION Sérothérapie (Immunothérapie passive)

Administration d'immunoglobulines (anticorps) purifiées, issues du sang de donneurs immunisés (sérum hyperimmune) ou produites par génie génétique (anticorps monoclonaux), pour conférer une **protection immédiate mais temporaire** (immunité passive artificielle). Aucune mémoire immunitaire n'est induite chez le receveur.

EXEMPLE Indications cliniques au Cameroun

- Vaccination (Prophylaxie préventive) : PEV nourrissons (BCG, Penta, Pneumo, Rota, VPI, RR, FJ), HPV adolescentes (9–14 ans), Fièvre jaune (voyageurs/endémie, 1 dose vie entière), COVID-19 (groupes cibles), Tétanos (femmes enceintes : protocole VAT1, 2, 3, 4, 5 pour protéger la mère et le nouveau-né via transfert transplacentaire d'IgG).
- Sérothérapie (Urgence curative / Prophylaxie post-exposition immédiate) :
 - Envenimation serpent (vipère, cobra, mamba – Grand Nord, Est, Adamaoua) : Antivenin polyvalent africain (ex. SAV-Aventis/Inosan, FAV-Afrique) → injection IV urgente d'anticorps F(ab')₂ anti-venin. Sauve des vies, prévient nécrose/coagulopathie.
 - Exposition au virus de la rage (morsure/griffure animal suspect) : Immunoglobulines anti-rabiques humaines (RIG) ou équine (ERIG) infiltrées autour de la plaie (dose restante IM) + Vaccin antirabique (protocole Zagreb 2-1-1 ou Essen 4-5 doses). Le sérum comble le délai de 7–14 j de la vaccination active.
 - Tétanos maternel/néonatal (accouchement insalubre, mère non vaccinée) : Immunoglobulines anti-tétaniques humaines (TIG) IM à la mère et/ou au nouveau-né + Vaccin anatoxine tétanique (site distinct).
 - Diphtérie (cas confirmés/contacts) : Antitoxine diphtérique (SAD) IV/IM en urgence (neutralise toxine libre) + antibiotiques (érythromycine/azithromycine) + vaccination (rappel DTC).

ATTENTION La sérothérapie ne confère AUCUNE mémoire – Point clé Bac

C'est le point le plus sanctionné. Les anticorps injectés (IgG majoritairement) sont catabolisés avec une demi-vie d'environ 21 à 28 jours. Au bout de 3 à 4 mois, ils ont disparu. Le receveur n'a pas produit de lymphocytes mémoires car il n'a pas reçu d'antigène (ou quantité négligeable dans le sérum). Si on veut une protection durable après une sérothérapie (ex. post-morsure rage, tétanos), il faut **OBLIGATOIREMENT** associer une vaccination (immunité active) qui prendra le relais quand les anticorps passifs auront disparu. Ne jamais écrire : « La sérothérapie permet de se souvenir de l'antigène » ou « La sérothéra-

pie induit une mémoire immunitaire. » → Faux.

LES AVAIS-TU ? Edward Jenner (1796) : la naissance de la vaccinologie

En 1796, le médecin anglais Edward Jenner observe que les laitières contaminées par la vaccine (variole de la vache, cowpox), maladie bénigne des bovins transmissible à l'homme (pustules sur les mains), ne contractent pas la variole humaine (mortelle à 30%, défigurante). Il inocule du pus de vaccine au jeune James Phipps (8 ans) : celui-ci développe une pustule locale, guérit. Six semaines plus tard, Jenner l'inocule avec du pus de variole humaine (variolisation, pratique risquée) : l'enfant ne tombe pas malade. Preuve de concept : Un agent apparenté, non pathogène pour l'homme, protège contre le pathogène meurtrier. Le terme « vaccination » vient de vacca (vache en latin). La variole est la seule maladie humaine éradiquée (OMS, 1980) grâce à la vaccination mondiale (dernier cas naturel 1977, Somalie).

À RETENIR Synthèse : Mémoire et Vaccination

- La réponse primaire (primo-infection/vaccination) est lente (latence 1-2 sem), de faible amplitude, dominée par IgM puis IgG faible affinité, et génère des lymphocytes B et T mémoires à longue durée de vie + plasmocytes moelle osseuse.
- La réponse secondaire (réinfection/rappel) est rapide (latence 1-3 j), intense (taux d'anticorps $\times 10-100$), durable, dominée par IgG haute affinité, grâce à la réactivation des lymphocytes mémoires (seuil bas, nombre élevé, affinité mature).
- La vaccination utilise des antigènes (atténués, inactivés, sous-unitaires, ARNm) pour provoquer une réponse primaire sans maladie et installer la mémoire. Les rappels entretiennent le taux d'anticorps protecteur, élargissent le pool mémoires et améliorent l'affinité.
- La sérothérapie apporte des anticorps tout faits (immunité passive) : protection immédiate mais brève (semaines, demi-vie IgG $\approx 21-28$ j), sans mémoire. Indiquée en urgence vitale (rage, tétanos, envenimation, diphtérie) toujours associée à la vaccination pour la protection durable.
- Au Cameroun, le PEV, la riposte aux épidémies (choléra, méningite, COVID, fièvre jaune, polio) et la prise en charge des urgences toxiques/infectieuses reposent sur cette compréhension rigoureuse de la mémoire immunitaire.

6 LES DYSFONCTIONNEMENTS : MALADIES AUTO-IMMUNES

Après avoir étudié comment le système immunitaire construit une mémoire protectrice grâce à la vaccination, nous devons aborder une situation paradoxale : que se passe-t-il lorsque ce même système, au lieu de défendre l'organisme, se retourne contre lui ? C'est l'objet des **maladies auto-immunes**, une rupture de la tolérance immunologique qui touche environ 5 à 8 % de la population mondiale, avec une prévalence croissante, y compris au Cameroun où les services d'endocrinologie et de neurologie des hôpitaux centraux (Yaoundé, Douala) en suivent de nombreux cas.

6.1 Définition et mécanisme général : la rupture de la tolérance au soi

DÉFINITION Maladie auto-immune, auto-anticorps, rupture de tolérance

Une **maladie auto-immune** est une pathologie résultant d'une rupture de la tolérance immunologique au soi : le système immunitaire reconnaît anormalement certains constituants de l'organisme (protéines, récepteurs, ADN, etc.) comme du non-soi et déclenche une réponse immune (production d'**auto-anticorps** et/ou activation de **lymphocytes T auto-réactifs**) dirigée contre ses propres tissus, entraînant des lésions inflammatoires et une dysfonction d'organe.

Normalement, lors de la maturation dans le thymus (pour les LT) et la moelle osseuse (pour les LB), les lymphocytes dont les récepteurs reconnaissent fortement les antigènes propres (self) sont éliminés par **sélection négative** (apoptose) ou rendus anergiques (inactifs). C'est la **tolérance centrale**. Une **tolérance périphérique** (régulation par les LT régulateurs T_{reg} , ignorance antigénique) prend le relais pour les clones échappés.

PROPRIÉTÉ Mécanismes de la rupture de tolérance

La survenue d'une maladie auto-immune résulte de la conjonction de trois facteurs (triade étiologique) :

1. Facteurs génétiques : Polymorphismes du **CMHC** (HLA chez l'homme) prédisposant à présenter certains auto-antigènes (ex : HLA-DR3/DR4 pour le diabète type 1, HLA-B27 pour la spondylarthrite ankylosante).
2. Facteurs environnementaux déclenchants : Infections virales/bactériennes (mimétisme moléculaire : épitopes pathogènes ressemblant à des épitopes propres), expositions chimiques, stress, modifications du microbiote.
3. Défaillance des mécanismes de régulation : Déficit en T_{reg} (FoxP3+), défaut d'apoptose des lymphocytes activés (Fas/FasL), inflammation chronique maintenant l'activation.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du mimétisme moléculaire (modèle expérimental)

Observation : Après une infection à *Streptococcus pyogenes* (angine), certains patients développent un rhumatisme articulaire aigu (maladie auto-immune touchant cœur, articulations, peau). Hypothèse : Des antigènes bactériens partagent des épitopes avec des protéines humaines (myosine cardiaque, protéines articulaires). Expérience : On immunise des souris avec une protéine M de *S. pyogenes*. On isole leurs anticorps et on teste leur réactivité sur des coupes de cœur de souris. Résultat : Les anticorps anti-protéine M se fixent sur la myosine cardiaque des souris (immunofluorescence positive). Interprétation : La réponse immune anti-bactérienne cible par mimétisme un antigène propre. Les lymphocytes B/T activés contre la bactérie cross-réagissent avec le soi. Conclusion : Le mimétisme moléculaire est un mécanisme majeur de rupture de tolérance périphérique.

ATTENTION Piège fréquent : Auto-immunité vs Immunodéficiência

Ne confondez jamais :

- Maladie auto-immune : Immunité excessive et mal dirigée contre le soi (ex : diabète type 1, polyarthrite rhumatoïde). Le système immunitaire est hyperactif mais mal éduqué.
- Immunodéficiência (ex : Sida) : Immunité insuffisante (déficit en LT4, défaut de réponse). Le système immunitaire est affaibli ou absent.

Au Bac, si on vous demande « Comment le VIH cause-t-il le Sida ? », ne répondez pas « C'est une maladie auto-immune ». Le VIH détruit les LT4 ; il ne déclenche pas d'auto-anticorps pathogènes directs (même s'il y a une activation immune chronique).

6.2 Exemples types au programme : mécanismes, signes et traitements

Nous étudierons trois exemples emblématiques illustrant les deux grandes cibles de l'auto-immunité : les **cellules** (diabète type 1, vitiligo) et les **récepteurs membranaires** (myasthénie).

1. Le diabète sucré de type 1 (diabète juvénile) : destruction des cellules β pancréatiques.

EXPÉRIENCE Démonstration de l'origine auto-immune du diabète type 1 (modèle NOD – Non Obese Diabetic mouse)


Observation : La souche de souris NOD développe spontanément un diabète type 1 vers 12–20 semaines. L'infiltrat pancréatique (insulite) est riche en LT4 et LT8. Expérience de transfert adoptif : On prélève des lymphocytes de rate de souris NOD diabétiques et on les injecte à des souris NOD jeunes (prédiabétiques) ou à des souris immunodéficientes (nu/nu). Résultat : Les souris receveuses développent rapidement le diabète et une insulite. Le transfert de sérum seul (anticorps) ne transfère pas la maladie efficacement.

Interprétation : La maladie est transférable par des cellules lymphoïdes (LT), prouvant le rôle central des lymphocytes T auto-réactifs (CD8+ cytotoxiques et CD4+ Th1) dans la destruction des cellules β . Les auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline, anti-ZnT8) sont des marqueurs diagnostiques précoces mais pas les effecteurs principaux de la destruction.


PROPRIÉTÉ Physiopathologie du diabète type 1

- Cible : Cellules β des îlots de Langerhans (productrices d'insuline).
- Mécanisme : Infiltration par des LT8+ cytotoxiques (reconnaissance peptide-HLA I) et LT4+ Th1 (secrétion d'IFN- γ , TNF- α , IL-2) $\rightarrow$ apoptose des cellules β (perforine/granzyme, Fas/FasL, cytokines pro-inflammatoires).
- Seuil clinique : La destruction est souvent supérieure à 80–90 % au moment de l'hyperglycémie symptomatique (polydipsie, polyurie, amaigrissement, cétoacidose).
- Marqueurs biologiques : Auto-anticorps anti-GAD65 (glutamate décarboxylase), anti-IA2, anti-insuline (IAA), anti-ZnT8. Présents des mois/années avant le diagnostic.

Pancréas SAIN



Pancréas DIABÉTIQUE TYPE 1



Comparaison histologique schématique d'un îlot de Langerhans sain (gauche) et détruit par l'insulite auto-immune (droite) dans le diabète de type 1. À gauche : cellules β riches en granules d'insuline (bleu), cellules α périphériques (or). À droite : infiltration massive par des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques (violet), fibrose, rares cellules β résiduelles en apoptose (pointillés). L'absence d'insuline entraîne l'hyperglycémie.

EXEMPLE Prise en charge au Cameroun

Au Cameroun, le diagnostic repose sur l'hyperglycémie à jeun $\geq 1,26$ g/L (ou 7,0 mmol/L) ou $> 2,00$ g/L à toute heure + signes cliniques, confirmée par la présence d'auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2) si disponible (labos de référence : Centre Pasteur, Hôpitaux Centraux/Universitaires). Le traitement est vital et à vie : injections d'insuline (souvent schémas basal-bolus : insuline lente + rapide aux repas). L'éducation thérapeutique (autosurveillance glycémique, alimentation, reconnaissance de l'hypoglycémie) est cruciale. L'accès aux bandelettes et à l'insuline (chaîne du froid) reste un défi de santé publique dans les zones rurales.


2. Le vitiligo : destruction des mélanocytes.

PROPRIÉTÉ Vitiligo


- Cible : Mélanocytes (cellules productrices de mélanine) de l'épiderme basal et des follicules pileux.
- Mécanisme : Auto-immunité humorale (auto-anticorps anti-mélanocytes : anti-tyrosinase, anti-gp100, anti-MART-1) ET cellulaire (LT8+ cytotoxiques spécifiques d'antigènes mélanocytaires, infiltration lymphocytaire au bord des plaques). Stress oxydatif intrinsèque des mélanocytes favorisant l'exposition d'antigènes cachés.
- Signe clinique : Dépigmentation par plaques achromiques (blanc laiteux), symétriques souvent, zones de frottement, visage, mains, orifices. Leukotrichie (poils blancs) possible.
- Évolution : Imprévisible, poussées et rémissions. Impact psychologique majeur (stigmatisation).
- Traitement : Corticoïdes topiques, inhibiteurs de calcineurine topiques (tacrolimus), photothérapie UVB à bande étroite (311 nm), greffe de mélanocytes (stade stable). Pas de traitement systémique curatif standard.

3. La myasthénie auto-immune (myasthénie grave) : blocage des récepteurs à l'acétylcholine.

C'est l'exemple type de la **maladie auto-immune à anticorps anti-récepteur** (type II de Gell et Coombs).



Jonction neuromusculaire MYASTHÉNIQUE



Mécanisme de la myasthénie auto-immune. Haut : Jonction normale. L'acétylcholine (ACh, vert) libérée se fixe sur ses récepteurs (AChR, violet) → ouverture canaux Na^+ → contraction. Bas : Jonction myasthénique. Des auto-anticorps IgG (orange) se fixent sur les AChR. Conséquences : 1) Blocage compétitif de la fixation de l'ACh. 2) Modulation antigénique : internalisation et dégradation accélérée des AChR. 3) Activation du complément (C3b, C5b-9) → destruction de la membrane post-synaptique (plis disparus). Résultat : amplitude de la potentielle de plaque (PPP) réduite, souvent sous le seuil de déclenchement du potentiel d'action musculaire → faiblesse fatigable.

PROPRIÉTÉ Myasthénie auto-immune (Myasthénie grave)

- Cible : Récepteur nicotinique à l'acétylcholine (AChR) de la plaque motrice (jonction neuromusculaire). Parfois anti-MuSK (Muscle-specific Kinase) ou anti-LRP4.
- Mécanisme (3 effets synergiques des auto-Ac IgG1/IgG3) :
 1. Blocage compétitif : L'auto-Ac empêche la fixation de l'ACh sur son site de liaison.
 2. Modulation antigénique (cross-linking) : L'auto-Ac lie 2 AChR → internalisation par endocytose → dégradation lysosomale → diminution de la densité des AChR (de $\sim 10^4/\mu\text{m}^2$ à $< 10^3/\mu\text{m}^2$).
 3. Activation du complément (voie classique) : Fixation de C1q sur la portion Fc des IgG → formation du Complexe d'Attaque Membranaire (MAC, C5b-9) → lyse de la membrane post-synaptique → simplification des plis (perte de surface).

- Physiopathologie : La Potentielle de Plaque Post-synaptique (PPP) a une amplitude réduite. Normalement $\gg$ seuil. En crise myasthénique, PPP $<$ seuil $\rightarrow$ pas de potentiel d'action musculaire $\rightarrow$ pas de contraction.
- Signe majeur : Fatigabilité musculaire (aggravation à l'effort, amélioration au repos). Atteinte fréquente : oculomoteurs (ptôsis, diplopie), bulaires (dysphagie, dysphonie), respiratoire (crise myasthénique = urgence vitale).
- Diagnostic : Test à la néostigmine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase $\rightarrow$ augmentation [ACh] fente $\rightarrow$ amélioration transitoire), dosage auto-Ac anti-AChR (sensibilité 85–90 %), électromyogramme (réponse décrémente à la stimulation répétitive bas fréquence 3 Hz).
- Traitement : Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (pyridostigmine), immunosuppresseurs (corticoïdes, azathioprine, mycophénolate), immunoglobulines IV / plasmaphérèse (crises), thymectomie (si thymome ou hyperplasie thymique, fréquente chez les jeunes).

6.3 Interprétation de documents cliniques et biologiques

MÉTHODE Face à un cas clinique suspect d'auto-immunité : identifier la cible

1. Analyser les symptômes : Quel organe/fonction est touché ? (Glycémie $\rightarrow$ pancréas endocrine ; Peau blanche $\rightarrow$ mélanocytes ; Fatigabilité musculaire $\rightarrow$ jonction neuromusculaire).
2. Identifier le marqueur biologique spécifique : Quel auto-anticorps ou quelle population lymphocytaire est dosée/observée ? (Anti-GAD/IA2, Anti-AChR, Anti-mélanocytes, Infiltrat LT8+).
3. Relier cible $\rightarrow$ mécanisme $\rightarrow$ symptôme :
 - Cible = Cellule sécrétrice (cellule β) $\rightarrow$ Destruction cellulaire (LT8+) $\rightarrow$ Déficit de sécrétion (insuline) $\rightarrow$ Trouble métabolique (hyperglycémie).
 - Cible = Récepteur membranaire (AChR) $\rightarrow$ Blocage/Destruction récepteur (Auto-Ac + Complément) $\rightarrow$ Déficit de transduction signal (dépolarisation) $\rightarrow$ Trouble fonctionnel (faiblesse).
 - Cible = Cellule pigmentaire (mélanocyte) $\rightarrow$ Destruction (Auto-Ac + LT8+) $\rightarrow$ Perte fonction (mélanogénèse) $\rightarrow$ Signe visible (dépigmentation).
4. Proposer le traitement logique : Substitution (insuline), Symptomatique + Immunosuppression (myasthénie), Immunosuppression locale/systémique + Photothérapie (vitiligo).

EXERCICE RÉSOLU 6 Interprétation d'un dossier myasthénie

Énoncé : Une patiente de 32 ans consulte pour une ptôsis bilatérale s'aggravant en fin de journée et une diplopie. L'examen neurologique montre une fatigabilité des muscles oculomoteurs et des membres supérieurs à la répétition. Le test à la néostigmine (1 mg IV) est positif (amélioration nette à 3 min). Le dosage des auto-anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine (anti-AChR) revient à 12 nmol/L (valeurs de référence < 0,5 nmol/L). L'EMG de stimulation répétitive (3 Hz) du nerf cubital montre une décrémentation de 18 % de l'amplitude de la 5ème réponse par rapport à la 1ère. Un scanner thoracique révèle une hyperplasie thymique.

Solution détaillée :

1. Diagnostic : Myasthénie auto-immune généralisée (forme oculobulaire + membres) avec hyperplasie thymique associée. Arguments : tableau clinique typique (fatigabilité), test pharmacologique positif, auto-anticorps anti-AChR fortement positifs (spécificité > 95%), signe électrophysiologique caractéristique (décrémentation > 10%).
2. Mécanisme lésionnel : Les auto-Ac anti-AChR (IgG1/3) fixés sur les AChR de la plaque motrice entraînent : (1) blocage compétitif de la fixation de l'ACh; (2) cross-linking → internalisation/dégradation des AChR (modulation antigénique); (3) activation du complément → destruction des plis post-synaptiques. → Baisse de la densité des AChR → Amplitude de la PPP réduite → Échec de la transmission neuromusculaire à l'effort (fatigabilité).
3. Rôle du thymus : Le thymus est le site d'initiation/entretien de la réponse auto-immune (présence de myoïdes exprimant l'AChR, défaut de sélection négative, hyperplasie germinative). La thymectomie est indiquée ici (patient jeune, hyperplasie, anticorps positifs) pour améliorer la rémission.
4. Traitement proposé : Pyridostigmine (inhibiteur AChE) en 1ère intention symptomatique. Corticothérapie (prednisone) + immunosuppresseur d'épargne (azathioprine/mycophénolate) pour induire une rémission. Thymectomie programmée. Éducation : signes de crise myasthénique (dyspnée, dysphagie sévère) = urgence réanimation (plasmaphérèse/IgIV).

6.4 Traitements : principes, limites et effets secondaires**PROPRIÉTÉ** Stratégies thérapeutiques dans les maladies auto-immunes

ATTENTION Surveillance au long cours : l'exemple du diabète type 1 au Cameroun

Un jeune diabétique type 1 suivi à l'Hôpital Général de Douala ou au Centre des Maladies Métaboliques de Yaoundé doit bénéficier d'une surveillance trimestrielle : HbA1c (cible < 7,5% chez l'adolescent/adulte jeune), fonction rénale (microalbuminurie, créatininémie), fond d'œil (rétinopathie), pieds (neuropathie/artériopathie), profil lipidique. L'éducation thérapeutique (comptage glucides, ajustement doses insuline, gestion hypoglycémie/hyperglycémie/cétoacidose) est le seul levier pour prévenir les complications chroniques invalidantes. L'accès aux capteurs glucose en continu (FreeStyle Libre, Dexcom) reste limité mais change la donne là où il est disponible.

LESAVAIS-TU ? Le thymus, organe central de l'auto-immunité ?

Dans la myasthénie, 65 à 85 % des patients ont une hyperplasie thymique (follicules germinatifs actifs) et 10–15 % un thymome (tumeur thymique). Le thymus exprime l'AChR sur des cellules myoïdes. C'est un site de sélection négative défailante et/ou d'activation aberrante de LT auto-réactifs. La thymectomie (chirurgie vidéo-assistée ou sternotomie) induit une rémission complète ou une amélioration significative chez ~ 30 – 40% des patients anticorps+ sans thymome, et améliore la réponse aux immunosuppresseurs. C'est l'une des rares maladies auto-immunes où l'ablation d'un organe lymphoïde primaire est thérapeutique.

EXERCICE 4 Cas clinique : Diabète type 1 révélé par une cétoacidose

Un adolescent de 14 ans, originaire de Bafoussam, est admis en urgence pour coma. L'interrogatoire rétrospectif retrouve : polyuro-polydipsie depuis 3 semaines, amaigrissement de 5 kg, fatigue. À l'admission : conscience altérée, déshydratation cutanée majeure, tachycardie 110/min, TA 90/60 mmHg, respiration de Kussmaul (ample, rapide). Glycémie capillaire : 4,80 g/L (26,6 mmol/L). Gaz du sang artériel : pH 7,18 ; $p\text{CO}_2$ 25 mmHg ; HCO_3^- 10 mmol/L ; Lactates 3 mmol/L. Urines : glycosurie +++, cétonurie +++. Le dosage des auto-anticorps anti-GAD65 revient positif à 120 UI/mL (< 5 UI/mL). Le peptide C (C-peptide) basal est à 0,15 nmol/L (valeurs de référence jeun : 0,3 – 0,9 nmol/L). Questions :

1. Qualifier le trouble de la conscience et expliquer son mécanisme physiopathologique (lien glycémie/pH/osmolarité).
2. Interpréter les résultats biologiques (glycémie, gaz du sang, C-peptide, auto-Ac) pour confirmer le diagnostic étiologique.
3. Expliquer pourquoi le dosage du C-peptide est plus pertinent que celui de l'insuline chez ce patient non encore traité.

4. Proposer la prise en charge initiale d'urgence (premières 6–12h) et le traitement de fond.

CORRIGÉ Exercice n

1. Coma cétoacidotique diabétique. Mécanisme : Hyperglycémie sévère → hyperosmolarité plasmatique → déshydratation intracellulaire (neurons) + acidose métabolique (accumulation corps cétoniques β -hydroxybutyrate, acétoacétate) → dépression du SNC (coma). Respiration de Kussmaul = compensation respiratoire (hyperventilation → baisse $p\text{CO}_2$) pour tamponner l'acidose.
2. Diagnostic : Diabète sucré de type 1 révélé par une cétoacidose.
 - Glycémie 4,80 g/L $\gg$ 1,26 g/L : diabète avéré.
 - pH 7,18 + HCO_3^- 10 mmol/L + cétonurie +++ + glycémie élevée : Cétoacidose diabétique (CAD) modérée–sévère (pH < 7,3, HCO_3^- < 15).
 - Auto-Ac anti-GAD65 ++ : Étiologie auto-immune confirmée.
 - C-peptide très bas (0,15 nmol/L) : Réserve sécrétoire insulinaire quasi nulle (destruction > 90% cellules β).
3. C-peptide vs Insuline : L'insuline exogène (traitement) n'a pas encore été administrée, mais l'insuline endogène a une demi-vie très courte (~ 5 – 6 min) et est extraite hépatiquement (50 %). Le C-peptide (peptide de liaison de la proinsuline) est sécrété en quantité équimolaire à l'insuline, n'est pas extrait par le foie, a une demi-vie plus longue (~ 20 – 30 min) et n'est pas présent dans les préparations d'insuline thérapeutique. Son dosage reflète fidèlement la sécrétion endocytaire résiduelle, indispensable pour distinguer type 1 (C-peptide bas) de type 2 (C-peptide normal/élevé) ou diabète secondaire.
4. Prise en charge urgence (premières 6–12h) :
 - (a) Réhydratation IV : Serum salé isotonique (NaCl 0,9%) 10–20 mL/kg/h (1er litre), puis adapter selon hémodynamique/hémoglobine/hématocrite. But : restaurer volémie, clairance rénale glucose/cétones.
 - (b) Insulinothérapie IV : Insuline rapide (Actrapid® ou équivalent) en pompe électrique : bolus 0,1 UI/kg puis 0,1 UI/kg/h continu. Adapter pour faire baisser glycémie de ~ 0,5–1,0 g/L/h (éviter chute brutale → œdème cérébral). Arrêter perfusion insuline IV quand pH > 7,3 et cétonémie normalisée → relais SC (basal-bolus).
 - (c) Correction potassique : CAD = déplétion potassique totale (pertes urinaires + sortie cellulaire par acidose). L'insuline + correction acidose → rentrée K^+ intracellulaire → hypokaliémie sévère risquée (arythmies). Surveiller kaliémie H1–H2. Supplémenter KCl dès que diurèse reprise et kaliémie < 5,0 mmol/L (ex : 20–40 mmol/L dans perfusions).

(d) Surveillance continue : Glycémie H1, Ionogramme/Gaz du sang H2–H4, Neurologie (risque œdème cérébral : céphalées, agitation, troubles pupillaires).

Traitement de fond : Éducation thérapeutique (patient + famille), Schéma basal–bolus (insuline basale 1–2/j + rapide 3–4/j aux repas), Autosurveillance glycémique (4–6/j), Objectif HbA1c < 7,5%, Suivi complications (néphro/rétrino/neuropathie) annuel, Vaccination grippe/pneumocoque/COVID à jour. Soutien psychologique (acceptation maladie chronique).

À RETENIR

Synthèse : Les maladies auto-immunes

- Définition : Atteinte de tissus propres par auto-anticorps et/ou lymphocytes T auto-réactifs → rupture de la tolérance au soi.
- Triade étiologique : Génétique (HLA) + Environnement (mimétisme, infections) + Défaillance régulation (T_{reg}).
- 3 modèles types au programme :
 - Diabète type 1 : Cible = Cellule β pancréatique. Effecteur = LT8+ cytotoxiques. Conséquence = Déficit insuline absolu. Traitement = Substitution insuline (vitale).
 - Vitiligo : Cible = Mélanocyte. Effecteur = Auto-Ac + LT8+. Conséquence = Dépigmentation. Traitement = Immunosuppression locale + UVB.
 - Myasthénie : Cible = Récepteur AChR (jonction neuromusculaire). Effecteur = Auto-Ac IgG (blocage, modulation, complément). Conséquence = Fatigabilité musculaire. Traitement = Anti-AChE + Immunosuppresseurs $\pm$ Thymectomie.
- Diagnostic : Association Clinique + Auto-anticorps spécifiques + Histologie (infiltrat) + Tests fonctionnels (EMG, test pharmacologique).
- Traitements : Substitution (si déficit), Immunosuppression (corticoïdes, conventionnels, biothérapies), Épurations (plasmaphérèse, IgIV). Surveillance infectieuse et métabolique indispensable.

7 LE VIH/SIDA : MÉCANISMES, PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ

Après avoir étudié les dysfonctionnements où le système immunitaire s'attaque à lui-même (maladies auto-immunes), nous abordons maintenant une situation où un agent pathogène extérieur, le **VIH** (Virus de l'Immunodéficience Humaine), détruit spécifiquement le chef d'orchestre de la réponse immunitaire spécifique : le lymphocyte T4 (LT4). Cette destruction progressive conduit, en l'absence de traitement, au stade **Sida** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise),

ouvrant la porte aux infections opportunistes. Comprendre les mécanismes moléculaires de ce virus, interpréter l'évolution biologique de l'infection et maîtriser les moyens de prévention sont des compétences essentielles, tant sur le plan scientifique que citoyen, notamment dans notre contexte camerounais où la riposte au VIH/Sida reste une priorité de santé publique.

7.1 Le VIH : un rétrovirus ciblant le lymphocyte T4

DÉFINITION VIH et Rétrovirus

Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) est un **rétrovirus** à enveloppe, dont le matériel génétique est constitué de deux brins d'ARN simple brin (+). Sa particularité majeure est de posséder une enzyme spécifique, la **transcriptase inverse**, qui permet de synthétiser de l'ADN à partir de son ARN génomique, inversant ainsi le flux classique de l'information génétique (ADN → ARN → Protéine). Deux types existent : VIH-1 (le plus répandu mondialement et au Cameroun) et VIH-2 (plus fréquent en Afrique de l'Ouest, moins pathogène).


La cible privilégiée du VIH est le lymphocyte T4 (ou lymphocyte T helper CD4+), reconnaissable à la présence à sa surface du récepteur **CD4**. Ce récepteur sert de « porte d'entrée » principale au virus. La glycoprotéine virale gp120, portée par l'enveloppe, se lie avec une forte affinité au récepteur CD4, puis à un co-récepteur (généralement CCR5 ou CXCR4), déclenchant la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire.

EXPÉRIENCE Mise en évidence du tropisme du VIH pour les cellules CD4+

Observation : En culture cellulaire, le VIH infecte efficacement les lignées de lymphocytes T exprimant le CD4 (ex : lignée SupT1, cellules PBMC activées), mais n'infecte pas les lignées dépourvues de CD4 (ex : lignées de lymphocytes B, cellules épithéliales HeLa), sauf si on les transfecte artificiellement pour exprimer le CD4. Interprétation : Le récepteur CD4 est nécessaire et suffisant (avec un co-récepteur) pour l'entrée du virus. Cela explique la sélectivité de la destruction des LT4 in vivo. Conclusion : La déplétion des LT4 est une conséquence directe du cycle de réplication viral dans ces cellules.

7.2 Le cycle de multiplication du VIH dans le lymphocyte T4

Le cycle de réplication suit les étapes classiques des rétrovirus, avec des cibles thérapeutiques majeures pour les antirétroviraux (ARV).



Cycle de multiplication du VIH dans un lymphocyte T4. Le virus fixe le récepteur CD4 et un co-récepteur, fusionne, libère son ARN et sa transcriptase inverse. L'ADN viral (pro-virus) s'intègre au génome hôte. La machinerie cellulaire produit les composants viraux qui s'assemblent et bourgeonnent. La maturation par la protéase virale rend les nouveaux virions infectieux. Les classes d'antirétroviraux (ARV) bloquent chacune une étape clé.

À RETENIR

Étapes clés et cibles thérapeutiques

1. Fixation / Entrée : gp120 ↔ CD4 + Co-récepteur (CCR5/CXCR4) → Fusion. Cible : Inhibiteurs d'entrée.
2. Transcription inverse : ARN viral $\xrightarrow{\text{Transcriptase inverse}}$ ADN double brin. Cible : INRTI (Ténofovir, Lamivudine) et INNRTI (Éfavirenz, Névirapine).
3. Intégration : ADN viral $\xrightarrow{\text{Intégrase}}$ ADN hôte (Provirus). Cible : Inhibiteurs d'intégrase (Dolutégravir – recommandé en 1ère ligne au Cameroun).
4. Expression / Assemblage / Maturation : Transcription → Traduction → Assemblage $\xrightarrow{\text{Protéase}}$ Virions matures. Cible : Inhibiteurs de protéase (Lopinavir/r, Darunavir/r).


7.3 Conséquences immunologiques : de l'infection au Sida

Le rôle central des LT4 (activation des LT8 cytotoxiques, aide aux LB pour la réponse humorale, activation des macrophages via IFN- γ , régulation via cytokines) explique pourquoi leur destruction entraîne un effondrement global de l'immunité spécifique.

PROPRIÉTÉ Évolution de l'infection VIH non traitée en trois phases

L'infection par le VIH évolue classiquement en trois phases cliniques et biologiques distinctes, caractérisées par l'évolution opposée du taux de LT4 (cellules/ μ L) et de la **charge virale** (copies ARN/mL) :

1. Primo-infection (semaines 1–12) : Réplication virale explosive (charge virale $> 10^6$ copies/mL), chute brutale et transitoire des LT4 ($< 500/\mu$ L), syndrome pseudo-grippal ou mononucléosique (fièvre, adénopathies, éruption cutanée). Séroconversion (apparition anticorps anti-VIH) vers 3–6 semaines.
2. Latence clinique (années 1–10+) : Équilibre précaire. Charge virale stabilisée à un « point de consigne » (ex : 10^4 – 10^5 copies/mL). Déclin lent et continu des LT4 (≈ 50 – 80 cellules/ μ L/an). Patient asymptomatique mais contagieux.
3. Stade Sida : Effondrement des LT4 $< 200/\mu$ L (seuil de risque majeur). Charge virale en remontée. Survenue d'infections opportunistes (tuberculose, pneumocystose, toxoplasmose, méningites cryptococciques, cytomégalovirus) et de cancers (sarcome de Kaposi, lymphomes). Sans traitement, décès en 1–2 ans.



Évolution conjointe de la charge virale (courbe rouge, échelle logarithmique à gauche) et du taux de lymphocytes T4 (courbe bleue, échelle linéaire à droite) au cours des trois phases de l'infection VIH non traitée. La primo-infection se traduit par un pic viral massif et une chute aiguë des LT4. La latence clinique montre un équilibre instable (point de consigne viral, déclin lent des LT4). Le stade Sida correspond à l'effondrement des LT4 < 200/μL et à la remontée de la charge virale.

ATTENTION Séropositivité ≠ Sida

Être séropositif signifie que des anticorps anti-VIH sont détectés dans le sang : l'infection est établie. Avoir le Sida signifie que l'infection a progressé jusqu'au stade terminal (LT4 < 200/μL ou infection opportuniste définissante). Une personne séropositive sous traitement efficace (ARV) ne développe pas le Sida, maintient un taux de LT4 normal et une charge virale indétectable. Ne jamais confondre le statut sérologique et le stade clinique.

7.4 Modes de transmission et prévention

DÉFINITION Modes de transmission du VIH

Le VIH se transmet par trois voies principales, nécessitant un contact avec des liquides biologiques contaminés (sang, sperme, sécrétions vaginales, lait maternel) en quantité suffisante :

1. Via sexuelle (majoritaire au Cameroun, $\approx 90\%$ des cas) : Rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés avec une personne infectée (charge virale détectable). Le risque est plus élevé en cas d'IST non traitées (lésions génitales).
2. Via sanguine : Transfusion de sang non dépisté (rare aujourd'hui grâce au dépistage systématique), partage de seringues/aiguilles/objets tranchants (rasoirs, lames de scarification, matériel de tatouage/piercing non stérilisé), accidents d'exposition au sang (AES) chez le personnel soignant.
3. Mère-enfant (transmission verticale) : Pendant la grossesse (transplacentaire), l'accouchement (contact sang/sécrétions), ou l'allaitement (lait maternel). Sans intervention, risque 15-45%; avec ARV + accouchement encadré + substituts laitiers, risque $< 2\%$ (élimination validée au Cameroun pour plusieurs sites).

ATTENTION Idées reçues : gestes qui NE transmettent PAS le VIH

Le VIH est un virus fragile hors de l'organisme (inactivé par la chaleur, le savon, l'eau de Javel, le séchage). Il ne se transmet PAS par :

- Les contacts quotidiens : poignées de main, embrassades (baisers sociaux), câlins, partage des repas, des verres, des couverts, des toilettes, des draps, des vêtements.
- Les piqûres d'insectes (moustiques, tiques) : le virus ne se réplique pas dans le moustique et la quantité de sang résiduaire sur la trompe est insuffisante.
- La salive, les larmes, la sueur, l'urine, les selles (sauf s'ils sont visiblement souillés de sang en grande quantité).
- L'air, l'eau, les aliments.

Lutter contre ces fausses croyances est la base de la lutte contre la stigmatisation.

MÉTHODE Stratégies de prévention combinée (Approche « Combinaison »)

La prévention efficace repose sur l'association de plusieurs leviers adaptés à la situation de chacun :

1. Abstinence / Différer les premiers rapports : Protection à 100% (seule méthode absolue).
2. Fidélité mutuelle au sein du couple : Après dépistage conjoint négatif.

3. Préservatif (masculin ou féminin) : Utilisé correctement à chaque rapport (vaginal, anal, oral). Seule méthode protégeant aussi des IST et grossesses non désirées. Disponible gratuitement dans les centres de santé et CEC (Centres d'Écoute et de Conseil) au Cameroun.
4. Dépistage volontaire (DV) / Dépistage Proposé par le Fournisseur (DPF) : Connaître son statut sérologique (et celui de son partenaire) est la porte d'entrée de la prévention et de la prise en charge. Test rapide (résultat < 30 min) ou ELISA (labo).
5. PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) : Prise d'ARV (TDF/3TC ou TDF/FTC) par une personne séronégative à haut risque (couples sérodifférents, travailleurs du sexe, HSH). Efficacité > 95% si observance parfaite. Disponible au Cameroun dans certains sites pilotes.
6. PEP (Prophylaxie Post-Exposition) : Traitement d'urgence (28 jours) à démarrer le plus vite possible, < 48h (idéalement < 4h) après une exposition à risque (viol, accident d'aiguille, rapport non protégé avec partenaire de statut inconnu/positif non traité).
7. Traitement comme prévention (TasP / I=I) : Personne vivant avec le VIH (PVVIH) sous ARV efficace → Charge virale indétectable (< 50 copies/mL) → Risque de transmission sexuelle nul (Indétectable = Intransmissible).
8. Prévention Mère-Enfant (PTME) : Dépistage systématique à la 1ère CPN, ARV à la mère (option B+ : à vie), accouchement sécurisé, prophylaxie ARV au nouveau-né (NVP/AZT 6 semaines), conseil sur l'alimentation du nourrisson (lait maternel exclusif 6 mois sous ARV maternel OU lait de substitution si conditions AFASS réunies).
9. Sécurité transfusionnelle & Précautions standard : Dépistage obligatoire de chaque don de sang, stérilisation matériel médical, usage unique des seringues, port de gants.

7.5 Diagnostic : du dépistage à la confirmation

EXPÉRIENCE

Principe du test de dépistage rapide (TDR) / ELISA

Document : Notice d'un test rapide de détection des anticorps anti-VIH-1/2 (ex : Determine, SD Bioline, First Response utilisés au Cameroun). Principe : Immunochromatographie sur bandelette. L'échantillon (sang total, sérum, plasma) migre. Si des anticorps anti-VIH sont présents, ils se lient à l'antigène viral (gp41, gp120, gp36) conjugué à des particules d'or (couleur rouge/rose) → complexe Ag-Ac. Ce complexe est capturé par des anticorps anti-humains immobilisés sur la bande (ligne T = Test). Un excès de conjugué est capturé en ligne C (Contrôle) validant le test. Interprétation :

- Ligne C seule visible → Négatif (pas d'anticorps détectés).
- Lignes C et T visibles → Positif (anticorps détectés).

- Ligne C absente → Invalide (refaire le test).

Confirmation : Tout test rapide positif doit être confirmé par un deuxième test rapide de marque différente (algorithme national) ou par Western Blot / Test de confirmation en laboratoire (spécificité ≈ 100%).

DÉFINITION Fenêtre sérologique

Période entre la contamination et l'apparition des anticorps détectables par les tests sérologiques standards. Durée moyenne : 3 à 6 semaines (jusqu'à 3 mois dans de rares cas). Pendant cette période, le test est faux négatif alors que la personne est contaminée et très contagieuse (charge virale très élevée). D'où l'importance de répéter le test 3 mois après la dernière exposition à risque pour lever le doute. La recherche d'antigène p24 (test combiné Ag/Ac) ou de l'ARN viral (PCR) raccourcit cette fenêtre à ≈ 10–15 jours.

EXEMPLE Exemple chiffré : Dépistage au Cameroun

Au Cameroun, le dépistage du VIH est gratuit dans tous les centres de santé publics et agréés (hôpitaux, centres de santé, CEC, certains laboratoires privés conventionnés).

- Test rapide : Résultat en 15–30 minutes sur sang total (prélèvement au bout du doigt).
- Algorithme national : Test A (ex : Determine) → Si positif, Test B (ex : SD Bioline) → Si positif, Test C (ex : First Response ou Stat-Pak) pour confirmation. Si discordance A+/B- → Test C (arbitre).
- Prise en charge : Tout test confirmé positif ouvre droit à la mise sous ARV immédiate (stratégie « Test and Treat » / « Dépister et Traiter » recommandée par l'OMS et appliquée au Cameroun depuis 2017), quel que soit le taux de LT4.

7.6 Conséquences socioculturelles et compétences psychosociales

L'épidémie de VIH/Sida n'est pas seulement biomédicale ; elle est profondément sociale. Au Cameroun, comme ailleurs, la peur, l'ignorance et les préjugés moraux ont généré une stigmatisation lourde de conséquences.

LESAVAIS-TU ? Stigmatisation et Droits Humains au Cameroun

La Loi n°2021/013 du 09 juillet 2021 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/Sida au Cameroun consacre :

- Le droit au consentement libre et éclairé pour le dépistage (interdiction du dépistage obligatoire à l'embauche, au mariage, à l'école).

- La confidentialité absolue du statut sérologique (secret médical).
- La non-discrimination : accès aux soins, à l'emploi, à l'éducation, au logement sans distinction.
- La protection des personnes vulnérables (femmes, enfants, minorités sexuelles, usagers de drogues, détenus).

Pourtant, la stigmatisation persiste : rejet familial, exclusion scolaire, licenciement abusif, violences conjugales après annonce de la séropositivité. Cela pousse au silence, empêche le dépistage, brise l'observance thérapeutique et alimente l'épidémie.

À RETENIR Compétences psychosociales : Vivre avec le VIH / Vivre avec les PVVIH

Pour la personne vivant avec le VIH (PVVIH) :

- Acceptation & Estime de soi : Accepter son statut sans culpabilité ni honte. Le VIH est une maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension.
- Observance stricte (Adhérence) : Prendre ses ARV tous les jours, à heure fixe, à vie. C'est la condition sine qua non de l'efficacité (charge virale indétectable) et de la prévention de la résistance. Outils : boîtes à pilules, alarmes téléphone, soutien pair-éducateur.
- Hygiène de vie : Alimentation équilibrée, sommeil, activité physique, arrêt tabac/alcool/drogues, vaccination à jour (hépatite B, HPV, grippe, pneumocoque), prévention du paludisme (MILDA).
- Suivi médical régulier : Consultation trimestrielle, contrôle charge virale (cible < 50 copies/mL) et LT4 tous les 6 mois.
- Vie affective et sexuelle épanouie : Information du partenaire (obligation légale de protection/prévention), usage du préservatif ou confiance dans l'I=I (si charge virale indétectable confirmée > 6 mois), projet de grossesse sécurisé (PTME).

Pour l'entourage / la communauté (Solidarité) :

- Empathie & Non-jugement : Écouter sans moraliser. Séparer la maladie de la personne.
- Confidentialité : Ne jamais divulguer le statut sérologique d'un tiers sans son accord explicite.
- Soutien pratique : Rappel des rendez-vous, aide au transport pour la clinique, partage des repas (aucune transmission), garde d'enfants.
- Lutte contre la stigmatisation : Dénoncer les discriminations, corriger les idées reçues (moustiques, repas), promouvoir le langage respectueux (« personne vivant avec le VIH » et non « sidéen », « contaminé », « victime »).
- Engagement citoyen : Participer aux campagnes de sensibilisation (Journée Mondiale

du Sida 1er décembre), soutenir les associations de PVVIH (ex : Réseau Camerounais des Associations de Personnes Vivant avec le VIH – RECAP+).

MÉTHODE Produire un outil de sensibilisation (Affiche, Sketch, Dépliant, Spot radio)

Compétence évaluée : « Produire des outils de sensibilisation dans le cadre de la prévention du VIH/Sida ».

1. Analyser la cible : Jeunes scolarisés ? Femmes enceintes ? Travailleurs du sexe ? Population générale ? Langue (français, anglais, langues locales : fulfulde, ewondo, bassa, pidgin) ?
2. Définir UN message clé clair et unique : Ex : « Dépistez-vous ensemble avant d'arrêter le préservatif » / « VIH indétectable = Intransmissible » / « Allaitement maternel exclusif 6 mois + ARV = Bébé sain ».
3. Choisir le support et le ton : Affiche visuelle (peu de texte, images fortes), Sketch (humour, situations vécues, dialogue), Dépliant (infos pratiques : où, quand, comment), Spot radio (court, percutant, en langue locale).
4. Valider le contenu scientifique : Vérifier l'exactitude (modes transmission, fenêtre sérologique, efficacité ARV, gratuité). Zéro stigmatisation dans les visuels/mots.
5. Appel à l'action concret : « Viens te faire tester gratuitement au Centre de Santé X, du lundi au vendredi, 7h-15h » / « Appelle le 117 (Numérique Vert Santé) pour info anonyme ».
6. Tester & Diffuser : Montrer à un petit groupe cible, corriger, puis diffuser (lycée, marché, église, mosquée, réseaux sociaux, radio communautaire).

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse d'une situation clinique : Suivi thérapeutique

Énoncé : Marie, 28 ans, diagnostiquée VIH+ en 2020 (LT4 = 350/μL, CV = 50 000 copies/mL). Elle démarre un traitement ARV (TDF/3TC/DTG) en 2020. En 2024, ses résultats sont : LT4 = 720/μL, CV = < 20 copies/mL (indétectable). Elle souhaite avoir un enfant avec son partenaire séronégatif.

1. Interpréter l'évolution biologique de Marie sous traitement.
2. Quel conseil donner pour son projet de grossesse ? Quel risque pour le partenaire ? Pour l'enfant ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. **Interprétation :** Le traitement est efficace. La charge virale est passée de 5×10^4 à < 20 copies/mL (indétectable), prouvant l'inhibition de la réplication virale (blocage transcriptase inverse + intégrase). Le taux de LT4 est remonté de 350 à 720/ μ L (reconstitution immunitaire), sortant de la zone de risque d'infections opportunistes (> 500). Marie est en succès virologique et immunologique.
2. **Conseils :**
 - **Partenaire :** Risque de transmission sexuelle nul (I=I : Indétectable = Intransmissible), condition : charge virale indétectable maintenue > 6 mois, observance parfaite, pas d'autres IST. Le préservatif reste recommandé pour prévenir autres IST/grossesse non désirée, mais non indispensable pour le VIH seul dans ce contexte.
 - **Grossesse :** Projet faisable et sécurisé. Maintenir le traitement actuel (DTG compatible grossesse, surveillance folates). Suivi mensuel charge virale (cible indétectable à l'accouchement). Accouchement par voies basses si CV indétectable. Prophylaxie NVP/AZT au nouveau-né 4–6 semaines. Allaitement maternel exclusif 6 mois recommandé (sous couvert ARV maternel efficace). Dépistage enfant à la naissance (PCR ARN), 6 semaines, 9 mois, fin allaitement.

EXERCICE 5 Cas pratique : Fenêtre sérologique et prise de risque

Paul a eu un rapport sexuel non protégé il y a 10 jours avec une partenaire dont il ignore le statut sérologique. Inquiet, il se rend au CEC du district de santé demain pour faire un test rapide.

1. Le test rapide (recherche d'anticorps) peut-il être fiable aujourd'hui? Justifier.
2. Quelle conduite tenir immédiatement (aujourd'hui) et dans 3 mois?
3. Si le test rapide d'aujourd'hui est négatif, Paul peut-il être rassuré définitivement?

CORRIGÉ Exercice : Fenêtre sérologique et prise de risque

1. Non, le test n'est pas fiable aujourd'hui. Le délai de 10 jours correspond à la fenêtre sérologique. Les anticorps anti-VIH ne sont pas encore produits en quantité détectable par les tests sérologiques standards (TDR/ELISA). Le test sera vraisemblablement faux négatif si Paul a été contaminé. La charge virale, elle, est déjà très élevée (primo-infection).
2. **Conduite immédiate (Aujourd'hui, J+10) :** Paul est dans le délai pour bénéficier d'une PEP (Prophylaxie Post-Exposition) (délai max 48h, idéalement < 4 h, mais on peut tenter jusqu'à 72h dans certains protocoles). Il doit se rendre immédiatement aux

urgences ou au CEC pour évaluation et prescription d'ARV d'urgence (28 jours).
Conduite à 3 mois (J+90) : Refaire un test de dépistage (anticorps) pour lever le doute définitif (fin de fenêtre sérologique).

3. Non. Un test négatif à J+10 ne signifie pas « non infecté », il signifie « anticorps non détectés à ce jour ». Paul doit impérativement refaire le test à 3 mois (et idéalement à 6 semaines aussi) pour confirmer sa séro-négativité. En attendant, il doit se protéger (préservatif) pour ne pas transmettre le virus s'il est en primo-infection (très contagieux).

LES AVAIS-TU ?

I = I : Une révolution scientifique et sociale

Depuis les études HPTN 052 (2011), PARTNER 1 & 2 (2016, 2018) et Opposites Attract (2018), le consensus scientifique mondial (OMS, ONUSIDA, CDC, Société Française de Lutte contre le Sida, Programme National de Lutte contre le Sida du Cameroun) est formel : Une personne vivant avec le VIH, sous traitement antirétroviral efficace depuis au moins 6 mois, avec une charge virale durablement indétectable (< 50 ou < 200 copies/mL selon les seuils), NE TRANSMET PAS le VIH par voie sexuelle. C'est le principe I = I (Indétectable = Intransmissible / U = U Undetectable = Untransmittable). Cette donnée change radicalement la vie des couples sérodifférents, la prévention (TasP : Treatment as Prevention) et la lutte contre la stigmatisation : le traitement est prévention.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 LES MÉCANISMES DE L'IMMUNITÉ ET SES DYSFONCTIONNEMENTS

9.1 Objectifs de l'activité

- Mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon pour analyser des documents expérimentaux et cliniques variés.
- Interpréter des résultats de greffe pour illustrer la reconnaissance du non-soi par le **CMH**.
- Exploiter une courbe de cinétique anticorps pour caractériser la réponse immune primaire, secondaire et la **mémoire immunitaire**.
- Analyser un cas clinique de diabète juvénile pour identifier un mécanisme **auto-immun** (perte de tolérance au soi).
- Exploiter l'évolution des taux de LT4+ et de charge virale pour expliquer la physiopathologie du **VIH/Sida**.
- Concevoir collectivement un outil de sensibilisation (affiche) intégrant prévention, modes de transmission et solidarité envers les PVVIH.


9.2 Situation

Contexte : Dans le cadre de la semaine « Santé et Citoyenneté » au Lycée Bilingue de Nkol-bisson (Yaoundé), la classe de Terminale C est invitée par le Centre de Santé Intégré (CSI) du quartier à participer à une « Enquête Immunologique ». Le Dr Mvondo, médecin-chef, remet à chaque groupe de 4 élèves un dossier patient anonymisé composé de quatre documents. L'objectif est de rendre compte, lors d'une restitution orale, des mécanismes immunologiques en jeu et de proposer une affiche de prévention pour le hall du lycée.

Document 1 : Expérience de greffe de peau chez la souris (Modèle de Medawar, 1944, adapté). On prélève un fragment de peau (greffon) sur une souris donneuse de lignée pure A (homozygote pour son CMH) et on le greffe sur une souris receveuse de lignée pure B. On observe le sort du greffon au cours du temps. L'expérience est répétée dans quatre conditions :

Condition	Donneur (Greffon)	Receveur (Hôte)	Résultat observé (Jour du rejet ou survie)
1	Souris A	Souris A (syngénique)	Greffon viable indéfiniment (> 100 jours)
2	Souris A	Souris B (allogénique)	Rejet complet vers le 12 ^e jour
3	Souris A	Souris B ayant déjà rejeté un greffon A (seconde greffe A)	Rejet accéléré vers le 6 ^e jour
4	Souris A	Souris B irradiée (dose létale : 9 Gy) + injection de cellules de rate de souris B non irradiée (reconstitution hémato-poïétique)	Greffon A rejeté vers le 12 ^e jour

Document 2 : Cinétique de la réponse humorale après vaccination (Vaccin tétanos, adjuvant aluminium). Un volontaire adulte, séronégatif pour la toxine tétanique, reçoit deux injections sous-cutanées du vaccin (J0 et J28). Le taux d'anticorps anti-toxine tétanique (IgG, en UI/mL) est dosé par ELISA à intervalles réguliers.



Données chiffrées clés : Pic primaire = 1,8 UI/mL au J14 ; Taux résiduel J28 ≈ 0,4 UI/mL ; Pic secondaire = 4,6 UI/mL au J38 (soit 10 jours post-rappel).


Document 3 : Cas clinique — Diabète juvénile (DT1) à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé. Patient : K., 14 ans, scolarisé en 3^e au Lycée de Mfou. Antécédents : Aucun. Vaccinations à jour (PEV). Pas de diabète familial au 1^{er} degré. Circonstances de découverte : Polyuro-polydipsie (PUPD) majeure depuis 3 semaines, amaigrissement de 5 kg en 1 mois, fatigue. Admis en urgence pour acidocétose diabétique (pH artériel 7,22 ; bicarbonates

12 mmol/L ; glycémie 28 mmol/L [504 mg/dL] ; cétonémie +++). Bilan immunologique (prélevé à J0, avant insulinothérapie) :

- Auto-anticorps anti-GAD65 (glutamate décarboxylase 65 kDa) : 125 UI/mL (N < 5 UI/mL).
- Auto-anticorps anti-IA2 (tyrosine phosphatase) : 87 UI/mL (N < 7,5 UI/mL).
- Auto-anticorps anti-insuline (IAA) : 42 nmol/L (N < 0,4 nmol/L).
- HLA-DR3/DR4 hétérozygote (phénotype à risque).

Évolution : Rééquilibrage métabolique sous insuline rapide (pompe) + insuline basale. Éducation thérapeutique initiée. Pronostic : insulindépendance à vie.

Document 4 : Histoire naturelle de l'infection VIH-1 non traitée (Données cohortes ANRS / Cameroun). Un patient masculin, 32 ans, séroconverti estimé à $t = 0$ (infection primaire symptomatique type mononucléose). Suivi sans ARV (refus initial, puis perte de vue). Mesures trimestrielles :



Évolution parallèle du taux de lymphocytes T CD4⁺ (échelle linéaire, bleu) et de la charge virale VIH-1 (échelle logarithmique, orange) au cours de l'infection non traitée. Seuil Sida (LT4⁺ < 200/μL) franchi vers l'année 7,5-8.

Repères cliniques : Seuil Sida (stade C CDC) : LT4⁺ < 200 μL⁻¹ ou infection opportuniste. Charge virale « set point » vers 1-2 ans ≈ 5 × 10⁴ copies/mL.

9.3 Consignes

Partie A : Analyse des documents (Travail de groupe, 45 min)

1. Doc 1 : Comparer les conditions 1 et 2. Quel rôle joue le CMH dans l'acceptation ou le rejet du greffon ? Expliquer le mécanisme cellulaire (lymphocytes T CD8⁺ cytotoxiques).
2. Doc 1 : Comparer les conditions 2 et 3. Quelle propriété fondamentale de l'immunité spécifique est mise en évidence ? Préciser le type de cellules responsables de cette accélération.

3. **Doc 1** : Interpréter la condition 4. Pourquoi la souris B irradiée reconstituée avec sa propre moelle rejette-t-elle le greffon A ? Que prouve cela sur l'origine des cellules effectrices ?
4. **Doc 2** : Décrire la courbe : phases de latence, croissance, pic, décroissance pour la primo-injection. Faire de même pour le rappel. Comparer les paramètres cinétiques (délai, amplitude, affinité supposée) et isotypes probables.
5. **Doc 2** : Relier la forme de la courbe secondaire à la mémoire immunitaire. Citer les deux populations cellulaires mémoires impliquées (LBm, LT4m) et leur rôle respectif.
6. **Doc 3** : À partir des auto-anticorps détectés (anti-GAD65, IA2, insuline), identifier la cible de l'attaque auto-immune. Quel type de diabète s'agit-il ? Expliquer le mécanisme : rupture de la tolérance centrale/périphérique → activation de LT4⁺ autoréactifs → activation LT8⁺ cytotoxiques et LB → destruction des cellules β pancréatiques.
7. **Doc 3** : Quel est le rôle du génotype HLA-DR3/DR4 ? (Prédisposition génétique : présentation efficace de peptides auto aux LT4⁺).
8. **Doc 4** : Décrire l'évolution parallèle des deux courbes (LT4⁺ et charge virale) en 3 phases : infection primaire, phase de latence clinique (asymptomatique), phase Sida.
9. **Doc 4** : Expliquer la chute brutale des LT4⁺ lors de l'infection primaire (lyse virale directe, apoptose bystander) puis la lente érosion pendant la latence (activation chronique, épuisement, destruction des niches lymphoïdes). Pourquoi la charge virale remonte-t-elle en phase terminale ?
10. **Doc 4** : À quel moment (année approximative) le patient bascule-t-il au stade Sida (critère immunologique LT4⁺ < 200 μL^{-1}) ? Quelles infections opportunistes sont à craindre au Cameroun à ce stade (ex. : tuberculose, toxoplasmose cérébrale, cryptococcose, diarrhées à *Cryptosporidium*) ?

Partie B : Production collective — Affiche de sensibilisation (30 min + restitution)


11. En classe entière, concevoir une affiche A3 destinée au tableau d'affichage du lycée. Elle doit comporter :
 - Un titre accrocheur.
 - Les 3 modes de transmission (sang, sexuel, mère-enfant) avec pictogrammes.
 - Les gestes **SANS RISQUE** (baiser, main, repas, moustique, piscine, toilettes) pour lutter contre la stigmatisation.
 - Le message : « Vivre avec le VIH, c'est d'abord vivre. Soutenons les PVVIH. »
 - Les numéros utiles au Cameroun : 117 (SOS Sida), 1510 (Allô Santé), Centre de Prise en Charge (PEC) le plus proche.

9.4 Ressources à mobiliser

- **Reconnaissance soi/non-soi** : CMH de classe I (sur toutes cellules nucléées) et classe II (sur CPA : macrophages, cellules dendritiques, LB). Récepteur TCR (LT) / BCR (LB). Restriction par le CMH.
- **Réponse spécifique** : Médiation cellulaire (LT8⁺ cytotoxiques → perforine/granzyme/FasL ; LT4⁺ Th1 → IFN- γ activation macrophages). Médiation humorale (LB → Plasmocytes → Ac ;

LBm).

- **Mémoire** : LBm (réponse Ac rapide, haute affinité, IgG) + LT4m (aide rapide). Justifie la vaccination (rappel).
- **Auto-immunité** : Perte de tolérance (centrale thymique : sélection négative défailante; périphérique : Tregs défailants, mimétisme moléculaire, libération d'antigènes cachés). Atteinte d'organe cible (cellules β pancréatiques $\rightarrow$ DT1).
- **VIH/Sida** : VIH = rétrovirus à tropisme CD4 (LT4⁺, macrophages, cellules dendritiques). Intégration provirus. Destruction LT4⁺ $\rightarrow$ immunodépression. Traitement = ARV (trithérapie) $\rightarrow$ charge virale indétectable = intransmissible (I=I). Prévention : PrEP, PEP, préservatifs, dépistage, TASP.



9.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8**Enquête immunologique : Corrigé guidé****Document 1 — Reconnaissance du non-soi et mémoire de greffe**

1. Cond 1 vs 2 : Syngénique (CMH identique) → tolérance (pas de reconnaissance « non-soi »). Allogénique (CMH différent) → rejet aigu (J12). Les LT8⁺ cytotoxiques du receveur reconnaissent les peptides allogéniques présentés par le CMH I du greffon (voie directe : LT8⁺ hôte voient CMH I donneur + peptide ; voie indirecte : CPA hôte présentent peptides donneur sur CMH II hôte aux LT4⁺). Destruction des cellules du greffon par perforine/granzyme B et voie Fas/FasL.
2. Cond 2 vs 3 : Rejet en J12 (primo-réponse) vs J6 (secondaire). Mémoire immunitaire. Présence de LTm (CD8⁺m et CD4⁺m) spécifiques du CMH A, activés plus vite, sans phase de latence longue, proliférant massivement.
3. Cond 4 : Irradiation 9 Gy détruit la moelle osseuse (hématopoïèse) → pas de lymphocytes matures. Reconstitution par rate B (cellules souches hématopoïétiques + lymphocytes matures B). Le système immunitaire reconstruit est de phénotype B (CMH B). Il reconnaît le greffon A comme non-soi → rejet en J12 (kinétique primo-réponse). Preuve : Les cellules effectrices du rejet (LT) dérivent de la moelle osseuse (hématopoïèse), pas des tissus résidents radio-résistants.

Document 2 — Mémoire immunitaire et vaccination

4. Primo-injection (J0-J28) : Phase de latence ≈ 7 jours (activation LB naïfs, présentation par CPA, aide LT4⁺, différenciation en plasmocytes). Pic IgM (non dosé ici) puis IgG vers J14 (1,8 UI/mL). Décroissance (demi-vie IgG ≈ 21 jours, mort des plasmocytes effecteurs). Taux résiduel J28 (0,4 UI/mL) = Ac résiduels + plasmocytes vieillissants.
5. Rappel (J28) : Réactivation immédiate des LBm et LT4m. Pas de phase de latence (pic J38, soit 10 j post-rappel). Amplitude ×2,5 (4,6 UI/mL vs 1,8 UI/mL). Affinité supérieure (mutation somatique, sélection). Isotype : quasi exclusivement IgG (commutation de classe déjà faite).
6. Mécanisme : LBm $\xrightarrow{\text{Ag + aide LT4m}}$ Plasmocytes (forte sécrétion Ac haute affinité) + nouveaux LBm. LT4m $\xrightarrow{\text{Ag sur CMH II}}$ sécrétion rapide IL-2, IL-4, IL-21 → prolifération/différenciation LBm. C'est la base de la vaccination : mimiquer l'infection sans pathologie pour générer cette mémoire.

Document 3 — Diabète de type 1 : Maladie auto-immune à médiation cellulaire et humorale

7. Auto-anticorps : Anti-GAD65, IA2, Insuline = marqueurs spécifiques de la destruction auto-immune des cellules β des îlots de Langerhans. Diagnostic : Diabète de type 1 (DT1) / Diabète juvénile.
8. Mécanisme : Predisposition génétique (HLA-DR3/DR4 : groove de liaison peptidique présentant efficacement peptides GAD/IA2/Insuline aux LT4⁺). Déclencheur environnemental (virus ? Cocksackie B ?). Rupture tolérance périphérique (Tregs CD4⁺CD25⁺FoxP3⁺ défaillants). Activation LT4⁺ Th1 autoréactifs → IFN- γ , TNF- α → ac-

tivation macrophages, expression CMH I/II sur cellules β (habituellement CMH I faible, pas de CMH II). Activation $LT8^+$ cytotoxiques autoréactifs (reconnaissance peptides auto sur CMH I) $\rightarrow$ lyse cellules β . LB activés $\rightarrow$ auto-Ac (marqueurs diagnostiques, pas effecteurs principaux de la destruction). $\rightarrow$ Déficit absolu en insuline.

9. HLA-DR3/DR4 : Allèles de classe II du CMH conférant un risque relatif $\times 15$ à $\times 20$. Hétérozygote DR3/DR4 = risque maximal (hétérozygotie avantageuse pour présentation de peptides variés, mais ici désavantageuse pour tolérance).

Document 4 — Dynamique VIH / $LT4^+$: Vers le Sida

10. Phase 1 : Infection primaire (0–6 mois). Pic charge virale ($> 10^6$ copies/mL) $\rightarrow$ dissémination. Chute brutale $LT4^+$ ($850 \mu L^{-1} \rightarrow 550 \mu L^{-1}$) : infection directe + lyse + apoptose bystander (GP120 soluble, activation immunitaire). Séroconversion.
11. Phase 2 : Latence clinique (6 mois – $\approx 7 - 8$ ans). Équilibre précaire : réplication virale continue (ganglions, rate, GALT) vs production $LT4^+$ (thymus, prolifération périphérique). « Set point » charge virale $\approx 5 \times 10^4$. Érosion lente $LT4^+$ ($\approx 50 - 80 \mu L^{-1}/an$) : activation chronique $\rightarrow$ épuisement ($PD-1^+$), fibrose du réseau réticulaire ganglionnaire (destruction niches stromales), mort par apoptose (Fas/FasL, TNF).
12. Phase 3 : Phase Sida (après ≈ 8 ans ici). $LT4^+$ franchissent seuil $200 \mu L^{-1}$ vers l'année 7,5–8. Charge virale repart à la hausse (perte contrôle immune, émergence variants X4 tropisme CXCR4 plus cytopathiques). Infections opportunistes (IO) : *Mycobacterium tuberculosis* (TB pulmonaire/extrapulmonaire, 1^{re} cause décès VIH au Cameroun), *Toxoplasma gondii* (encéphalite), *Cryptococcus neoformans* (méningite), *Pneumocystis jirovecii* (pneumonie), cytomégalovirus, diarrhées chroniques (*Cryptosporidium*, *Isospora*).
13. Basculement Sida : Vers l'année 7,5 – 8 ($LT4^+ \approx 200 \mu L^{-1}$). Sans ARV, survie médiane $\approx 1 - 2$ ans après 1^{re} IO.

Partie B — Affiche de sensibilisation (Exemple de structure)

VIH/SIDA : CONNAÎTRE, PRÉVENIR, SOUTENIR

COMMENT S'ATTRAPE-T-IL ? (3 voies)

- **Sang** : Seringues partagées (drogue, tatouage, scarifications), accidents d'exposition (soignants), transfusion non testée (rare aujourd'hui).
- **Sexuel** : Rapports non protégés (vaginal, anal, oral) avec partenaire séropositif non traité ou statut inconnu.
- **Mère-Enfant** : Grossesse, accouchement, allaitement (évitable par ARV mère + enfant).

GESTES SANS AUCUN RISQUE (Zéro transmission) :

- S'embrasser, se serrer la main, se prendre dans les bras.
- Manger ensemble, partager verre/couverts, toilettes, piscine, moustiques.
- Travailler, étudier, jouer ensemble.

MES MOYENS DE PROTECTION :

- Préservatif (masculin/féminin) à chaque rapport.
- Dépistage régulier (gratuit, confidentiel au CSI/CEPEC).
- PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition) si risque élevé.
- PEP (Post-Exposition) < 48 h après accident.
- TASP : Personne sous ARV, charge virale indétectable = NON TRANSMISSIBLE (I = I).

VIVRE AVEC LE VIH, C'EST D'ABORD VIVRE. Stop à la stigmatisation ! Une personne séropositive traitée est une personne en bonne santé. NUMÉROS UTILES CAMEROUN :

- 117 (SOS Sida / Écoute/Info)
- 1510 (Allô Santé / Ministère Santé Publique)
- CEPEC le plus proche : Hôpital Central / Hôpital Général / Hôpital de District de votre arrondissement.

ATTENTION Pièges fréquents et points de vigilance pour le Bac

- Greffe : Ne pas confondre voie directe (LT hôte reconnaissent CMH donneur intact sur cellules donneuses) et voie indirecte (CPA hôte présentent peptides donneurs sur CMH hôte). Les deux coexistent. Le rejet aigu est médié principalement par les LT8⁺ (voie directe) et LT4⁺ Th1 (voie indirecte).
- Mémoire : La réponse secondaire est plus rapide (pas de latence), plus intense (amplitude), de meilleure affinité (mutation somatique) et de classe IgG (commutation déjà réalisée). Les LBm ne sécrètent pas d'Ac au repos ; ils se différencient en plasmocytes

au contact de l'Ag.

- **Auto-immunité (DTI) :** Les auto-anticorps (anti-GAD, IA2, IAA) sont des marqueurs diagnostiques (dépistage précoce, prédiction), mais les effecteurs de la destruction sont les $LT8^+$ cytotoxiques (et macrophages activés par Th1). Ne pas écrire « les anti-corps détruisent les cellules β ».
- **VIH/Sida :** La charge virale « set point » détermine la vitesse d'évolution. L'épuisement des $LT4^+$ est multifactoriel (infection directe, apoptose bystander, activation chronique, fibrose lymphoïde, insuffisance thymique). I = I (Indétectable = Intransmissible) est un message majeur de santé publique : une PVVIH sous ARV efficace (charge virale < 50 copies/mL) ne transmet pas le virus sexuellement.
- **Unités :** Toujours écrire les unités (μL^{-1} pour $LT4$, copies/mL pour charge virale, UI/mL pour Ac, Gy pour irradiation). Respecter les puissances de 10 (notation scientifique).

9.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de :

- **Consolider la notion de « Soï » et « Non-soï »** via le modèle expérimental de la greffe (Doc 1), fondement de la tolérance immunologique et de la surveillance anticancéreuse.
- **Quantifier la mémoire immunitaire** (Doc 2) : cinétique, amplitude, affinité, isotype — base rationnelle du calendrier vaccinal (rappels) et de la sérologie post-vaccinale.
- **Comprendre la rupture de tolérance** (Doc 3) : le DTI comme modèle d'auto-immunité à médiation cellulaire ($LT8^+$ cytotoxiques) avec marqueurs humoraux (auto-Ac) accessibles au diagnostic précoce. Lien génétique (HLA) + environnement.
- **Modéliser la dynamique VIH/ $LT4^+$** (Doc 4) : la course poursuite virus/hôte, l'épuisement du réservoir thymique et ganglionnaire, le seuil critique des 200 $LT4^+$ / μL définissant le Sida, et l'urgence du dépistage précoce et de l'ARV à vie.
- **Développer des compétences psychosociales** (Partie B) : transformer le savoir scientifique en message citoyen, lutter contre la sérophobie (gestes sans risque), promouvoir le dépistage et l'observance (I=I), connaître les ressources locales (numéros verts, CEPEC).

L'élève termine cette leçon capable d'argumenter scientifiquement sur une pathologie immune, d'interpréter un bilan sérologique ou une courbe de suivi VIH, et d'agir en acteur de santé publique dans son établissement.

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS


11 LES MÉCANISMES DE L'IMMUNITÉ ET SES DYSFONCTIONNEMENTS

11.1 Origine et maturation des cellules immunitaires

DÉFINITION Hématopoïèse et lignées immunitaires

Toutes les cellules du système immunitaire dérivent de **cellules souches hématopoïétiques** (CSH) situées dans la **moelle osseuse rouge** (os plats : sternum, côtes, iliaques ; épiphyses des os longs). Deux grandes lignées se séparent précocement :

- la lignée myéloïde : donne les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, les monocytes (devenant macrophages dans les tissus) et les cellules dendritiques ;
- la lignée lymphoïde : donne les lymphocytes B (LB), les lymphocytes T (LT) et les cellules NK (Natural Killers).



PROPRIÉTÉ Lieux de formation et de maturation

- Formation (production) : moelle osseuse rouge pour toutes les cellules immunitaires.
- Maturation (acquisition des récepteurs spécifiques et tolérance du soi) :
 - Lymphocytes B : moelle osseuse (mnémotechnique : B = Bone marrow).
 - Lymphocytes T : thymus (mnémotechnique : T = Thymus). Sélection positive (ré-ognition CMH propre) et négative (élimination autoréactifs).
 - Polynucléaires, monocytes, NK : moelle osseuse.
- Migration : cellules matures (naïves) → circulation sanguine → organes lymphoïdes secondaires (ganglions, rate, amygdales, plaques de Peyer, MALT) où elles rencontrent les antigènes.

11.2 Méthode 1 : Déterminer les lieux de formation et de maturation des cellules immunitaires

MÉTHODE Retrouver l'origine et le devenir d'une cellule immunitaire

1. Identifier la cellule étudiée dans l'énoncé (lymphocyte B, lymphocyte T, macrophage, polynucléaire...).
2. Se rappeler le point de départ commun : toutes les cellules immunitaires dérivent des **cellules souches hématopoïétiques** de la **moelle osseuse rouge**.
3. Distinguer formation et maturation :
 - lymphocytes **B** : maturation dans la moelle osseuse ;
 - lymphocytes **T** : maturation dans le thymus ;
 - polynucléaires et monocytes : maturation dans la moelle osseuse ; les monocytes deviennent macrophages dans les tissus.
4. Exploiter les documents : greffe de moelle, thymectomie, irradiation → raisonner sur les déficits observés.
5. Conclure : la cellule mature migre vers les organes lymphoïdes secondaires (ganglions, rate) pour la rencontre antigénique.

Réflexe Bac : ne jamais écrire « les lymphocytes T sont produits dans le thymus » : ils y mûrissent mais sont produits dans la moelle osseuse.

EXERCICE RÉSOLU 9 Thymectomie et déficit immunitaire chez la souris

On réalise chez deux lots de souris nouveau-nées : Lot A : ablation du thymus (thymecto-

mie); Lot B : témoins. Trois semaines plus tard, greffe de peau allogénique (autre souche) et mesure de la production d'anticorps après injection de sérum étranger. Résultats : Lot A accepte la greffe (pas de rejet) mais produit très peu d'anticorps; Lot B rejette la greffe en 12 jours et produit normalement des anticorps. Interpréter.

SOLUTION

Raisonnement. La thymectomie supprime le thymus sans toucher à la moelle : on teste le rôle du thymus dans la maturation des LT.

Étape 1 — Lot A. Absence de rejet ⇒ réponse à **médiation cellulaire** abolie (assurée par LT4 auxiliaires et LT8 cytotoxiques). Production d'anticorps très réduite ⇒ l'activation complète des LB nécessite l'aide des LT4 (interleukines).

Étape 2 — Lot B. Rejet + anticorps normaux ⇒ les deux réponses spécifiques fonctionnent avec un thymus intact.

Étape 3 — Interprétation. Le thymus est le lieu de maturation des LT (acquisition TCR, tolérance du soi). La moelle, intacte chez A, produit précurseurs et LB → anticorps résiduels. Conclusion. Toutes les cellules immunitaires sont formées dans la moelle osseuse rouge; les LB y mûrissent, les LT migrent vers le thymus pour mûrir. Le thymus est un organe lymphoïde primaire indispensable à l'immunité cellulaire.

11.3 La reconnaissance du soi et du non-soi

DÉFINITION Marqueurs d'identité et récepteurs

- Soi : molécules du **CMH** (Complexe Majeur d'Histocompatibilité), appelées HLA chez l'Homme.
 - CMH classe I : toutes les cellules nucléées (présentent peptides intracellulaires aux LT8/CD8).
 - CMH classe II : cellules présentatrices d'antigènes professionnelles (CPA : macrophages, LB, cellules dendritiques); présentent peptides extracellulaires aux LT4/CD4.
- Non-soi : **antigènes** (molécules étrangères : protéines virales/bactériennes, CMH de greffon, toxines). La partie reconnue est l'**épitope** (déterminant antigénique).
- Récepteurs de reconnaissance :
 - **TCR** (Récepteur des Lymphocytes T) : reconnaît un complexe peptide + CMH (restriction du CMH).
 - **BCR** (Récepteur des Lymphocytes B = anticorps membranaire IgM/IgD) : reconnaît l'antigène natif (conformation 3D), libre ou à la surface d'un pathogène.
 - **Anticorps solubles** (immunoglobulines) : même spécificité que le BCR, effecteurs

de l'immunité humorale.

PROPRIÉTÉ Spécificité et complémentarité

La reconnaissance repose sur une complémentarité stéréochimique (modèle clé-serrure) entre un épitope unique et le site de liaison d'un récepteur (TCR ou BCR). Un clone lymphocytaire ne reconnaît qu'un seul épitope. La diversité du répertoire ($> 10^7$ spécificités) est générée par recombinaison V(D)J lors de la maturation (brassage génétique).

11.4 Méthode 2 : Identifier les structures de reconnaissance du soi et du non-soi

MÉTHODE Reconnaître soi et non-soi dans un exercice

1. Repérer les partenaires : cellule immunitaire (LT, LB, macrophage) et cible.
2. Marqueurs du soi : protéines du **CMH** (HLA). Classe I = toutes cellules nucléées ; Classe II = CPA.
3. Marqueurs du non-soi : **antigènes** (protéines étrangères, CMH greffon) ; partie reconnue = **épitope**.
4. Structures de reconnaissance : **TCR** (LT), **BCR** (LB), anticorps solubles.
5. Reasonner en complémentarité : épitope donné $\leftrightarrow$ clone porteur du récepteur complémentaire.
6. Conséquence : non-soi $\Rightarrow$ activation clonale $\Rightarrow$ réponse ; soi seul $\Rightarrow$ tolérance (absence de réaction).

EXERCICE RÉSOLU 10 Greffes de peau entre souches de souris

Exp. 1 : greffe même souche pure $\rightarrow$ acceptée. Exp. 2 : greffe souche X sur Y $\rightarrow$ rejet en 12 j. Exp. 3 : re-greffe X sur même Y $\rightarrow$ rejet en 6 j. Expliquer.

SOLUTION

Exp. 1. CMH identiques $\rightarrow$ greffon reconnu soi. Tolérance, pas d'activation.

Exp. 2. CMH X $\neq$ CMH Y $\rightarrow$ CMH X = antigène (non-soi) pour Y. **TCR** des LT de Y reconnaissent épitopes CMH X. LT8 cytotoxiques détruisent greffon : réponse primaire (lente : sélection + amplification clonale = 12 j).

Exp. 3. Rejet accéléré (6 j) = réponse secondaire. Première greffe a généré **lymphocytes mémoires** anti-CMH X. Reconnaissance immédiate, intense. Confirme spécificité et mémoire.

Conclusion. Soi = CMH ; non-soi reconnu par TCR/BCR. Réponse spécifique, mémorisée = immunité adaptative.

11.5 La réponse immunitaire non spécifique (rappels)

À RETENIR Immunité innée : premières lignes de défense

1. Barrières physiques/chimiques : peau (kératine, pH acide, flore), muqueuses (cilia, mucus, lysozyme, pH gastrique).
2. Inflammation : signe clinique (rougeur, chaleur, gonflement, douleur). Médiateurs : histamine (mastocytes), prostaglandines, cytokines (IL-1, TNF- α). Vasodilatation, perméabilité vasculaire → extravasation des polynucléaires neutrophiles (chimiotaxie).
3. Phagocytose : neutrophiles (premiers arrivés, vie courte), macrophages (résidents, longue vie, présentation d'antigène), cellules dendritiques (pont vers adaptative). Étapes : chimiotaxie, adhérence, ingestion (phagosome), fusion lysosome → phagolysosome, digestion enzymatique (lysozyme, ROS, NO).
4. Cellules NK (Natural Killers) : lysent cellules cancéreuses ou infectées sans sensibilisation préalable (reconnaissance « missing self » : absence CMH I). Perforines + granzymes → apoptose.
5. Système du complément : cascade protéique (voie classique, alternative, lectine) → opsonisation (C3b), chimiotaxie (C5a), lyse directe (Complexe d'Attaque Membranaire C5b-9).

11.6 La réponse immunitaire spécifique : médiation cellulaire et humorale

EXPÉRIENCE Mise en évidence des deux médiation (transfert adoptif)

Protocole classique (souris). Souris immunisée (antigène X) → prélèvement sérum (anticorps) OU lymphocytes. Transfert vers souris naïves → challenge antigène X.

- Transfert sérum protecteur ⇒ **médiation humorale** (anticorps contre antigènes libres : bactéries, toxines, virus extracellulaires).
- Transfert lymphocytes protecteur ⇒ **médiation cellulaire** (LT8 cytotoxiques contre cellules infectées/cancéreuses/greffons ; LT4 auxiliaires orchestrent).




Schéma unifié de la réponse spécifique : présentation par CPA (CMH II) → activation LT4 → orchestration double : humorale (LB → Plasmocytes/Ac) et cellulaire (LT8 → CTL). Les flèches pleines = contact/cytokinique ; flèches pointillées = cytokines.

PROPRIÉTÉ Mécanismes effecteurs

- Médiation humorale (anti-Ag libres) : Anticorps (IgG, IgM, IgA, IgE) → Neutralisation (blocage entrée virus/toxines), Opsonisation (phagocytose facilitée), Activation complément (lyse bactéries), ADCC (NK tue cellule opsonisée via FcγR).
- Médiation cellulaire (anti-cellules altérées) : LT8 cytotoxiques (CTL) reconnaissent

CMH I + peptide sur cellule cible → lysis par perforines (pores) + granzymes (apoptose) ou voie Fas/FasL. LT4 Th1 activent macrophages (IFN- γ) pour tuer bactéries intracellulaires (ex. *Mycobacterium tuberculosis*).

11.7 Méthode 3 : Interpréter des résultats d'expériences sur les types de réponses immunitaires

MÉTHODE Analyser un protocole expérimental d'immunologie

1. Problème & Hypothèse : ex. « Immunité transmise par cellules ou sérum ? ».
2. Lots : Témoin / Expérimental(s) ; identifier la seule variable modifiée.
3. Comparaison quantitative : citer chiffres avec unités (survie %, titres Ac, délais).
4. Attribution mécanistique :
 - Transfert sérum protecteur ⇒ **médiation humorale** (LB → Plasmocytes → Ac).
 - Transfert cellules (lymphocytes) protecteur ⇒ **médiation cellulaire** (LT4, LT8).
 - Destruction cellules infectées/greffées ⇒ LT8 cytotoxiques.
 - Protection immédiate, brève, sans mémoire après sérum ⇒ immunisation passive.
5. Conclusion : valider/infirmier hypothèse sans sur-généraliser.

Réflexe : l'expérience de transfert (sérum ou cellules d'immunisé vers naïf) est le schéma classique pour distinguer humorale et cellulaire.

EXERCICE RÉSOLU 11 Transfert de sérum et de lymphocytes

Cobayes guéris (immunisés) → sérum + lymphocytes. 3 lots naïfs : Lot 1 (sérum), Lot 2 (lymphocytes), Lot 3 (sérum physiologique témoin). Infection bactérie. Survie à J15 : L1=90%, L2=20%, L3=10%. Interpréter.

SOLUTION

Hypothèse : Immunité anti-bactérienne = facteurs sériques (Ac) ou cellules ?

Lot 3 (Témoin) : 10% survie → bactérie pathogène, naïfs sans défense.

Lot 1 (Sérum) : 90% survie → protection quasi totale. Sérum = **anticorps** (immunoglobulines) des plasmocytes. Mécanismes : neutralisation, agglutination, opsonisation, activation complément.

Lot 2 (Lymphocytes) : 20% ≈ témoin. Lymphocytes seuls inefficaces contre bactérie extracellulaire (de plus, risque rejet allogénique si transfert entre individus).

Interprétation : Protection par sérum = **réponse à médiation humorale** (LB → Plasmocytes → Ac). Immunisation passive : immédiate, temporaire, pas de mémoire chez receveur.
Conclusion : Immunité acquise contre cette bactérie = type humoral. Anticorps seuls assurent la protection.

11.8 La mémoire immunitaire et la vaccination

PROPRIÉTÉ Cinétique de la réponse humorale : Primaire vs Secondaire

Paramètre	Réponse Primaire (1 ^{re} contact)	Réponse Secondaire (Rappel, même Ag)
Latence	Longue (5–10 jours)	Courte (1–3 jours)
Pic de concentration	Faible	Élevé (10 à 100× primaire)
Ig dominantes	IgM (puis IgG)	IgG (affinité mature)
Durée / Persistance	Courte (semaines)	Longue (mois/années)
Base cellulaire	Sélection clonale → Plasmocytes + Lymphocytes Mémoire (LBm, LTm)	Activation immédiate Lymphocytes Mémoire (nombreux, affinité haute, seuil activation bas)

11.9 Méthode 4 : Exploiter une courbe de cinétique des anticorps (mémoire immunitaire)

MÉTHODE Lire et interpréter une réponse primaire et secondaire


1. Axes : Abscisse = Temps (jours) + dates injections ; Ordonnée = Titre Ac (conc. ou UA).
2. Primaire : Latence, pic faible/lent (J10–15), IgM dominantes.
3. Secondaire : Même Ag injecté → Latence courte (J2–3), pic élevé/durable, IgG dominantes.
4. Explication cellulaire : 1^{re} rencontre → sélection clonale + plasmocytes + **lymphocytes mémoires**. 2^e rencontre → activation immédiate cellules mémoires.
5. Lien vaccination : Vaccin (Ag inoffensif) crée mémoire sans maladie ; rappel entretient cellules mémoires.
6. Spécificité : Ag différent au rappel → réponse primaire (pas de mémoire croisée).

EXERCICE RÉSOLU 12 Cinétique anticorps après deux injections

Lapin : Anatoxine tétanique J0 et J30. Titre (UA) : J0=0 ; J7=5 ; J15=40 (pic) ; J30=10 ; J33=60 ; J38=400 (pic) ; J60=250. Tracer et interpréter.

SOLUTION

Tracé. Temps (jours) / Titre (UA). Courbe : pic modéré J15 (40 UA) ; 2^e injection J30 → montée rapide, pic élevé J38 (400 UA), décroissance lente.



Cinétique des anticorps antitétaniques : réponse primaire (pic faible/tardif) puis secondaire (pic rapide/élevé) après rappel.

Primaire (J0–J30). Latence (5 UA J7), pic faible 40 UA J15. Temps sélection clone LB, amplification, différenciation plasmocytes. Apparition **lymphocytes mémoires**.

Secondaire (J30–J60). Latence courte (60 UA J33 = 3 j), pic 10× plus haut (400 UA J38), persistant (250 UA J60). Cellules mémoires (spécifiques, nombreuses, seuil bas) activées immédiatement → production massive IgG.

Conclusion. Mémoire immunitaire = réponse secondaire plus rapide, intense, durable. Fondement de la vaccination (anatoxine = Ag vaccinal non pathogène).

À RETENIR Principes et types de vaccins

- Principe : Mimer l'infection (Ag) sans provoquer la maladie → induire mémoire (LBm, LTm).
- Types :
 - Vivants atténués (Rougeole, Rubéole, Oreillons, BCG, Fièvre jaune) : réplication limitée, immunité forte/durable (humorale + cellulaire), contre-indiqués immuno-déprimés/grossesse.

- Inactivés (tués) (Coqueluche, Polio Salk, Rage, Hépatite A, Grippe) : pas de répllication, plus sûrs, souvent adjuvés (Alum), rappels nécessaires.
- Sous-unitaires / Recombinants / ARN messenger (Hépatite B, HPV, COVID-19 ARNm, Pneumocoque conjugué) : Ag purifié ou code génétique → sécurité maximale, réponse ciblée.
- Toxoïdes (Anatoxines) (Tétanos, Diphtérie) : toxine inactivée → anti-toxines neutralisantes.
- Couverture vaccinale : Objectif OMS $\geq 90\%$ (immunité collective protège non-vaccinés).

11.10 Les dysfonctionnements : maladies auto-immunes

DÉFINITION Maladie auto-immune

Rupture de la tolérance du soi (défaillance sélection négative thymique/médullaire ou régulation périphérique Treg) → activation de clones autoréactifs : production d'auto-anticorps et/ou LT autoréactifs dirigés contre antigènes propres → lésion tissulaire chronique.

PROPRIÉTÉ Trois exemples au programme

Maladie	Cible auto-immune	Mécanisme lésionnel	Symptômes majeurs
Diabète juvénile (Type 1)	Cellules β des îlots de Langerhans (pancréas endocrine)	LT8 cytotoxiques + Auto-Ac anti-GAD/Insuline/IA-2 → destruction cellulaire	Insulino-privation → Hyperglycémie chronique (> 1,26 g/L à jeun), glycosurie, polyurie, polydipsie, amaigrissement, cétoacidose.
Myasthénie	Récepteurs à l'acétylcholine (RACH) plaque motrice (jonction neuromusculaire)	Auto-Ac anti-RACH (IgG) → blocage/complément/destruction RACH → transmission neuromusculaire défectueuse	Fatigabilité musculaire : ptosis, diplopie, dyscoordination, faiblesse proximale, aggravée par l'effort, améliorée par le repos.
Vitiligo	Mélanocytes (cellules pigmentaires peau/cheveux)	LT8 cytotoxiques autoréactifs (réaction cellulaire) + Auto-Ac anti-mélanocytes → destruction mélanocytes	Taches dépigmentées (blanches, symétriques souvent), zones photo-exposées, muqueuses, cheveux blancs (leucotrichie). Non contagieux, impact psychologique fort.

11.11 Méthode 5 : Expliquer le mécanisme d'une maladie auto-immune

MÉTHODE Construire l'explication d'une maladie auto-immune

1. Définir : rupture tolérance soi → auto-anticorps et/ou LT autoréactifs.
2. Identifier la cible (cellules β , RACH, mélanocytes...).
3. Décrire le mécanisme : Auto-Ac bloquants/destructeurs (complément, ADCC) OU LT8 cytotoxiques (perforines/granzymes).

4. Relier lésion → symptômes : disparition/blocage cible = signes cliniques.
5. Citer exemples programme : Diabète juvénile, Myasthénie, Vitiligo.

EXERCICE RÉSOLU 13 Le diabète juvénile, une maladie auto-immune

Adolescent 13 ans (CHU Essos, Yaoundé) : soif intense, polyurie, amaigrissement. Glycémie jeun = 2,8 g/L (norme 0,7–1,1 g/L). Insulinémie quasi nulle. Auto-Ac anti-cellules β détectés. Expliquer mécanisme et justifier traitement insuline.

SOLUTION

Diagnostic. Hyperglycémie chronique (2,8 g/L) + insulinopénie = Diabète Type 1 (juvénile insulino-dépendant).

Mécanisme auto-immun. Auto-Ac anti-cellules β = preuve rupture tolérance. Système immunitaire reconnaît cellules β propres comme non-soi. LT8 cytotoxiques autoréactifs + Auto-Ac → destruction progressive cellules β (insulite).

Conséquence physiologique. Cellules β uniques productrices d'**insuline** (hormone hypoglycémisante : entrée glucose cellules, stockage glycogène/grasses). Destruction ⇒ absence insuline ⇒ glucose s'accumule sang (hyperglycémie) → seuil rénal dépassé → glycosurie → perte eau/électrolytes (polyurie, polydipsie) + catabolisme grasses/protéines (amaigrissement, corps cétoniques).

Justification traitement. Pancréas ne produit plus insuline → apport exogène obligatoire. Injections quotidiennes d'insuline (protéine digérée si voie orale) + automesure glycémie + régime équilibré.

Conclusion. Diabète juvénile = auto-immun (destruction cellules β par auto-Ac/LT autoréactifs) → insulinopénie → hyperglycémie chronique traitée par insulinothérapie substitutive à vie.

11.12 Le VIH/Sida : mécanismes, prévention et solidarité**EXPÉRIENCE** Cycle de réplication du VIH-1 (Rétrovirus)

1. Fixation : Glycoprotéine virale gp120 se lie au récepteur CD4 (LT4, macrophages, cellules dendritiques) + co-récepteur CCR5 (souches R5, transmission) ou CXCR4 (souches X4, stade avancé).
2. Entrée : Fusion membrane virale / membrane cellulaire (gp41) → libération capsid dans cytoplasme.
3. Transcription inverse : ARN viral (+) $\xrightarrow{\text{Transcriptase Inverse (TI)}}$ ADN double brin (provirus).
Étape cible thérapeutique majeure (I-NRTI, I-NNRTI).

4. Intégration : ADN viral $\xrightarrow{\text{Intégrase}}$ intégration dans génome hôte (chromosome). Cible : Inhibiteurs d'Intégrase (II).
5. Transcription/Traduction : Machinery cellulaire → ARNm viraux → protéines (Gag, Pol, Env) + ARN génomique.
6. Assemblage / Bourgeonnement : Particules immatures → maturation par Protéase virale (clivage polyprotéines) → Virions matures infectieux. Cible : Inhibiteurs de Protéase (IP).
7. Destruction cellulaire : Lyse, apoptose, syncytia, mort par activation immunitaire (bystander effect).

1. Fixation : gp120 – CD4 + CCR5/CXCR4

2. Fusion / Entrée

3. Transcription Inverse
(ARN → ADN)

Cible : I-NRTI / I-NNRTI
(ex. Ténofovir, Efavirenz)

4. Intégration
(ADN viral dans génome hôte)

Cible : Inhibiteurs Intégrase
(ex. Dolutégravir, Raltégravir)

5. Transcription / Traduction
(Protéines virales + ARN)

6. Assemblage / Bourgeonnement

7. Maturation (Protéase)
→ Virions infectieux

Cible : Inhibiteurs Protéase
(ex. Lopinavir, Darunavir)

Cycle de réplication du VIH et cibles des antirétroviraux (Trithérapie = association 3 molécules ciblant au moins 2 étapes différentes).

PROPRIÉTÉ Physiopathologie du Sida

- Cible principale : LT4 (CD4+) = « chefs d'orchestre » (sécrètent IL-2, IFN- γ , IL-4... activant LB, LT8, macrophages).
- Dynamique : Infection → réplication massive → destruction LT4 continue. Phase asymptomatique (années) : équilibre précaire production/destruction. Chute LT4 < 200 μL^{-1} (norme 800 μL^{-1} à 1200 μL^{-1}) → Stade Sida (Syndrome d'ImmunoDéficiency Acquisée).
- Conséquence : Effondrement des deux réponses spécifiques (humorale + cellulaire).
- Infections opportunistes : Agents habituellement contrôlés (TB : Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystose : Pneumocystis jirovecii, Candidoses, Toxoplasmose, CMV, Herpès, Kaposi HHV-8).

11.13 Méthode 6 : Analyser l'action du VIH et produire un outil de sensibilisation**MÉTHODE** Expliquer l'immunodéficience VIH et concevoir un message de prévention

1. Cible : VIH (rétrovirus ARN) infecte LT4 (CD4+) et macrophages (récepteur CD4 + co-récepteurs CCR5/CXCR4).
2. Cycle : Fixation CD4 → Entrée → Transcriptase inverse (ARN → ADN) → Intégration → Production virions → Destruction LT4.
3. Déficit : LT4 = chefs d'orchestre (activent LB, LT8). Chute LT4 (norme 800 μL^{-1} à 1200 μL^{-1} ; Sida < 200 μL^{-1}) → effondrement immunité spécifique.
4. Conséquences : Infections opportunistes (TB, Pneumocystose, Candidoses) + Cancers (Kaposi). Sida = stade de la maladie, pas maladie distincte.
5. Outil de sensibilisation : Support adapté (affiche, sketch, radio). Message clair :
 - Transmission : Rapports sexuels non protégés, Sang contaminé (aiguilles, transfusions), Mère-enfant (grossesse, accouchement, allaitement).
 - Prévention : Préservatif (M/F), Dépistage (connaître statut), Matériel stérile/usage unique, Trithérapie mère séropositive (PMTCT), PrEP/PEP.
 - Solidarité : VIH NE se transmet PAS par poignée de main, repas, moustiques, piscine, toux. Discrimination = injustice, frein au dépistage/soins. « Vivre avec le VIH, pas le rejeter ».

EXERCICE RÉSOLU 14 Suivi biologique VIH et messages de campagne

Patiente (Centre santé Douala) : LT4 : An 0 (contamination) $1000 \mu\text{L}^{-1}$; An 1 650 ; An 4 400 ; An 7 $180 \mu\text{L}^{-1}$ + tuberculose + candidoses. Expliquer évolution et proposer 2 messages prévention + 1 solidarité pour campagne scolaire.

SOLUTION

Étape 1 — Courbe LT4. Chute progressive $1000 \mu\text{L}^{-1} \rightarrow 180 \mu\text{L}^{-1}$ en 7 ans. VIH se réplique dans LT4 et les détruit en continu. Phase « silencieuse » (asymptomatique) = épuisement progressif stock LT4.

Étape 2 — Immunologie. LT4 sécrètent interleukines activant LB (Ac) et LT8 (cytotoxiques). $< 200 \mu\text{L}^{-1} \rightarrow$ paralysie deux bras immunité spécifique = Stade Sida. TB et candidoses = infections opportunistes (germes commensaux/faiblement pathogènes non contrôlés).

Étape 3 — Prise en charge. Trithérapie (ARV : 2 I-NRTI + 1 I-NNRTI ou II ou IP) bloque répllication, permet remontée LT4, charge virale indétectable (< 50 copies/mL) $\rightarrow$ infection chronique contrôlée. Dépistage précoce = vital.

Étape 4 — Messages campagne scolaire.

- Prévention 1 : « Protège ton avenir : le préservatif à chaque rapport sexuel à risque, c'est la barrière qui arrête le VIH. »
- Prévention 2 : « Fais le test : connaître ton statut, c'est te protéger et protéger les autres. Jamais d'aiguille, de lame, de matériel de scarification partagé. »
- Solidarité : « Le VIH ne se transmet ni par la main, ni par l'assiette, ni par les moustiques. Accueillons, soutenons, aimons les personnes vivant avec le VIH : la stigmatisation tue plus vite que le virus. »

Conclusion. VIH détruit LT4 (coordonnateurs immunité) $\rightarrow < 200 \mu\text{L}^{-1}$ = Sida (infections opportunistes). Trois piliers : Prévention (préservatif, dépistage, matériel stérile), Trithérapie (vie longue/qualité), Solidarité (lutte contre stigmatisation).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre formation et maturation : « Lymphocytes T produits dans le thymus » = FAUX. Produits dans moelle, mûrissent dans thymus. LB mûrissent dans moelle (pas rate).
2. Confondre médiation humorale et cellulaire : Humorale = Ac (plasmocytes/LB) contre Ag libres (bactéries, toxines). Cellulaire = LT8 cytotoxiques contre cellules infectées/étrangères (cancéreuses, greffons). JAMAIS : « Les anticorps détruisent la cellule greffée ».
3. Inverser réponse primaire/secondaire : Secondaire = plus rapide, plus intense, plus

durable (lymphocytes mémoires). Attribuer pic élevé à 1^{re} injection = erreur classique lecture courbe.

4. Oublier unités et valeurs de référence : Glycémie en g/L (norme 0,7–1,1 g/L); LT4 en μL^{-1} (seuil Sida 200 μL^{-1}). Comparaison résultats sans chiffres du doc = insuffisant.
5. Confondre VIH et Sida / Voies transmission : On transmet le VIRUS (VIH); Sida = STADE de la maladie. Voies UNIQUEMENT : Sexuelle, Sanguine, Mère–enfant. Dire « transmission Sida » ou « VIH par moustiques » = zéro point en sensibilisation.

LESAVAIS-TU ?**Le VIH au Cameroun : données et enjeux**

Selon les estimations ONUSIDA 2023, le Cameroun compte environ 500 000 personnes vivant avec le VIH (PVVIH), avec une prévalence autour de 2,7 % chez les 15–49 ans. La prévention de la transmission mère–enfant (PTME) a permis de réduire la transmission verticale à moins de 5 % grâce à la mise sous ARV précoce des femmes enceintes séropositives. Le défi majeur reste le dépistage (seulement 70 % des PVVIH connaissent leur statut) et l'observance thérapeutique pour atteindre l'objectif « 95–95–95 » (95% diagnostiqués, 95% traités, 95% charge virale supprimée). La lutte contre la stigmatisation dans les écoles et communautés est un levier essentiel pour améliorer le recours aux soins.

12 EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Origine et reconnaissance immunitaire

1. Les lymphocytes B acquièrent leur compétence immunitaire (maturation) principalement dans :
 - A. le thymus.
 - B. la moelle osseuse rouge.
 - C. la rate.
 - D. les ganglions lymphatiques.
2. Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) de classe I est exprimé par :
 - A. uniquement les cellules présentatrices d'antigènes (CPA).
 - B. toutes les cellules nucléées de l'organisme.
 - C. uniquement les lymphocytes T4.
 - D. les érythrocytes.
3. La réponse immunitaire non spécifique (innée) se caractérise par :
 - A. une spécificité antigénique élevée et une mémoire immunologique.
 - B. une mise en œuvre lente (plusieurs jours) et l'absence de mémoire.
 - C. une mise en œuvre rapide (minutes à heures) et l'absence de mémoire.
 - D. la production d'anticorps de haute affinité.
4. Quel type de lymphocyte est la cible principale du VIH ?
 - A. Les lymphocytes B.
 - B. Les lymphocytes T cytotoxiques (LT8 / CD8+).
 - C. Les lymphocytes T auxiliaires (LT4 / CD4+).
 - D. Les cellules Natural Killer (NK).

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifiez chaque réponse

1. « Les maladies auto-immunes résultent d'une absence totale de réaction immunitaire contre les antigènes du soi. »
2. « La mémoire immunitaire est assurée uniquement par les lymphocytes B mémoires qui produisent des anticorps en permanence. »
3. « Dans le diabète de type 1 (juvénile), le système immunitaire détruit les cellules β des îlots de Langerhans. »

gerhans du pancréas. » 4. « Le dépistage du VIH par test rapide (TROD) recherche directement la présence du virus dans le sang par PCR. »

EXERCICE 8 Définitions et notions clés

Donnez une définition précise et rigoureuse des termes suivants :

1. Antigène.
2. Épitope (déterminant antigénique).
3. CMH (Complexe Majeur d'Histocompatibilité) de classe II.
4. Tolérance immunologique (centrale et périphérique).
5. Infection opportuniste (dans le contexte du Sida).

EXERCICE 9 Calcul et lecture de données : Dynamique des populations lymphocytaires

Chez un adulte sain, le taux de lymphocytes T CD4+ dans le sang périphérique est d'environ $800 \mu\text{L}^{-1}$ (soit 40 % des lymphocytes T). Chez un patient infecté par le VIH non traité, ce taux chute à $200 \mu\text{L}^{-1}$ au bout de 5 ans.

1. Calculez le pourcentage de diminution du taux absolu de LT4.
2. Si le total des lymphocytes T reste constant, quel devient le pourcentage de LT4 parmi les lymphocytes T ?
3. Rappelez le seuil de LT4 (en μL^{-1}) en dessous duquel on parle de stade Sida (immuno-déficience sévère) selon la classification CDC/OMS.

12.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Lieux de formation et de maturation : Synthèse

Complétez le tableau suivant en indiquant pour chaque type cellulaire : son site de formation (hématopoïèse), son site de maturation (acquisition de la compétence immunitaire) et son marqueur de surface principal (CD).

Cellule	Site de formation	Site de maturation	Marqueur principal	CD
Lymphocyte B				
Lymphocyte T CD4+ (LT4)				
Lymphocyte T CD8+ (LT8)				
Macrophage / Monocyte				
Cellule dendritique				


EXERCICE 11 Mécanismes effecteurs : Médiation cellulaire vs Médiation humorale

On infecte deux groupes de souris avec une bactérie intracellulaire facultative (*Listeria monocytogenes*) et un virus grippal.

1. Pour chaque agent pathogène, précisez quelle réponse spécifique (cellulaire ou humorale) est prépondérante pour l'élimination de l'agent. Justifiez par la localisation de l'agent (extra/intracellulaire) et les effecteurs mobilisés.
2. Décrivez le mécanisme de destruction d'une cellule cible infectée par un virus par un LT8 cytotoxique (perforines, granzymes, apoptose).
3. Expliquez pourquoi le transfert de sérum immun (anticorps) d'une souris guérie protège une souris naïve contre le virus grippal, mais pas contre *Listeria*.

EXERCICE 12 Exploitation de courbes : Réponse primaire et réponse secondaire

On injecte un antigène X (protéine purifiée) à un lapin au jour 0 (primo-injection) et une seconde injection (rappel) au jour 30. On mesure le taux d'anticorps anti-X dans le sérum pendant 60 jours. Les résultats sont schématisés ci-dessous (courbes schématiques).



Évolution du taux d'anticorps sériques après primo-injection (J0) et rappel (J30) de l'antigène X.

1. Comparez la latence, l'amplitude du pic, la cinétique de montée et la nature des anticorps (isotypes) entre la réponse primaire et la réponse secondaire.
2. Identifiez les cellules responsables de la rapidité et de l'intensité de la réponse secondaire.
3. Expliquez le principe du rappel vaccinal en vous appuyant sur ce graphique.

EXERCICE 13 Cas clinique : Myasthénie auto-immune

Un patient de 35 ans consulte pour une fatigue musculaire anormale à l'effort, une ptôsis (chute de la paupière) et une diplopie (vision double) s'aggravant en fin de journée. Le test à la néostigmine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase) est positif (amélioration transitoire). Le dosage sanguin révèle la présence d'anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine (anti-RACH).

1. Identifiez la pathologie. Précisez s'il s'agit d'une maladie auto-immune à médiation humorale ou cellulaire. Justifiez.
2. Expliquez le mécanisme physiopathologique reliant la présence de ces auto-anticorps aux symptômes musculaires (blocage de la transmission neuromusculaire).
3. Le thymus est souvent hyperplasique ou thymomeux chez ces patients. Quel rôle joue le thymus dans la genèse de cette auto-immunité (sélection négative défailante, mimétisme moléculaire) ?
4. Proposez deux pistes thérapeutiques ciblant le système immunitaire (autre que l'anticholinestérasique).

12.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac : Preuve expérimentale de la médiation cellulaire dans le rejet de greffe (Expérience de Mitchison, 1954)

On réalise des greffes de peau allogéniques (donneur : souche A, receveur : souche B) chez la souris. On suit la survie de la greffe dans trois lots de souris receveurs (souche B) :


- Lot 1 (Témoins) : Souris normales recevant une greffe de peau souche A.
- Lot 2 : Souris irradiées (système immunitaire détruit) recevant une greffe de peau souche A ET une injection de lymphocytes T purifiés de souris souche B préalablement immunisées contre la souche A.
- Lot 3 : Souris irradiées recevant une greffe de peau souche A ET une injection de sérum (anticorps) de souris souche B préalablement immunisées contre la souche A.

Résultats observés :

- Lot 1 : Rejet de la greffe en 12 pm2 jours.
 - Lot 2 : Rejet de la greffe en 14 pm3 jours.
 - Lot 3 : Survie de la greffe >60 jours (pas de rejet).
1. À partir des résultats des lots 1 et 3, que pouvez-vous conclure sur le rôle des anticorps (médiation humorale) dans le rejet de greffe de peau ?
 2. À partir des résultats du lot 2, identifiez la population cellulaire responsable du rejet. Quel type de réponse immunitaire est mis en évidence ?
 3. Précisez le phénotype (marqueurs CD) des lymphocytes T effecteurs qui reconnaissent les antigènes du greffon (CMH de classe I ou II ?). Décrivez brièvement leur mécanisme d'action cytotoxique.
 4. Pourquoi a-t-on utilisé des souris irradiées pour les lots 2 et 3 ? Quel contrôle supplémentaire aurait été nécessaire pour valider l'expérience (lot 4) ?

EXERCICE 15 Type Bac : Dynamique de l'infection VIH et survenue des infections opportunistes

Le document ci-dessous présente l'évolution simultanée du taux de lymphocytes T CD4+ (LT4) et de la charge virale (ARN VIH/mL plasma) chez un patient infecté par le VIH-1, non traité, suivi pendant 10 ans.



Évolution de la numération des LT4 (échelle linéaire, axe gauche) et de la charge virale (échelle logarithmique, axe droit) au cours de l'infection VIH non traitée.

1. Repérez sur le graphique les trois phases cliniques de l'infection VIH (Primaire / Aiguë, Chronique / Asymptomatique, Sida / Terminale). Indiquez les bornes temporelles approximatives pour chaque phase.
2. Décrivez l'évolution de la charge virale et du taux de LT4 au cours de la phase 1 (infection primaire). Expliquez le pic de virémie et la chute transitoire des LT4 par la réplication virale et la réponse immune innée/adaptative naissante.
3. Pendant la phase 2 (phase de latence clinique), la charge virale reste relativement basse et stable (point de consigne viral) tandis que les LT4 déclinent lentement. Expliquez ce déclin progressif malgré une charge virale contrôlée (turn-over viral, activation immune chronique, destruction des LT4 infectés et bystander apoptosis).
4. Caractérisez la phase 3 (stade Sida) par les seuils critiques de LT4 et de charge virale. Expliquez pourquoi les infections opportunistes (ex : *Pneumocystis jirovecii*, *Toxoplasma gondii*, *Candida albicans*) surviennent spécifiquement à ce stade, en lien avec le rôle des LT4 dans l'activation des macrophages ($\text{IFN-}\gamma$) et des LT8.

EXERCICE 16 Type Bac : Synthèse – Rôle central du LT4, immunodéficience VIH et prévention au Cameroun

Contexte : Au Cameroun, la prévalence du VIH chez les adultes de 15–49 ans est estimée à 2,7 % (Enquête CAMPHIA 2017–2018), avec des disparités régionales et selon le genre. La prise en charge repose sur les ARV gratuits, mais la prévention reste un pilier majeur.

1. **Rôle du LT4 :** En vous appuyant sur vos connaissances des réponses immunitaires spécifiques (humorale et cellulaire), décrivez trois fonctions majeures du lymphocyte T auxiliaire (LT4 / CD4+) qui en font le « chef d'orchestre » de la réponse immune adaptative. (Indices : activation des LB, activation des macrophages, aide aux LT8).
2. **Mécanisme de l'immunodéficience :** Expliquez de manière rigoureuse comment l'infection et la destruction progressive des LT4 par le VIH entraînent un effondrement global des deux bras de la réponse immune spécifique (humorale et cellulaire) et de l'immunité innée (macrophages), conduisant au Sida.
3. **Prévention contextuelle :** Proposez trois mesures de prévention primaire ou secondaire adaptées au contexte camerounais (zones urbaines, zones rurales, populations clés, jeunes), en justifiant chacune par son efficacité prouvée et sa faisabilité socio-culturelle. Intégrez les notions de PrEP, Tasp (Treatment as Prevention), éducation sexuelle complète, et lutte contre la stigmatisation.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Origine et reconnaissance immunitaire

1. Réponse B — la moelle osseuse rouge. Les lymphocytes B naissent et acquièrent leur compétence immunitaire dans la **moelle osseuse rouge** (organe lymphoïde central), où s'effectue la sélection négative des LB autoréactifs. Le thymus (A) est le site de maturation des lymphocytes T ; la rate (C) et les ganglions (D) sont des organes lymphoïdes périphériques où les lymphocytes matures sont activés, et non formés.
2. Réponse B — toutes les cellules nucléées de l'organisme. Le **CMH de classe I** (HLA-A, -B, -C chez l'Homme) est exprimé à la surface de toutes les cellules possédant un noyau : il présente les peptides endogènes aux LT8. Le CMH de classe II, lui, est restreint aux CPA (A). Les érythrocytes (D), anucléés, n'expriment pas de CMH — c'est d'ailleurs ce qui rend les transfusions possibles sans rejet lié au CMH.
3. Réponse C — mise en œuvre rapide, sans mémoire. L'immunité **innée** (barrières, phagocytose, inflammation, complément, cellules NK) intervient en quelques minutes à heures, de façon identique à chaque contact : elle n'a ni spécificité clonale fine ni mémoire. Les propositions A et D décrivent l'immunité adaptative humorale ; B est contradictoire (la lenteur caractérise la réponse primaire adaptative, qui possède une mémoire).
4. Réponse C — les lymphocytes T auxiliaires LT4 (CD4+). La gp120 du **VIH** se fixe sur le récepteur CD4 (et les corécepteurs CCR5/CXCR4). La destruction progressive des LT4, chefs d'orchestre de l'immunité adaptative, explique l'effondrement immunitaire du Sida.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ?

1. FAUX. Les maladies auto-immunes résultent au contraire d'une **rupture de la tolérance** : le système immunitaire réagit anormalement contre des antigènes du soi (auto-antigènes), avec production d'auto-anticorps ou de LT autoréactifs. Ce n'est pas une absence de réaction, mais une réaction inappropriée et excessive dirigée contre le soi.
2. FAUX. La mémoire immunitaire repose sur des **lymphocytes B mémoires** et des **lymphocytes T mémoires** (LT4 et LT8 mémoires), cellules quiescentes à longue durée de vie. De plus, les LB mémoires ne sécrètent pas d'anticorps en permanence : ils se différencient en plasmocytes sécréteurs uniquement lors d'un nouveau contact avec l'antigène. (Seuls quelques plasmocytes à longue vie, dans la moelle, maintiennent un taux basal d'anticorps.)
3. VRAI. Dans le **diabète de type 1**, une réaction auto-immune (auto-anticorps anti-îlots et LT8 cytotoxiques) détruit sélectivement les cellules β des îlots de Langerhans, d'où l'absence de sécrétion d'insuline et l'hyperglycémie chronique, traitée par insulinothérapie substitutive.

4. FAUX. Le TROD (test rapide à orientation diagnostique) recherche des **anticorps anti-VIH** (sérologie indirecte), parfois combinés à l'antigène p24 — jamais le génome viral. La PCR (recherche d'ARN ou d'ADN proviral) est un examen de biologie moléculaire réservé à des situations particulières (diagnostic précoce du nourrisson, fenêtre silencieuse, charge virale).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notions clés

1. Antigène : toute molécule (protéine, polysaccharide, lipide, acide nucléique) étrangère ou perçue comme étrangère, capable d'être reconnue spécifiquement par un récepteur de lymphocyte (BCR, TCR) ou par un anticorps, et de déclencher une réponse immunitaire.
2. Épitope : petite région structurale précise de l'antigène (quelques acides aminés ou oses) effectivement reconnue par le site de liaison d'un anticorps ou d'un TCR. Un même antigène porte généralement plusieurs épitopes distincts.
3. CMH de classe II : glycoprotéines membranaires (HLA-DP, -DQ, -DR) exprimées uniquement par les cellules présentatrices d'antigènes (cellules dendritiques, macrophages, LB). Elles présentent des peptides d'origine exogène (phagocytés puis digérés) aux lymphocytes T4 CD4+, conditionnant leur activation.
4. Tolérance immunologique : ensemble des mécanismes qui empêchent la réaction contre le soi. Tolérance centrale : élimination (sélection négative) des lymphocytes autoréactifs dans le thymus (LT) et la moelle osseuse (LB). Tolérance périphérique : anergie, apoptose ou régulation (lymphocytes T régulateurs) des clones autoréactifs ayant échappé à la sélection centrale.
5. Infection opportuniste : infection causée par un micro-organisme normalement inoffensif ou contrôlé chez l'individu immunocompétent, qui devient pathogène lorsque les défenses immunitaires sont effondrées ($LT4 < 200 \mu L^{-1}$) : *Pneumocystis jirovecii*, toxoplasmose cérébrale, candidoses, tuberculose, méningite à *Cryptococcus*.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul et lecture de données : dynamique des LT4

1. Pourcentage de diminution :

$$\text{Diminution} = \frac{800 - 200}{800} \times 100 = \frac{600}{800} \times 100 = 75 \, \%.$$

Le taux absolu de LT4 a diminué de 75 % en 5 ans.

2. Nouveau pourcentage de LT4 parmi les lymphocytes T : Si les LT4 représentent 40 % des lymphocytes T au départ, le total des lymphocytes T vaut :

$$\text{Total LT} = \frac{800}{0,40} = 2000 \mu L^{-1}.$$

Ce total restant constant, le nouveau pourcentage est :

$$\frac{200}{2000} \times 100 = 10 \%$$

Les LT4 ne représentent plus que 10 % des lymphocytes T (contre 40 %).

3. Seuil du stade Sida : on parle d'immunodéficience sévère (stade Sida, catégorie C de la CDC) lorsque le taux de LT4 descend en dessous de $200 \mu\text{L}^{-1}$ (ou en présence d'une infection opportuniste ou d'un cancer définissant le Sida, quel que soit le taux de LT4).

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 4

Bien distinguer taux absolu (cellules/ μL) et pourcentage relatif ; ne pas confondre le seuil de $200 \mu\text{L}^{-1}$ (Sida) avec le seuil de $500 \mu\text{L}^{-1}$ (immunodépression modérée). Vérifier la cohérence : une chute de 800 à 200 est bien une division par 4, soit -75 %.

CORRIGÉ Exercice 5 — Lieux de formation et de maturation : synthèse

Cellule	Site de formation	Site de maturation	Marqueur CD principal
Lymphocyte B	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge	CD19, CD20 (BCR = Ig membranaire)
LT CD4+ (LT4)	Moelle osseuse rouge	Thymus	CD3+, CD4+
LT CD8+ (LT8)	Moelle osseuse rouge	Thymus	CD3+, CD8+
Macrophage / Monocyte	Moelle osseuse rouge (lignée myéloïde)	Sang (monocyte) puis tissus (différenciation en macrophage)	CD14
Cellule dendritique	Moelle osseuse rouge	Tissus périphériques (maturation après capture d'antigène, migration ganglionnaire)	CD11c

Remarques : toutes les cellules immunitaires dérivent de la cellule souche hématopoïétique de la moelle osseuse rouge (hématopoïèse). Seuls les lymphocytes T migrent vers

le **thymus** pour y subir les sélections positive et négative ; les LB mûrissent sur place. Les cellules myéloïdes (monocytes, cellules dendritiques) n'ont pas de « maturation de compétence » au sens lymphocytaire : elles acquièrent leurs fonctions effectrices dans les tissus.

CORRIGÉ Exercice 6 — Médiation cellulaire vs médiation humorale

1. Réponse prépondérante selon l'agent :

- *Listeria monocytogenes* (bactérie intracellulaire, vivant dans le cytosol des macrophages) : réponse à médiation cellulaire prépondérante. Les anticorps ne peuvent atteindre une bactérie cachée dans une cellule. Effecteurs : LT4 Th1 qui activent les macrophages via l'IFN- γ (destruction des bactéries phagocytées) et LT8 cytotoxiques qui détruisent les cellules infectées.
- Virus grippal : la réponse humorale est prépondérante pour neutraliser les particules virales extracellulaires (les anticorps anti-hémagglutinine bloquent l'entrée du virus dans les cellules et opsonisent les virions). La réponse cellulaire (LT8) complète en éliminant les cellules déjà infectées.

2. Mécanisme cytotoxique du LT8 : le TCR du LT8 reconnaît le complexe [peptide viral + CMH de classe I] à la surface de la cellule infectée. La synapse immunologique se forme ; le LT8 exocyste ses granules : les **perforines** polymérisent dans la membrane cible et y forment des pores ; les **granzymes** (protéases) pénètrent par ces pores et activent les caspases, déclenchant l'**apoptose** (mort cellulaire programmée) de la cellule infectée, sans lyse inflammatoire. La voie Fas/FasL complète ce mécanisme.

3. Transfert de sérum : le sérum immun contient des anticorps neutralisants qui agissent dans les liquides extracellulaires : ils protègent contre le virus grippal (particules virales accessibles lors de la diffusion). En revanche, *Listeria* vit et se propage de cellule à cellule, à l'abri des anticorps : seule l'immunité cellulaire (macrophages activés, LT8) est efficace, d'où l'échec du transfert de sérum. C'est une preuve expérimentale classique de la complémentarité et de la spécificité d'action des deux bras de l'immunité adaptative.

CORRIGÉ Exercice 7 — Réponse primaire et réponse secondaire

1. Comparaison :

Critère	Réponse primaire (J0)	Réponse secondaire (J30)
Latence	Longue ($\approx 5-7$ jours)	Courte ($\approx 1-2$ jours)
Cinétique de montée	Lente, pic vers J14	Rapide, pic vers J37 (≈ 7 jours après le rappel)
Amplitude du pic	Faible (≈ 60 UA/mL)	Élevée (≈ 100 UA/mL)
Isotypes	IgM d'abord, puis IgG de faible affinité	IgG majoritaires, de forte affinité (maturation d'affinité et commutation isotypique accomplies)
Persistance	Décroissance rapide	Taux élevé durable (plasmocytes longue vie)

2. Cellules responsables : les **lymphocytes B mémoires** (et les LT4 mémoires spécifiques), générés lors de la réponse primaire. Présents en grand nombre et déjà sélectionnés pour une forte affinité, ils se différencient rapidement en plasmocytes sécréteurs d'IgG dès le second contact avec l'antigène X.

3. Principe du rappel vaccinal : la primo-vaccination crée la mémoire immunologique sans provoquer la maladie ; le rappel (2^e injection) stimule les lymphocytes mémoires et induit une réponse secondaire plus rapide, plus intense et plus durable, garantissant un taux d'anticorps protecteur à long terme. Le graphique illustre exactement ce bénéfice : après le rappel à J30, le taux dépasse 100 UA/mL en moins d'une semaine et reste élevé à J60.

CORRIGÉ Exercice 8 — Cas clinique : myasthénie auto-immune

1. Identification : il s'agit de la **myasthénie** (myasthenia gravis), maladie auto-immune à médiation humorale : ce sont des auto-anticorps (IgG anti-récepteurs à l'acétylcholine, détectés dans le sang) qui sont directement pathogènes, et non des lymphocytes cytotoxiques. La positivité du test à la néostigmine confirme le déficit de transmission neuromusculaire.

2. Physiopathologie : normalement, l'influx nerveux libère l'acétylcholine (ACh) dans la fente synaptique de la jonction neuromusculaire ; l'ACh se fixe sur les récepteurs RACH de la plaque motrice, provoquant la dépolarisation musculaire et la contraction. Les auto-anticorps anti-RACH (i) bloquent le site de fixation de l'ACh, (ii) accélèrent l'internalisation et la dégradation des récepteurs, (iii) activent le complément qui détruit la membrane post-synaptique. Résultat : diminution du nombre de récepteurs fonctionnels $\Rightarrow$ transmission neuromusculaire défailante $\Rightarrow$ faiblesse musculaire fluctuante, majorée à l'effort et en fin de journée (épuisement du stock d'ACh), d'où ptôsis et diplopie. La néostigmine, en inhibant l'acétylcholinestérase, augmente la durée de vie de l'ACh dans la fente et améliore transitoirement la force musculaire.

3. Rôle du thymus : le thymus est le lieu de la **sélection négative** des LT autoréactifs. Chez les myasthéniques, l'hyperplasie thymique (ou le thymome) témoigne d'une défaillance de cette tolérance centrale : les cellules épithéliales thymiques expriment des antigènes de type RACH, et une sélection négative défaillante laisse échapper des clones de LT4 autoréactifs anti-RACH, qui activent ensuite les LB producteurs d'auto-anticorps. Un **mi-métisme moléculaire** (ressemblance entre un épitope microbien et le RACH) peut initier la rupture de tolérance.

4. Pistes thérapeutiques ciblant l'immunité :

- Corticothérapie et immunosuppresseurs (azathioprine, mycophénolate) : réduire la production d'auto-anticorps.
- Thymectomie : ablation chirurgicale du thymus hyperplasique ou du thymome, supprimant le site d'auto-sensibilisation.
- (Autres options acceptées : échanges plasmatiques ou immunoglobulines intraveineuses en crise aiguë, pour éliminer/neutraliser les auto-anticorps circulants.)

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : expérience de Mitchison (1954)

1. Rôle des anticorps (lots 1 et 3) : le lot 3, qui reçoit le sérum (anticorps) de souris immunisées, ne rejette pas la greffe (survie > 60 jours), alors que le lot témoin la rejette en 12 pm2jours. Conclusion : les anticorps seuls sont incapables de provoquer le rejet d'une greffe de peau ; la médiation humorale n'est pas l'effecteur du rejet aigu.

2. Lot 2 : le transfert de **lymphocytes T** purifiés de souris immunisées restaure le rejet (14 pm3jours, cinétique comparable au lot témoin). Conclusion : les lymphocytes T sont les effecteurs du rejet de greffe ; il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. (La réponse est rapide car les cellules transférées sont déjà immunisées : réponse secondaire.)

3. Phénotype et mécanisme : les effecteurs sont des LT8 cytotoxiques CD3+CD8+, qui reconnaissent les peptides du donneur présentés par le **CMH de classe I** (exprimé par toutes les cellules nucléées du greffon) ; des LT4 (reconnaissant le CMH de classe II des CPA du greffon) assurent la coopération (IL-2). Mécanisme : formation de la synapse immunologique, exocytose de **perforines** (pores membranaires) et de **granzymes** (activation des caspases) ⇒ apoptose des cellules du greffon, d'où sa destruction et son rejet.

4. Intérêt des souris irradiées et contrôle manquant : l'irradiation détruit le système immunitaire propre du receveur : tout rejet observé est donc attribuable uniquement aux cellules ou au sérum transférés (condition nécessaire pour conclure). Lot 4 (contrôle) : souris irradiées + greffe de souche A sans transfert (ou avec transfert de lymphocytes de souris non immunisées) : la greffe doit survivre, ce qui validerait que le rejet du lot 2 est bien dû aux lymphocytes T spécifiquement immunisés et non à un artefact.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 9

Barème proposé : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 1 pt. Attendus : citer explicitement la comparaison des lots (démarche comparative), la condition « souris irradiées = système immunitaire aboli », le couple peptide-CMH I / TCR-CD8, et le rôle des perforines/granzymes. Erreur fréquente : attribuer le rejet aux anticorps par simple association « immunité = anticorps ».

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : dynamique de l'infection VIH

1. Les trois phases :

- Phase 1 — infection primaire (aiguë) : environ de 0 à 2,5 ans sur le graphique (pic de virémie précoce vers 6 mois, puis contrôle partiel).
- Phase 2 — phase chronique (latence clinique) : environ de 2,5 à 7,5 ans (charge virale stabilisée au « point de consigne », déclin lent des LT4).
- Phase 3 — stade Sida : au-delà de $\approx 7,5$ ans ($LT4 < 200 \mu L^{-1}$, charge virale $> 10^5$ copies/mL).

2. Phase 1 : la charge virale explose (pic à $\approx 5e5$ copies/mL vers 6 mois) car le virus se réplique massivement dans les LT4 en l'absence de réponse adaptative ; cette réplication lyse les cellules infectées, d'où une chute transitoire des LT4 (de 800 à $\approx 720/\mu L$). L'installation de la réponse immune (LT8 cytotoxiques puis anticorps neutralisants, séroconversion) fait chuter la virémie vers $2e4$ – $5e4$ copies/mL et permet une remontée partielle des LT4 — mais sans éradication (réservoirs viraux).

3. Phase 2 : la charge virale se stabilise (point de consigne, $\approx 2e4$ à $1e5$ copies/mL) : équilibre dynamique entre production virale (turn-over de l'ordre de $1e9$ – $1e10$ virions/jour) et clairance par l'immunité. Malgré ce contrôle relatif, les LT4 déclinent lentement (≈ 50 à 80 cellules/ μL /an) à cause de : (i) la destruction directe des LT4 infectés par effet cytopathogène du virus et par les LT8 ; (ii) l'**activation immune chronique** qui épuise et fait apoptoser des LT4 non infectés (bystander apoptosis) ; (iii) la destruction progressive de l'architecture des organes lymphoïdes, limitant la régénération.

4. Phase 3 (Sida) : seuils critiques : $LT4 < 200 \mu L^{-1}$ (ici atteint vers l'année 8) et charge virale en forte recrudescence ($> 1e5$ copies/mL, jusqu'à $1e6$). Les LT4 étant indispensables à l'activation des macrophages (via l'**IFN- γ** des LT4 Th1) et à l'aide aux LT8 (IL-2) et aux LB, leur effondrement paralyse simultanément l'immunité cellulaire et humorale. Des micro-organismes normalement contrôlés (*Pneumocystis jirovecii*, *Toxoplasma gondii*, *Candida albicans*, *Cryptococcus*, bacilles tuberculeux) prolifèrent alors : ce sont les **infections opportunistes**, définissant le stade Sida.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 10

Barème proposé : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2 pts. Attendus : lecture chiffrée du graphique (valeurs et dates citées), mention obligatoire du rôle de l'IFN- γ et de l'activation des macrophages pour expliquer les infections opportunistes, et distinction nette entre charge virale (axe droit, échelle log) et LT4 (axe gauche, échelle linéaire) — erreur de lecture très fréquente.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : synthèse VIH et prévention au Cameroun

1. Trois fonctions majeures du LT4 :

- Activation des lymphocytes B : le LT4 spécifique reconnaît le peptide présenté par le CMH II du LB et lui délivre des signaux de coopération (CD40L, IL-4, IL-21) indispensables à sa différenciation en plasmocyte, à la commutation isotypique (IgM $\rightarrow$ IgG) et à la maturation d'affinité.
- Activation des macrophages : les LT4 Th1 sécrètent l'IFN- γ , qui potentialise les pouvoirs phagocytaire et bactéricide des macrophages (destruction des germes intracellulaires).
- Aide aux LT8 cytotoxiques : par la sécrétion d'IL-2, les LT4 permettent la prolifération clonale et la différenciation des LT8 en cellules cytotoxiques effectrices et en cellules mémoires.

Le LT4 orchestre donc à la fois l'immunité humorale, l'immunité cellulaire et l'immunité innée : c'est le « chef d'orchestre » de la réponse adaptative.

2. Mécanisme de l'immunodéficience : le VIH infecte préférentiellement les LT4 (fixation de la gp120 sur CD4 + corécepteurs CCR5/CXCR4), s'y réplique et les détruit (effet cytopathogène, lyse par les LT8, apoptose des cellules voisines). La chute des LT4 entraîne : (i) l'absence d'aide aux LB $\Rightarrow$ production d'anticorps effondrée (bras humoral défaillant) ; (ii) l'absence d'IL-2 $\Rightarrow$ défaut de prolifération des LT8 (bras cellulaire défaillant) ; (iii) l'absence d'IFN- γ $\Rightarrow$ macrophages non activés (immunité innée affaiblie). L'ensemble des défenses s'effondre : c'est l'immunodéficience acquise, qui ouvre la porte aux infections opportunistes et aux cancers (Sida).

3. Trois mesures de prévention adaptées au contexte camerounais :

- Traitement comme prévention (TasP) et ARV gratuits : une personne sous ARV avec charge virale indétectable ne transmet pas le virus ($I = I$, « indétectable = intransmissible »). Efficacité prouvée ; faisable grâce à la gratuité des ARV et au réseau des centres de traitement agréés — à condition de lutter contre la stigmatisation qui freine le dépistage et l'observance.
- Dépistage généralisé et PrEP pour les populations clés : dépistage rapide (TROD) dans les centres de santé, les campagnes communautaires et l'autodépistage chez les jeunes ; prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les personnes très exposées. Ef-

efficacité démontrée ; faisabilité renforcée par l'implication des associations communautaires et des leaders religieux et traditionnels.

- Éducation sexuelle complète et promotion du préservatif : information adaptée à l'âge dans les écoles, universités et médias communautaires (radios locales), distribution de préservatifs, compétences psychosociales (négociation, estime de soi, refus des rapports forcés). Mesure peu coûteuse, culturellement négociable via le dialogue avec les familles et les autorités coutumières, et indispensable pour inverser l'épidémie chez les jeunes.

La lutte contre la **stigmatisation** et la discrimination est transversale : vivre avec le VIH, sous traitement, est compatible avec une vie scolaire, professionnelle et familiale normale ; la solidarité envers les personnes affectées est un savoir-être essentiel.

ATTENTION Barème indicatif et points de vigilance — Exercice 11

Barème proposé : Q1 : 2 pts (trois fonctions justifiées, avec cytokines citées) ; Q2 : 2 pts (chaîne causale complète reliant destruction des LT4 aux trois défaillances) ; Q3 : 2 pts (mesures justifiées par efficacité + faisabilité socioculturelle). Attendus : vocabulaire exact (CD4, gp120, IFN- γ , IL-2), exemples locaux crédibles, ton respectueux et non stigmatisant. Piège : ne pas écrire que le VIH « détruit tous les lymphocytes » — sa cible principale est le LT4.

14 FICHE BILAN

14.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale de synthèse : les sept branches de la leçon, de l'origine des cellules immunitaires aux dysfonctionnements du système immunitaire.

14.2 L'essentiel à retenir

À RETENIR Définitions clés

- **Antigène** : substance étrangère (non-soi) ou modifiée, reconnue par le système immunitaire et capable de déclencher une réponse immunitaire.
- **Anticorps** (immunoglobuline) : protéine en Y sécrétée par les plasmocytes, qui se fixe spécifiquement sur un antigène pour le neutraliser.
- **CMH** (complexe majeur d'histocompatibilité, HLA chez l'Homme) : ensemble de glycoprotéines membranaires, marqueurs du **soi**, propres à chaque individu (sauf vrais jumeaux).
- **Immunocompétence** : capacité d'une cellule immunitaire à reconnaître un antigène déterminé et à réagir contre lui.
- **Maladie auto-immune** : maladie due à une réaction du système immunitaire contre les propres constituants de l'organisme (rupture de la tolérance du soi).
- **Sida** : stade ultime de l'infection par le VIH, caractérisé par une immunodépression profonde (chute des LT4) et l'apparition de maladies opportunistes.

À RETENIR Origine et maturation des cellules immunitaires

Cellule	Origine	Lieu de maturation
Toutes les cellules immunitaires	Moelle osseuse rouge (cellules souches hématopoïétiques)	—
Lymphocytes B (LB)	Moelle osseuse rouge	Moelle osseuse rouge
Lymphocytes T (LT4, LT8)	Moelle osseuse rouge	Thymus
Phagocytes (polynucléaires, monocytes/macrophages)	Moelle osseuse rouge	Moelle puis sang et tissus

PROPRIÉTÉ Les deux voies de la réponse immunitaire spécifique

Critère	Médiation humorale	Médiation cellulaire
Effecteur	LB → plasmocytes	LT8 → lymphocytes T cyto-toxiques (LTc)
Cible	Antigènes libres (microbes, toxines en milieu extracellulaire)	Cellules infectées ou cancéreuses (antigènes intracellulaires présentés par CMH I)
Arme	Anticorps (neutralisation, agglutination, opsonisation)	Contact direct : perforines et enzymes → lyse de la cellule cible
Coopération	LT4 auxiliaires (interleukines)	LT4 auxiliaires (interleukines)

Sélection clonale : l'antigène sélectionne le clone lymphocytaire qui lui est spécifique → multiplication (amplification clonale) → différenciation en cellules effectrices et en **cellules mémoires**.

À RETENIR Mémoire immunitaire, dysfonctionnements et VIH/Sida

- Réponse primaire : lente (latence d'environ 7 à 10 jours), faible. Réponse secondaire : rapide, intense, durable (cellules mémoires) ⇒ principe de la **vaccination**.
- Maladies auto-immunes : vitiligo (destruction des mélanocytes), diabète juvénile de type 1 (destruction des cellules β des îlots de Langerhans → absence d'insuline), myasthénie (auto-anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine → faiblesse musculaire).
- VIH : rétrovirus (génomme ARN + transcriptase inverse) qui infecte et détruit les **LT4** (récepteur CD4) → effondrement des réponses immunitaires → maladies opportunistes (tuberculose, méningites à cryptocoques, pneumocystose).
- Transmission : sang, rapports sexuels non protégés, mère-enfant. Pas de transmission par la salive, les larmes, les poignées de main, les moustiques.
- Prévention : préservatif, dépistage, fidélité réciproque, matériel d'injection à usage unique ; traitement : antirétroviraux (ARV) qui bloquent la multiplication virale sans guérir.

MÉTHODE Méthodes d'analyse et d'interprétation

1. Expérience de greffe : greffe rejetée entre individus non apparentés, acceptée entre vrais jumeaux ⇒ le CMH est le marqueur du soi.

2. Test de Winn : mélange cellules tumorales + lymphocytes T d'un animal immunisé → pas de tumeur chez l'animal receveur ⇒ preuve de la médiation cellulaire.
3. Courbe d'anticorps : comparer les pentes et les maxima des réponses primaire et secondaire pour conclure à la mémoire immunitaire.
4. Analyse d'un western blot ou d'un test ELISA : présence d'anticorps anti-VIH = séropositivité (infection), à confirmer.

À RETENIR**Checklist avant le Bac**

- ☐ Je sais situer la moelle osseuse rouge (formation) et le thymus (maturation des LT).
- ☐ Je définis antigène, anticorps, CMH et immunocompétence sans hésiter.
- ☐ J'explique pourquoi une greffe entre vrais jumeaux est acceptée.
- ☐ Je décris les étapes de la phagocytose (réponse non spécifique).
- ☐ Je distingue médiation humorale (LB, anticorps) et médiation cellulaire (LTc, lyse par contact).
- ☐ Je sais que les LT4 auxiliaires coopèrent dans les deux voies.
- ☐ J'interprète une courbe d'anticorps (réponses primaire et secondaire) et je la relie à la vaccination.
- ☐ Je cite trois maladies auto-immunes et leur mécanisme (vitiligo, diabète juvénile, myasthénie).
- ☐ J'explique comment le VIH détruit les LT4 et provoque l'immunodépression.
- ☐ Je connais les trois modes de transmission du VIH et je réfute les idées reçues.
- ☐ Je sais proposer des messages de prévention et de solidarité envers les PVVIH.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**