

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Pratiques pour éviter la contamination et l'infection

SVTEEB – classe de 3ème

Ce TD porte sur les méthodes de prévention de la contamination et de l'infection (asepsie, antiseptie, préservatif).

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : aseptie, antiseptie, stérile, contamination, préservatif.

1. L'ensemble des mesures visant à empêcher l'arrivée de germes sur un milieu initialement sain s'appelle la ...
2. L'ensemble des mesures visant à détruire ou inhiber les germes déjà présents sur un milieu vivant (peau, muqueuse) s'appelle la ...
3. Un matériel exempt de tout germe vivant est qualifié de ...
4. Le ...est un moyen de barrière efficace pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) et les grossesses non désirées.
5. Le passage accidentel de germes d'un milieu contaminé vers un milieu sain constitue une ...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. Se laver les mains à l'eau et au savon avant un soin est un acte d'aseptie. Vrai / Faux
Justification : ...
2. Appliquer de l'alcool à 70° sur une plaie ouverte est un acte d'antiseptie. Vrai / Faux
Justification : ...
3. La stérilisation du matériel chirurgical au four à air chaud (180 °C, 30 min) relève de l'antiseptie. Vrai / Faux
Justification : ...
4. Le préservatif masculin doit être mis après le début de la pénétration pour être efficace. Vrai / Faux
Justification : ...
5. L'antiseptie peut être réalisée sur du matériel inerte (pinces, ciseaux). Vrai / Faux
Justification : ...

EXERCICE 3 QCM : Choix unique

Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. Quel antiseptique cutané courant est inactivé par la matière organique (sang, pus) et ne doit pas être mélangé à d'autres produits ?
 - A L'alcool éthylique à 70°
 - B La solution de Dakin (hypochlorite de sodium)
 - C Le povidone-iodé (Bétadine®)
 - D L'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogène)
2. Lors de la mise en place d'un préservatif masculin, quelle étape est indispensable pour éviter sa rupture lors de l'éjaculation ?
 - A Le dérouler complètement avant de le mettre
 - B Chasser l'air du réservoir en le pinçant avant de le dérouler
 - C Utiliser un lubrifiant à base d'huile (vaseline, huile de cuisine)
 - D Le laver à l'eau savonneuse avant utilisation
3. Dans le cadre du TP N°6 (asepsie/antisepsie), on compare souvent la flore cutanée avant et après lavage. Quel milieu de culture simple est généralement utilisé en classe pour mettre en évidence les bactéries ?
 - A Gélose Chapman
 - B Gélose au sang
 - C Gélose nutritive (ou PCA)
 - D Milieu de Sabouraud

EXERCICE 4 Ordre opératoire : Lavage des mains hygiénique

Remettez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique correct (de 1 à 6) pour réaliser un lavage des mains hygiénique simple (eau + savon liquide).

1. Frictionner les paumes l'une contre l'autre, les espaces interdigitaux, le dos des mains, les pouces et les poignets.
2. Mouiller les mains et les avant-bras à l'eau tiède.
3. Se sécher les mains avec un essuie-mains à usage unique (papier) en tamponnant.
4. Appliquer une dose de savon liquide dans le creux de la main.
5. Rincer abondamment les mains et les avant-bras en gardant les mains plus hautes que les coudes.

6. Fermer le robinet à l'aide de l'essuie-mains utilisé pour le séchage.

Ordre : ... → ... → ... → ... → ... → ...

EXERCICE 5 Tableau comparatif : Asepsie vs Antisepsie

Complétez le tableau ci-dessous en inscrivant les éléments manquants (cibles, agents, exemples d'actions).

Critère	Asepsie		
Cible (support)	Milieu inerte / Milieu vivant ?		
Objectif principal	Empêcher l'arrivée des germes		
Agents utilisés	Physiques (chaleur, rayonnements), Chimiques (stérilisants)		
Exemple d'action en classe (TP N°6)	Stérilisation du matériel (autoclave / four)		
Exemple au quotidien	Champ opératoire stérile, gants stériles		D

EXERCICE 6 Situation concrète : Prévention au quotidien

Léa prépare le repas familial. Elle vient de manipuler de la viande crue (poulet) et doit maintenant couper des tomates pour une salade crue.

1. Quel risque majeur de contamination existe-t-il si elle utilise la même planche et le même couteau sans les laver ?
2. Citez deux mesures d'asepsie (nettoyage/désinfection du matériel) qu'elle doit appliquer avant de couper les tomates.
3. Après s'être lavée les mains soigneusement, Léa éternue dans ses mains. Doit-elle se relaver les mains avant de reprendre la préparation ? Justifiez.