

Paradigmas de Programación

Sistemas deductivos

Deducción natural para lógica proposicional

2do cuatrimestre de 2024

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Sistema deductivo (informalmente)

Brinda herramientas y principios para **razonar de manera rigurosa**.

1

2

Sistemas deductivos

Sistema deductivo

Dado por un conjunto de **axiomas** y **reglas de inferencia**, que tienen la siguiente estructura:

$$\frac{}{\langle \text{axioma} \rangle} \langle \text{nombre del axioma} \rangle$$

$$\frac{\langle \text{premisa}_0 \rangle \quad \langle \text{premisa}_1 \rangle \quad \dots \quad \langle \text{premisa}_n \rangle}{\langle \text{conclusión} \rangle} \langle \text{nombre de la regla} \rangle$$

- ▶ **Axioma:** Afirmaciones básicas que se asumen como verdaderas (no se deducen de otras afirmaciones).
- ▶ **Reglas de inferencia:** Permiten derivar afirmaciones (teoremas) a partir de axiomas y otras afirmaciones.

Nota: Un axioma es una regla de inferencia sin premisas.

Reglas de inferencia

Regla de inferencia

$$\frac{\langle \text{premisa}_0 \rangle \quad \langle \text{premisa}_1 \rangle \quad \dots \quad \langle \text{premisa}_n \rangle}{\langle \text{conclusión} \rangle} \langle \text{nombre de la regla} \rangle$$

Las premisas son **condiciones suficientes** para la conclusión.

- ▶ Lectura de arriba hacia abajo:
si tenemos evidencia de que valen las premisas, podemos deducir que vale la conclusión.
- ▶ Lectura de abajo hacia arriba:
si queremos demostrar que vale la conclusión, alcanza con demostrar que valen las premisas.

3

4

Ejemplo: Sistema deductivo \mathcal{A}

► Axiomas:

$\frac{}{\star > \blacksquare}$ ax1

$\frac{}{\blacksquare > \blacktriangle}$ ax2

$\frac{}{\blacktriangle > \bullet}$ ax3

► Regla de inferencia: definida por el *esquema*

$$\frac{X > Y \quad Y > Z}{X > Z} \text{trans}$$

X, Y y Z son variables esquemáticas / *metavariables*:
se pueden instanciar de manera arbitraria

Derivación

Un método sistemático para construir una demostración que muestra cómo una afirmación se deduce a partir de un conjunto de axiomas y reglas de inferencia.

Árbol de Derivación

Árbol de Derivación: Representación gráfica de una derivación

Un árbol **finito** donde

► Los nodos representan afirmaciones

► La raíz es la afirmación que se quiere probar (**conclusión**)

► Las ramas representan las reglas de inferencias que conectan a las afirmaciones.

Parte de ciertas premisas (hojas) y llega a una conclusión (raíz).

Árbol de Derivación

Ejemplo 1

$\frac{}{\blacksquare > \blacktriangle}$ ax2

Se puede concluir $\blacksquare > \blacktriangle$ sin premisas.

Ejemplo 2

$$\frac{\star > \blacksquare \quad \blacksquare > \blacktriangle}{\star > \blacktriangle} \text{trans}$$

Se puede concluir $\blacksquare > \blacktriangle$ a partir de las premisas $\star > \blacksquare$ y $\blacksquare > \blacktriangle$.

Ejemplo 3

$$\frac{\frac{\star > \blacksquare}{\star > \blacksquare} \text{ax1} \quad \frac{}{\blacksquare > \blacktriangle} \text{ax2}}{\star > \blacktriangle} \text{trans}$$

Se puede concluir $\star > \blacktriangle$ sin premisas.

7

8

Afirmación derivable (teorema)

Afirmación derivable

Una afirmación es **derivable** si existe alguna derivación **sin premisas** que la tiene como conclusión.

Son las siguientes afirmaciones derivables?

- ▶ $\star > \blacktriangle$
- ▶ $\blacktriangle > \star$

Lógica proposicional: Sintaxis

Suponemos dado un conjunto infinito de *variables proposicionales*:

$$\mathcal{P} = \{P, Q, R, \dots\}$$

Fórmulas

Las fórmulas de la lógica proposicional se construyen con las siguientes reglas

- ▶ Una variable proposicional es una fórmula.
- ▶ \perp es una fórmula (representa una contradicción).
- ▶ Si τ es una fórmula, entonces $\neg\tau$ es una fórmula.
- ▶ Si τ y σ son fórmulas, entonces $(\tau \wedge \sigma)$, $(\tau \Rightarrow \sigma)$, y $(\tau \vee \sigma)$ son fórmulas.

Nota: Omitimos \iff por economía

9

10

Lógica proposicional: Sintaxis (como sistema deductivo)

Suponemos dado un conjunto infinito de *variables proposicionales*:

$$\mathcal{P} = \{P, Q, R, \dots\}$$

Sistema deductivo

La afirmación “ X FORM” denota que X es una fórmula de la lógica proposicional

$$\frac{P \in \mathcal{P}}{P \text{ FORM}} \text{FP} \quad \frac{}{\perp \text{ FORM}} \text{F}\perp \quad \frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \wedge \sigma) \text{ FORM}} \text{F}\wedge$$
$$\frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \Rightarrow \sigma) \text{ FORM}} \text{F}\Rightarrow \quad \frac{\tau \text{ FORM} \quad \sigma \text{ FORM}}{(\tau \vee \sigma) \text{ FORM}} \text{F}\vee \quad \frac{\tau \text{ FORM}}{\neg\tau \text{ FORM}} \text{F}\neg$$

Lógica proposicional: Sintaxis (gramáticas)

- ▶ Usualmente vamos a definir la sintaxis de lenguajes a través de sistemas deductivos.
- ▶ Vamos a escribirlos de maneras abreviadas, usando gramáticas (la definición de lo que es una gramática la verán en Teoría de Lenguajes)

Gramática de la lógica proposicional

Las **fórmulas** son las expresiones que se pueden generar a partir de la siguiente gramática:

$$\tau, \sigma, \rho, \dots ::= P \mid \perp \mid (\tau \wedge \sigma) \mid (\tau \Rightarrow \sigma) \mid (\tau \vee \sigma) \mid \neg\tau$$

1. Demostrar $\neg(P \Rightarrow (Q \Rightarrow P))$ FORM.

11

12

- 1. Omitimos los paréntesis más externos de las fórmulas.
$$\tau \wedge \neg(\sigma \vee \rho) = (\tau \wedge \neg(\sigma \vee \rho))$$
- 2. La implicación es asociativa a derecha.
$$\tau \Rightarrow \sigma \Rightarrow \rho = (\tau \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \rho))$$
- 3. Ojo: los conectivos (\wedge, \vee) **no** son conmutativos ni asociativos.
$$\tau \vee (\sigma \vee \rho) \neq (\tau \vee \sigma) \vee \rho \qquad \tau \wedge \sigma \neq \sigma \wedge \tau$$

Valuación

Una valuación es una función $v : \mathcal{P} \rightarrow \{V, F\}$ que asigna valores de verdad a las variables proposicionales.

$v \models \tau$

Una valuación v **satisface** una fórmula τ si $v \models \tau$, donde:

$v \models P$	si y sólo si	$v(P) = V$
$v \models \tau \wedge \sigma$	si y sólo si	$v \models \tau$ y $v \models \sigma$
$v \models \tau \Rightarrow \sigma$	si y sólo si	$v \not\models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \models \tau \vee \sigma$	si y sólo si	$v \models \tau$ o $v \models \sigma$
$v \models \neg \tau$	si y sólo si	$v \not\models \tau$

Nota: $v \models \perp$ **nunca vale**

Contexto

Un **contexto** es un conjunto finito de fórmulas.

Los notamos con letras griegas mayúsculas $(\Gamma, \Delta, \Sigma, \dots)$.
Por ejemplo:

$$\Gamma = \{P \Rightarrow Q, \neg Q\}$$

Generalmente omitimos las llaves; p. ej.: $P \Rightarrow Q, \neg Q$.

$v \models \Gamma$

Una valuación v satisface un contexto Γ (notación: $v \models \Gamma$) si y sólo si v satisface a todas las fórmulas de Γ .

Nota: Toda valuación v satisface al contexto vacío

Consecuencia lógica

Una fórmula τ es consecuencia lógica de un conjunto Γ (notación: $\Gamma \models \tau$) si y sólo si cualquier valuación v que satisface a Γ también satisface a τ .

Notar:

- ▶ A es verdadera para todas las valuaciones que satisfacen todas la fórmulas en Γ
- ▶ Asumiendo que todas las fórmulas en Γ son verdaderas (hipótesis), A (tesis) es verdadera.

Ejemplo

1. Probar que $P \wedge Q \models P$.
2. Probar que $P \vee Q, \neg Q \models P$.
3. Probar que no vale $P \vee Q \models Q$.
4. Probar que $P \models Q \vee \neg Q$.
5. Probar que $\models P \Rightarrow P$.


Limitaciones del método semántico

Hay varios problemas con un enfoque puramente semántico:

- ▶ Muy pocas lógicas tienen procedimientos de decisión como la lógica proposicional.
- ▶ El conjunto de hipótesis (axiomas) puede ser infinito.
- ▶ No evidencia la relación de la fórmula con hipótesis (Por ejemplo, dónde es necesaria una hipótesis).
- ▶ Difícil reconocer resultados intermedios (lemas).

Enfoque deductivo

- ▶ Definir un sistema deductivo.
- ▶ Vamos a ver el sistema de **deducción natural** (existen otros):
 - ▶ Trabaja con afirmaciones de la forma:



- ▶ Denominamos a estas afirmaciones **Juicios**
- ▶ Informalmente, un juicio afirma que a partir de las hipótesis en el contexto Γ es posible deducir la fórmula de la tesis.

Ejemplo

Los siguientes van a ser juicios derivables:

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P \qquad \vdash P \Rightarrow P$$

Reglas de inferencia — axioma

El sistema de deducción natural tiene muchas reglas de inferencia.
(Vamos de a poco)

Axioma

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ax}$$

Ejemplo

$$\frac{}{P \vdash P} \text{ax} \quad \frac{}{P \Rightarrow Q, R \vdash P \Rightarrow Q} \text{ax} \quad \frac{}{P, Q \wedge R, S \vdash Q \wedge R} \text{ax}$$

Los siguientes juicios **no** se deducen de la regla ax:

$$P, Q \vdash R \quad \vdash P \Rightarrow P \quad P \wedge Q \vdash Q \wedge P \quad \neg\neg P \vdash P$$

Reglas de inferencia — conjunción

Introducción de la conjunción

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i$$

Eliminación de la conjunción

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e1} \quad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2}$$

1. Dar una derivación de $P \wedge Q \vdash Q \wedge P$.
2. Dar una derivación de $P \wedge (Q \wedge R) \vdash (P \wedge Q) \wedge R$.

21

22

Reglas de inferencia — implicación

Introducción de la implicación

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma} \Rightarrow_i$$

Eliminación de la implicación

(modus ponens)

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$

1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow P$
2. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow Q \Rightarrow (Q \wedge P)$
3. Dar una derivación de $P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R$.

Reglas de inferencia — disyunción

Introducción de la disyunción

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i1} \quad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i2}$$

Eliminación de la disyunción

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho} \vee_e$$

1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow (P \vee P)$.
2. Dar una derivación de $\vdash (P \vee P) \Rightarrow P$.
3. Dar una derivación de $P \vee Q \vdash Q \vee P$.

23

24

El conectivo \perp representa la falsedad (contradicción, absurdo).

El conectivo \perp **no** tiene reglas de introducción.

Eliminación del falso (principio de explosión o *ex falso quodlibet*)

$$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \perp_e$$

- 1. Dar una derivación de $(P \vee Q) \Rightarrow \perp \vdash P \Rightarrow Q$
- 2. Dar una derivación de $(P \wedge Q) \Rightarrow \perp \vdash P \Rightarrow Q \Rightarrow R$
- 3. Mostrar que hay infinitas derivaciones de $\perp \vdash \perp$.

Deducción natural **intuicionista (NJ)** — todas la reglas

	Introducción	Eliminación
\wedge	$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e1} \quad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2}$
\Rightarrow	$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma} \Rightarrow_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$
\vee	$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i1} \quad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i2}$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho} \vee_e$
\perp	$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \perp_e$	
\neg	$\frac{\Gamma, \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \tau} \neg_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg \tau}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$

Introducción de la negación (reducción al absurdo intuicionista)

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \tau} \neg_i$$

Eliminación de la negación

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg \tau}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

- 1. Dar una derivación de $\vdash P \Rightarrow \neg \neg P$.
- 2. Dar una derivación de $\vdash \neg(P \wedge \neg P)$.
- 3. Dar una derivación de $P \vee Q \vdash \neg(\neg P \wedge \neg Q)$.

Propiedades del sistema

Teorema (Debilitamiento) (weakening)

Si $\Gamma \vdash \tau$ es derivable, entonces $\Gamma, \sigma \vdash \tau$ es derivable.

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma, \sigma \vdash \tau} W$$

Se puede demostrar por inducción estructural en la derivación.
(Se hará como ejercicio en la práctica).

Ejemplo

$$\frac{\frac{\frac{\overline{P \wedge Q, R \vdash P \wedge Q}^{ax}}{P \wedge Q, R \vdash Q} \wedge_{e2} \quad \frac{\frac{\overline{P \wedge Q, R \vdash P \wedge Q}^{ax}}{P \wedge Q, R \vdash P} \wedge_{e1}}{P \wedge Q, R \vdash Q \wedge P} \wedge_i}{R \vdash (P \wedge Q) \Rightarrow (Q \wedge P)} \Rightarrow_i$$

Reglas derivadas

Veamos que las siguientes reglas se deducen de las anteriores.
(No es necesario agregarlas al sistema deductivo).

Modus tollens

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \neg \sigma}{\Gamma \vdash \neg \tau} \text{MT}$$

Introducción de la doble negación

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \neg \neg \tau} \neg \neg i$$

Principios de razonamiento clásicos

Las reglas $\neg \neg_e$ y LEM son principios de razonamiento **clásicos**.
Otro principio de razonamiento clásico, equivalente a $\neg \neg_e$ y LEM:

Reducción al absurdo clásico (Proof by Contradiction)

$$\frac{\Gamma, \neg \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \text{PBC}$$

Ejercicio

Ver que usando PBC se puede deducir LEM y viceversa.

Principios de razonamiento clásicos

Eliminación de la doble negación

¿Se puede deducir la siguiente regla a partir de las anteriores?

$$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg \tau}{\Gamma \vdash \tau} \neg \neg_e$$

Principio del tercero excluido (Law of Excluded Middle)

¿Se puede deducir la siguiente regla a partir de las anteriores?

$$\frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg \tau} \text{LEM}$$

No es posible deducir estas reglas de las anteriores.

Sin embargo, se pueden deducir la una de la otra. Veamos que:

1. Usando la regla LEM se puede deducir la regla $\neg \neg_e$.
2. Usando la regla $\neg \neg_e$ se puede deducir la regla LEM.

29

30

Lógica intuicionista vs. lógica clásica

Dos sistemas deductivos

- NJ** sistema de deducción natural intuicionista.
- NK** sistema de deducción natural clásica.

- ▶ **NK** extiende a **NJ** con principios de razonamiento clásicos. Alcanza con agregar uno de ellos, por ejemplo $\neg \neg_e$.
- ▶ Si un juicio es derivable en **NJ**, también es derivable en **NK**.
- ▶ **NJ** es más restrictiva. No permite usar $\neg \neg_e$, LEM, PBC, etc.
- ▶ Para hacer matemática, comúnmente usamos lógica clásica.

Interés de la lógica intuicionista en computación

- ▶ Permite razonar acerca de **información**.
¿Qué significa (hay vida en Marte \vee \neg hay vida en Marte)?
- ▶ Las derivaciones en **NJ** se pueden entender como programas.
NJ es la base de un lenguaje de programación funcional.

31

32

	$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ax}$	$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}{\Gamma \vdash \tau} \neg\neg_e$
	Introducción	Eliminación
\wedge	$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e1} \quad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2}$
\Rightarrow	$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma} \Rightarrow_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$
\vee	$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i1} \quad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma} \vee_{i2}$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho} \vee_e$
\perp	$\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \tau} \perp_e$	
\neg	$\frac{\Gamma, \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg\tau} \neg_i$	$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$

33

Teorema (Corrección y completitud)

Son equivalentes:

1. $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**.
2. $\Gamma \models \tau$

34

Demostración de corrección $\Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau$ implica $\Gamma \models \tau$

Supongamos que $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**.
Demostramos que $\Gamma \models \tau$ por inducción estructural en la derivación.
Hay que analizar 13 casos, uno por cada regla de **NK**.
Por ejemplo, para la regla \Rightarrow_e :

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$

Queremos ver que $\Gamma \models \sigma$.
Sea v tal que $v \models \Gamma$ y veamos que $v \models \sigma$.
Por HI sabemos que $\Gamma \models \tau \Rightarrow \sigma$ y que $\Gamma \models \tau$.
Como $v \models \Gamma$ tenemos que $v \models \tau \Rightarrow \sigma$ y $v \models \tau$.
Por definición de $v \models \tau \Rightarrow \sigma$, tenemos entonces que $v \not\models \tau$ o $v \models \sigma$.
Pero teníamos $v \models \tau$, con lo cual concluimos $v \models \sigma$.

► Intentar probar los 12 casos restantes.

35

Demostración de completitud $(\Gamma \models \tau$ implica $\Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau)$

Definición

1. Un contexto Γ **determina** una variable $P \in \mathcal{P}$ si vale que $P \in \Gamma$ o que $\neg P \in \Gamma$.
2. Un contexto Γ **determina** un conjunto de variables $X \subseteq \mathcal{P}$ si determina a todas las variables de X .

Para probar el teorema de completitud, necesitamos:

Lema principal

Si Γ determina a todas las variables que aparecen en τ , entonces:

1. O bien $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**.
2. O bien $\Gamma \vdash \neg\tau$ es derivable en **NK**.

Asumamos que el lema vale, lo demostraremos después.

36

Demostración de completitud $(\Gamma \models \tau \text{ implica } \Gamma \vdash_{\mathbf{NK}} \tau)$

Supongamos que $\sigma_1, \dots, \sigma_n \models \tau$.

Queremos ver que $\sigma_1, \dots, \sigma_n \vdash \tau$ es derivable en **NK**.

Sea $\rho = (\sigma_1 \wedge \dots \wedge \sigma_n) \Rightarrow \tau$. Sabemos que $\models \rho$.

¿Por qué?

Alcanza con probar que $\vdash \rho$ es derivable en **NK**.

¿Por qué?

Sea $X = \{P_1, \dots, P_n\}$ el conjunto de variables que aparecen en ρ .

Usando LEM y \forall_e podemos considerar 2^n casos, de la forma:

$$\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n \vdash \rho$$

donde cada \tilde{P}_i es o bien P_i o bien $\neg P_i$.

Por el lema principal, se da uno de los dos casos siguientes:

1. O bien $\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n \vdash \rho$ es derivable en **NK** (y listo).

2. O bien $\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n \vdash \neg \rho$ es derivable en **NK**.

Por corrección vale $\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n \models \neg \rho$.

Sea v una valuación tal que $v(P_i) = \mathbf{V}$ si y sólo si $\tilde{P}_i = P_i$.

Luego $v \models \neg \rho$. Absurdo pues sabíamos $\models \rho$.

37

Demostración del lema principal

Recordemos el enunciado:

Lema principal

Si Γ determina a todas las variables que aparecen en τ , entonces:

1. O bien $\Gamma \vdash \tau$ es derivable en **NK**.

2. O bien $\Gamma \vdash \neg \tau$ es derivable en **NK**.

Lo demostramos por inducción estructural en τ .

Hay 6 casos ($P, \wedge, \Rightarrow, \vee, \perp, \neg$).

Por ejemplo, supongamos que $\tau = (\sigma \wedge \rho)$.

Por hipótesis inductiva sobre σ , sabemos que:

1. O bien $\Gamma \vdash \sigma$ es derivable en **NK**.

Por hipótesis inductiva sobre ρ , sabemos que:

1.1 O bien $\Gamma \vdash \rho$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho$.

1.2 O bien $\Gamma \vdash \neg \rho$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \neg(\sigma \wedge \rho)$.

2. O bien $\Gamma \vdash \neg \sigma$ es derivable en **NK** y tenemos $\Gamma \vdash \neg(\sigma \wedge \rho)$.

► Intentar probar los 5 casos restantes.

38